

Brentan creme 2%

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Brentan creme.
3. Sådan skal du bruge Brentan creme.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Brentan creme indeholder et svampe-middel.

Anvendelse



Du kan bruge Brentan creme mod svamp på fødder og andre steder på huden.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER BRENTAN CREME

Brug ikke Brentan creme hvis



- Du er overfølsom over for det aktive stof miconazolnitrat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Brentan creme.

Særlige forholdsregler



Du må ikke bruge Brentan creme mod svamp i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning.

Undgå at få Brentan creme i øjnene.

Du bør stoppe behandlingen, hvis du får tegn på allergi.

Brug af Brentan creme sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Brentan creme

Brentan creme indeholder:

- butylhydroxytoluen (E321), der kan give hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
- benzoesyre (E210), der kan virke let irriterende på hud, øjne og slimhinder.

Graviditet og amning



Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Brentan creme, når du er gravid.

Amning

Erfaringer med Brentan creme er endnu begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed



Brentan creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin



Fortæl altid apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. Du kan bruge Brentan creme samtidig med anden medicin.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BRENTAN CREME



Dosering

Voksne

Du skal smøre Brentan creme på og omkring det angrebne hudområde 2 gange daglig.

Du skal fortsætte med at bruge Brentan creme i 1-2 uger, efter symptomerne er væk.

Børn

Du skal smøre Brentan creme på og omkring det angrebne hudområde 2 gange daglig.

Du skal fortsætte med at bruge Brentan creme i 1-2 uger, efter symptomerne er væk.

Du bør ikke bruge Brentan creme til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hygiejniske forholdsregler

1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører Brentan creme på.
2. Du skal sørge for, at de ting, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde (håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), ikke bliver brugt af andre.

Behandling af fødderne

1. Vask fødderne med sæbe og fjern afskallet hud. Tør fødderne omhyggeligt - også mellem tæerne - med et håndklæde, der kun bliver brugt til det.
2. Smør Brentan creme på og omkring det angrebne hudområde - også imellem tæerne og på fodsålen.
3. Tag rene strømper på efter hver behandling.

Hvis du skifter og vasker strømper hver dag, vil du få den bedste virkning af behandlingen.

Har du brugt for meget Brentan creme?

Hvis du bruger for meget Brentan creme, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Brentan creme. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Har du glemt at bruge Brentan creme?

Du skal smøre cremen på, når du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER



Brentan creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Hudirritation, kontakteksem, rødme, brændende fornemmelse i huden, nældefeber, hududslæt, kløe.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Brentan creme utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Brentan creme ved over 25° C.
- Brug ikke Brentan creme efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Brentan creme indeholder



- Det aktive stof er miconazolnitrat 2 %.
- De øvrige indholdsstoffer er: Pegoxol-7-stearat, pegicol-5-oleat, parafinolie, benzoesyre (E 210), butylhydroxanisol (E 320), rensset vand.

Pakningsstørrelser

Tube med 15 g, 30 g eller 50 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Registreringsindehaver
JANSSEN-CILAG A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
B-2340 Beerse
Belgien

Revideret oktober/2006



JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - Fax CPM: +32 14605157

LEAFLET BRENTAN

Article Number : **961849**

Dimensions : B//004/V1 (134x204)

Pointsize : 8pt

File Name : 961849.indd (MAC)

Market : DK

Sickcode : 225

Operator : Marleen

■ Black

L A B

Date : 1. 12-09-2006

2. 16-10-2006

3. 20-10-2006

4. 26-10-2006 (AND)

5.