

Brentan^{FRAGMANT} kutanopløsning til pensling på negle og hud 2%

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept.
- For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Brentan kutanopløsning.
3. Sådan skal du bruge Brentan kutanopløsning.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Brentan kutanopløsning indeholder et svampemiddel.

Anvendelse



Du kan bruge Brentan kutanopløsning mod svamp i negle og hud.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER BRENTAN KUTANOPLØSNING

Brug ikke Brentan kutanopløsning hvis



- Du er overfølsom over for det aktive stof miconazolnitrat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Brentan kutanopløsning.

Særlige forholdsregler



Du må ikke bruge Brentan kutanopløsning mod svamp i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning.

Undgå at få Brentan kutanopløsning i øjnene.

Du bør stoppe behandlingen, hvis du får tegn på allergi.

Brug af Brentan kutanopløsning sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Brentan kutanopløsning

Brentan kutanopløsning indeholder propylen-glycol, som kan virke irriterende på huden.

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (medicin mod betændelse), må du ikke bruge Brentan kutanopløsning uden først at tale med lægen.

Graviditet og amning



Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Brentan kutanopløsning, når du er gravid.

Amning

Erfaringer med Brentan kutanopløsning er endnu begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed



Brentan kutanopløsning påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin



Fortæl altid apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Brentan kutanopløsning samtidig med anden medicin.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BRENTAN KUTANOPLØSNING

Dosering



Voksne

Du skal pensle de angrebne hudområder 2 gange daglig.

Du skal forsætte med at bruge Brentan i 1-2 uger, efter symptomerne er væk.

Hvis du skal bruge Brentan kutanopløsning mod neglesvamp, skal du følge den brugsvejledning, som står nedenfor.

Børn



Du skal pensle de angrebne hudområder 2 gange daglig.

Du skal forsætte med at bruge Brentan i 1-2 uger, efter symptomerne er væk.

Du bør ikke bruge Brentan kutanopløsning til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hygiejniske forholdsregler:

1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du pensler Brentan kutanopløsning på.

2. Du skal sørge for, at alle de ting, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde (håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), kun bliver brugt af dig.

Neglesvamp

1. Klip den angrebne negl så kort som mulig
2. Pensl Brentan kutanopløsning på neglen 1 eller 2 gange daglig.
3. Du skal også pensle Brentan kutanopløsning inde under neglen og på huden omkring neglen.
4. Lad Brentan kutanopløsning tørre, efter du har smurt den på. Brentan kutanopløsning efterlader en hinde efter tørring.
5. Du skal rense neglen med acetone eller neglelakfjerner, før du pensler Brentan kutanopløsning på næste gang.
6. Fortsæt behandlingen til en ny negl er vokset ud.
7. Du skal fortsætte behandlingen, til den nye negl ser helt normal ud. Det tager mindst 3 måneder.

Har du brugt for meget Brentan kutanopløsning?

Hvis du bruger for meget Brentan kutanopløsning, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Brentan kutanopløsning. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Har du glemt at bruge Brentan kutanopløsning?

Du skal smøre kutanopløsning på, når du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER



Brentan kutanopløsning kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Hudirritation, kontakteksem, rødme, brændende fornemmelse i huden, nældefeber, hududslæt, kløe.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Brentan kutanopløsning utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Brentan kutanopløsning efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Afllever altid medicinrester på apoteket.

Brentan kutanopløsning indeholder



- Det aktive stof er miconazolnitrat 2%.
- De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol, acryl adhesiv, denaturet alcohol 96%.

Pakningsstørrelser

Flaske med 30 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Registreringsindehaver
JANSSEN-CILAG A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller
Lusomedicamenta
Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A
Queluz de Baixo
Portugal

Revideret november/2006.



JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG

Graphic Services
Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 – Fax CPM: +32 14605157

LEAFLET BRENTAN

Article Number : **P1602726E**

Dimensions : 3P_LUS//034/V1 (140x230)

Pointsize : 8,3 pt

File Name : P1602726E.indd (mac)

■ Black

L A B

Date : 1. 10-11-2006
2. 22-11-2006
3.
4.
5.