

Brentan 2% mundhulegel

(miconazol)

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

- Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt din læge eller apoteket.
- Lægen har ordineret Brentan mundhulegel til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som skal læses, før du bruger Brentan mundhulegel.
3. Sådan skal du bruge Brentan mundhulegel.
4. Bivirkninger.
5. Hvordan opbevares Brentan mundhulegel.
6. Yderligere information.

Brentan mundhulegel indeholder:



- Det aktive lægemiddelstof er miconazolnitrat 20 mg/g
- De øvrige indholdsstoffer er: Prege-latineret stivelse, ethanol, polysorbat 20, saccharinnatrium, kakaoaroma, orangearoma, glycerol og rensat vand.

Ansvarlig for markedsføringen i Danmark:

Registreringsindehaver:

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

1. VIRKNING OG ANVENDELSE:

Lægemiddelform:

Mundhulegel

Lægemiddelgruppe / virkemåde:

Brentan mundhulegel er et lægemiddel til behandling af svampeinfektioner, der er forårsaget af miconazolfølsomme svampe.

Hvad anvendes Brentan mundhulegel til ?



Brentan mundhulegel anvendes til behandling af svampeinfektioner i munden og i mave/tarmkanalen.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM SKAL LÆSES, FØR DU BRUGER BRENTAN MUNDHULEGEL.

Brug ikke Brentan mundhulegel hvis:



- Du er overfølsom overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Brentan mundhulegel.

Særlige forholdsregler:



Du skal kontakte din læge, hvis du har nedsat leverfunktion.

Hvis du bruger protese, skal du sørge for bedst mulige protesehygiejne.

Hos nyfødte bør dosis deles op og gives i flere små portioner, så gelen ikke tilstopper halsen. Derfor bør du ikke anbringe gelen i den bagerste del af svælget.

Brug af Brentan mundhulegel sammen med mad og drikkevarer

Du må ikke bruge Brentan mundhulegel sammen med mad og drikke.

Brentan mundhulegel bør anvendes efter måltidet.

Vigtig information om øvrige indholdsstoffer i Brentan mundhulegel

Alkohol: Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:



Du må kun bruge Brentan mundhulegel efter lægens anvisning.

Amning:



Du kan amme, selvom du bruger Brentan mundhulegel.

Trafik- og arbejdssikkerhed



Brentan mundhulegel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin



Du skal kontakte din læge, hvis du er i behandling med:

- Blodfortyndende medicin,
- Visse lægemidler mod HIV og kræft,
- Visse kolesterolsænkende midler (statiner),
- Visse beroligende midler,
- Epilepsimedicin,
- Medicin til type 2 diabetes,
- Visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, da varigheden af disse lægemidlers virkning kan blive påvirket, hvis de tages samtidig med, at du bruger Brentan mundhulegel.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BRENTAN MUNDHULEGEL.

Dosering:

Voksne:



62,5 mg ~ 2,5 ml (1/2 måleske) 4 gange daglig

Børn:



Børn over 2 år: 62,5 mg ~ 2,5 ml (1/2 måleske) 4 gange daglig

Børn under 2 år: 31,3 mg ~ 1,25 ml (1/4 måleske) 4 gange daglig

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvordan anvendes Brentan mundhulegel?**Åbning af tuben:**

Tuben åbnes ved, at hættens skrues af, og tubens forsegling brydes ved at trykke spidsen i hættens yderside mod tubens spids.

Til anvendelse i munden:

En forudsætning for, at behandlingen giver tilfredsstillende resultat, er, at lægens forskrift overholdes, og at nedenstående forholdsregler følges:

Spædbørn:

1. Vask hænderne omhyggeligt.
2. Kom derpå Brentan mundhulegel på en finger, og smør gelen på det angrebne område i barnets mund med fingeren.
3. Gentag behandlingen så ofte, som lægen har anvist. Behandlingen fortsættes nogle dage, efter symptomerne er forsvundet, tal eventuelt med lægen.

Voksne og børn over 1 år:

1. Kom Brentan mundhulegel på måleskeen i den mængde, lægen har anvist, og kom derpå gelen i munden.
2. Gelen holdes i munden så længe som muligt, før den synkes.
3. Rengør altid måleskeen efter anvendelse.
4. Gentag behandlingen så ofte, som lægen har anvist.

Protesebærere:

1. Tag protesen ud, og gør den ren.
2. Kom Brentan mundhulegel i den mængde, som lægen har anvist, på den side af protesen, som kommer i kontakt med ganen eller slimhinden.
3. Sæt protesen på plads igen, og behold den overskydende gel i munden så længe som muligt, før den synkes.
4. Gentag behandlingen så ofte, som lægen har anbefalet.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for meget Brentan mundhulegel?

Du skal kontakte lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Brentan,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at bruge Brentan mundhulegel?

Du skal bruge Brentan, så snart du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER

Brentan mundhulegel kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Allergiske reaktioner.

Milde tilfælde af kvalme og diaré kan også forekomme, men der er ikke opgjort hyppighed for dette.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved eller medfører uacceptable gener. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING**Hvordan opbevares Brentan mundhulegel?**

- Opbevar Brentan mundhulegel utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Brentan mundhulegel ved over 25°C.
- Opbevar ikke Brentan mundhulegel koldt.
- Anvend ikke Brentan mundhulegel efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret april/2005



JANSSEN-CILAG

Date: 1. 29-09-2005

2

2.

4.

5.

Date: 1. 29-09-2005

Date: 1. 29-09-2005

2

၈

4.

၆