

Brentan pudder 2%

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Brentan pudder.
3. Sådan skal du bruge Brentan pudder.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Brentan pudder indeholder et svampemiddel.

Anvendelse



Du kan bruge Brentan pudder mod svamp på fødder og andre steder på huden.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER BRENTAN PUDDER

Brug ikke Brentan pudder hvis



- Du er overfølsom over for det aktive stof miconazolnitrat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Brentan pudder.

Særlige forholdsregler



Du må ikke bruge Brentan pudder mod svamp i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning.

Undgå at få Brentan pudder i øjnene.

Du bør stoppe behandlingen, hvis du får tegn på allergi.

Brug af Brentan pudder sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Brentan pudder

Brentan pudder indeholder talcum, som kan give irritation i luftvejene. Undgå så vidt muligt, at børn og spædbørn indånder Brentan pudder.

Graviditet og amning



Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Brentan pudder, når du er gravid.

Amning

Erfaringer med Brentan pudder er endnu begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed



Brentan pudder påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin



Fortæl altid apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlæge-midler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Brentan pudder samtidig med anden medicin.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BRENTAN PUDDER

Dosering



Voksne

Du skal drysse Brentan pudder på og omkring det angrebne hudområde 2 gange daglig.

Du skal fortsætte med at bruge Brentan pudder i 1-2 uger, efter symptomerne er væk.

Børn



Du skal drysse Brentan pudder på og omkring det angrebne hudområde 2 gange daglig.

Du skal fortsætte med at bruge Brentan pudder i 1-2 uger, efter symptomerne er væk.

Du bør ikke bruge Brentan pudder til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hygiejniske forholdsregler

1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde grundigt, før du drysser Brentan pudder på.
2. Du skal sørge for, at de ting, du bruger til det angrebne hudområde (håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), ikke bliver brugt af andre.

Behandling af fødderne

1. Vask fødderne med sæbe og fjern afskallet hud. Tør fødderne omhyggeligt - også mellem tæerne - med et håndklæde, der kun bliver brugt til det.
2. Drys Brentan pudder på og omkring det angrebne hudområde - også mellem tæerne og på fodsålen.
3. Tag rene strømper på efter hver påføring og drys lidt pudder i strømper og sko.
4. Du får den bedste virkning af Brentan, hvis du vasker og skifter strømper hver dag.

Har du brugt for meget Brentan pudder?

Hvis du bruger for meget Brentan pudder, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Brentan pudder. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Har du glemt at bruge Brentan pudder?

Du skal smøre pudder på, når du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER



Brentan pudder kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Hudirritation, kontakteksem, rødme, brændende fornemmelse i huden, nældefeber, hududslæt, kløe.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Brentan pudder utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Brentan pudder efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Brentan pudder indeholder



- Det aktive stof er miconazolnitrat 2%.
- De øvrige indholdsstoffer er: zinkoxid, talcum og siliciumoxid.

Pakningsstørrelser:

Dåse med 20 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Registreringsindehaver
JANSSEN-CILAG A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
B-2340 Beerse
Belgien

Revideret november/2006



JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG

Graphic Services
Tel. Inge Vermeiren : +32 14606915 - Fax CPM : +32 14605157

LEAFLET BRENTAN

Market : DK

Article Number : **P868214C**

Sickcode : 1490

Dimensions : 3P_LUS/I/003/V1 (140x295)

Operator : AND

Pointsize : 8,7 pt

File Name : P868214C.indd (mac)

L A B

■ Black

Date : 1. 09-11-2006
2. 22-11-2006
3.
4.
5.