

# Brentan<sup>TM</sup>, vaginalkapsler, bløde 400 mg og 1,2 g

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

- Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt din læge eller apoteket.
- Lægen har ordineret Brentan vaginalkapsler til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

## Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Brentan vaginalkapsler.
3. Sådan skal du bruge Brentan vaginalkapsler.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

## 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Brentan er et svampedræbende middel.

Du kan bruge Brentan vaginalkapsler mod betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Brentan virker på.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

## 2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER BRENTAN VAGINALKAPSLER

Brug ikke Brentan vaginalkapsler hvis



Du er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Brentan.

## Særlige forholdsregler



Din seksualpartner bør måske også behandles, hvis der er symptomer (f.eks. kløe og rødme). Dette bør ske efter samråd med lægen.

Brug ikke Brentan samtidig med kondom eller pessar, da indholdsstofferne i Brentan kan ødelægge gummet, så præventionen ikke virker.

Brentan misfarver ikke hud og tøj.

## Brug af Brentan vaginalkapsler sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

## Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Brentan vaginalkapsler

Brentan, vaginalkapsler indeholder natriumethylparahydroxybenzoat (E219) og natriumpropylparahydroxybenzoat (E217): Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

## Graviditet og amning



Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

## Graviditet

Du må kun bruge Brentan efter lægens anvisning.

## Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke bruge Brentan. Spørg lægen.

## Trafik- og arbejdssikkerhed



Brentan vaginalkapsler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

## Brug af anden medicin



Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Brentan og /eller Brentan kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen hvis du er i blodfortyndende behandling (med warfarin) eller får medicin mod diabetes eller epilepsi (fenytoin).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

## 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BRENTAN VAGINALKAPSLER

### Dosering



#### Voksne

1 vaginalkapsel (400 mg) ved sengetid i 3 dage eller 1 vaginalkapsel (1,2 g) som engangsdosis ved sengetid.

Du kan bruge Brentan vaginalkapsler, selvom du har menstruation.

### Børn



Du må kun bruge Brentan til børn efter lægens anvisning.

**Brugsanvisning:**

Det er bedst at sætte vaginalkapslen op **ved sengetid**.

1. Vask dine hænder omhyggeligt.
2. Anbring dig i liggende stilling med knæene løftet og spredt og før forsigtigt vaginalkapslen så dybt ind i skeden, som du kan uden at presse.
3. Rester af vaginalkapslen kan sive ud i op til et døgn, efter du har indført den. Du kan eventuelt bruge hygiejnebind.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

**Har du brugt for mange Brentan vaginalkapsler?**

Du skal kontakte lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Brentan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Du må kun bruge Brentan vaginalkapsler på den måde som lægen har anvist. Du må ikke bruge Brentan vaginalkapsler i munden.

**Har du glemt at bruge Brentan vaginalkapsler?**

Du skal bruge Brentan, så snart du kommer i tanke om det.

**4. BIVIRKNINGER**

Brentan vaginalkapsler kan som al anden medicin give bivirkninger.

**Alvorlige bivirkninger**

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af tunge, læber og ansigt og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Ikke alvorlige bivirkninger**

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Smerten som kan føles som krampe i bækkenet.
- Nældefeber, brænden, irritation, allergisk reaktion, kløe, rødme og udslæt (kontaktdermatitis) på det område, hvor du har brugt Brentan.
- Udflåd.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)

**5. OPBEVARING**

- Opbevar Brentan utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Brentan ved over 25°C.
- Brug ikke Brentan efter den udløbsdato, der står på pakningen.

**6. YDERLIGERE INFORMATION**

Aflever altid medicinrester på apoteket.

**Brentan vaginalkapsler indeholder:**

- Det aktive indholdsstof er miconazolnitrat henholdsvis 400 mg og 1,2 g.
- De øvrige indholdsstoffer er: paraffinolie, hvid vaselin, gelatine, glycerol, titandioxid (E171), natriumethylparahydroxybenzoat (E219) og natriumpropylparahydroxybenzoat (E 217).
- Brentan 1,2 g indeholder også lecitin.

**Pakningsstørrelser**

Æske med 1 vaginal kapsel

Æske med 3 vaginalkapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

**Markedsføring i Danmark:**

JANSSEN-CILAG A/S  
Hammerbakken 19  
3460 Birkerød  
E-mail: [info@janssen-cilag.dk](mailto:info@janssen-cilag.dk)

**Fremstiller:**

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  
B-2340 Beerse  
Belgien

Revideret august/2006



**JANSSEN-CILAG**



**JANSSEN-CILAG**

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - Fax CPM: +32 14605157

LEAFLET BRENTAN

Market : DK

Article Number : **362126A**

Sickcode : 459

Dimensions : F/I/061/V1 (100x250) - ROUL011A

Pointsize : 6 pt

Operator : AND

File Name : 362126A.indd (mac)

L A B

■ Black

Date : 1. 23-01-2007

2. 30-01-2007

3.

4.

5.