

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dipiperon® 40 mg tabletter

Pipamperon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Dipiperon til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dipiperon
3. Sådan skal du bruge Dipiperon
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dipiperon tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes antipsykotika og anvendes til behandling af psykotiske tilstande bortset fra depressioner.

Lægen kan have givet dig Dipiperon for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DIPIPERON

Brug ikke Dipiperon

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer eller over for andre butyrophenoner.
- hvis dit nervesystem er svækket som følge af indtagelse af alkohol eller andre midler, som virker sløvende.
- ved bevidsthedssvækkelse.
- hvis du har Parkinsons sygdom.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Dipiperon

Du skal kontakte lægen:

- hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
- hvis du lider af hjertekarsygdomme, forstyrrelser i hjerterytmen eller andre i familien har hjertelidelser.
- hvis du har en depression.
- hvis du er ældre, er du særligt disponeret for at få ufrivillige og ukoordinerede bevægelser. Dosis skal muligvis justeres.
- hvis du har epilepsi eller øget risiko for kramper (f.eks. ved alkoholafvænning eller hjerneskade).

Tal med din læge, hvis du får et af følgende symptomer, mens du bruger Dipiperon:

- uregelmæssig puls
- høj feber, stive muskler, hurtig vejrtrækning, voldsom svedtendens eller nedsat årvågenhed

- trækninger i tunge, ansigt, mund eller kæbe
- rystelser, stivhed, meget sput/savlen, sløvhed, rastløshed, muskeltrækninger
- udslæt over hele kroppen med mundsår og feber.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud..

Dipiperon kan hæmme virkningen af:

- midler mod Parkinsons sygdom (bromocriptin, levodopa)
- midler mod hjertelidelser (dopamin)

Tal med lægen hvis du får:

- lægemidler mod hjertelidelser (kinidin, amiodaron), da der er risiko for hjerterytmeforstyrrelser.
- beroligende midler, sovemedicin, stærke smertestillende midler.
- midler mod højt blodtryk, da risikoen for lavt blodtryk kan øges, hvis du tager Dipiperon.
- midler mod depression (tricykliske antidepressiva).

Hvis dit centralnervesystem er svækket på grund af f.eks. sovemedler, beroligende midler, stærk smertestillende medicin eller alkohol, kan funktionen af nervesystemet blive yderligere nedsat, hvis du samtidig tager Dipiperon.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Dipiperon efter lægens anvisning.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Dipiperon i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din læge.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke bruge Dipiperon.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipiperon kan i mindre eller moderat grad påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dipiperon

Dipiperon indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DIPIPERON

Brug altid Dipiperon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne: Startdosis: 40 mg 2-3 gange daglig i 1 uge.

Vedligeholdelsesdosis: 100-400 mg daglig fordelt på flere doser.

Hvis du har taget for mange Dipiperon tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dipiperon, end der står i her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering:

Muskelstivhed, ukoordinerede bevægelser, rysten og langsomme bevægelser, lavt blodtryk, og/eller nedsat bevidsthed. I sjældne tilfælde påvirkning af hjerterytmen.

Hvis du har glemt at tage Dipiperon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dipiperon

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dipiperon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger med ukendt hyppighed:

- meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjerrestop. Ring 112
- høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (maligt neuroleptika syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112
- kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue
- nedsat kropstemperatur. Kontakt lægen
- vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue
- kramper (inkluderer kramper og grand mal anfald)

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- rykvisse bevægelser, når armen bøjes/strækkes
- bevidsthedssvækkelse

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
- rokkende, vridende bevægelser især med benene
- kramper i øjnene (oculogyrisk krise)
- kramper i rygmuskulaturen
- ufrivillige bevægelser
- opkastning
- nældefeber
- stive, rykvisse bevægelser
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk
- gangforstyrrelser
- kraftesløshed og svaghed
- menstruationsforstyrrelser
- depression

Bivirkninger med ukendt hyppighed:

- blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsnes og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage bryst smerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du søge læge omgående.
- almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
- besvimelse. Ved normal puls og vejtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre

- tilfælde ring 112
- forhøjelse af leverenzymmer
- Vægtøgning
- overfølsomhed
- rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk
- langsomme, ufrivillige bevægelser
- rysten
- udslæt
- mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens
- svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- næseblod
- træthed
- hævelser i ansigt, arme og ben. Kontakt lægen
- feber

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dipiperon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dipiperon indeholder:

- Aktiv stof: Pipamperon. Hver tablet indeholder 40 mg som pipamperonhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse, saccharose, talcum og magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Hvide, runde, flade tabletter med krydsdelekærv med inskriptionen "JANSSEN" på de ene side.

Pakningsstørrelse

Pakningsstørrelse: 40 stk. i blisterpakninger.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

JANSSEN-CILAG A/S
Hammerbakken 19

3460 Birkerød

Fremstiller

Janssen-Cilag S.p.a.

Borgo S. Michele

04010 Latina

Italien

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Januar 2013