

Livostin næsespray, suspension 50 mikrog/dosis

(Levocabastin)

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen.

- Denne medicin kan fås uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som skal læses igennem, inden du bruger Livostin næsespray.
3. Sådan skal du bruge Livostin næsespray.
4. Mulige bivirkninger.
5. Hvordan opbevares Livostin næsespray?
6. Yderligere information.

Hvad indeholder Livostin næsespray?



Det aktive lægemiddelstof er levocabastin. Livostin næsespray indeholder: Levocabastinhydrochlorid svarende til levocabastin 50 mikrog/dosis.

De øvrige indholdsstoffer er: Benzalkoniumchlorid, natriumedetat, propylenglycol, natriumphosphat, vandfri, natriumdihydrogenphosphat monohydrat, methylhydroxypropylcellulose, polysorbit 80 og sterilt vand.

Ansvarlig for markedsføringen i Danmark:

Registreringsindehaver:

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

1. Virkning og anvendelse:

Lægemiddelform: Næsespray, suspension.

Lægemiddelgruppe / virkemåde: Indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i næsen.

Hvad anvendes Livostin næsespray til ?



Du kan bruge Livostin næsespray til at forebygge overfølsomhed, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser sig ved at næsen løber og

er stoppet. Du kan også bruge Livostin næsespray, når næsen løber på grund af anden form for overfølsomhed (allergi).

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som skal læses igennem, inden du bruger Livostin næsespray:

Brug ikke Livostin næsespray hvis:



- du ved, at du er overfølsom over for et eller flere af indholdsstofferne.

Særlige forholdsregler:



Du må ikke bruge Livostin næsespray til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Brug af Livostin næsespray sammen med mad og drikkevarer

Du kan bruge Livostin næsespray sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Livostin næsespray:

Benzalkoniumchlorid: Virker irriterende og kan medføre hudirritationer.

Graviditet og amning:



Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du må kun bruge Livostin næsespray efter lægens anvisning.

Amning: Du kan amme, selv om du bruger Livostin næsespray.

Trafik og arbejdssikkerhed:

Livostin næsespray påvirker normalt ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Livostin næsespray kan dog på enkelte godt virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Forsigtighed ved anden, samtidig anvendelse af lægemidler eller andet:



Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt anden medicin for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du bruge Livostin næsespray.

Dosering:

Voksne og børn over 2 år:



100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange daglig. I svære tilfælde kan dosis øges til 2 pust 3-4 gange daglig.

Børn under 2 år:

Du må kun bruge Livostin næsespray til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Hvis du ikke får det bedre, bør du kontakte lægen.


Hvis du har været i kontakt med din læge, og lægen foreskriver en anden dosering, skal du følge den dosering, som lægen foreskriver.

Livostin næsespray er en mikrosuspension og skal derfor rystes før brug.

Du skal pudse næsen, før næsesprayen anvendes og inhalere gennem næsen, medens der pustes.

Hvordan anvendes Livostin næsespray:

1. Puds næsen.
2. Ryst beholderen godt og fjern beskyttelseshætten.
3. Før sprayen anvendes første gang, skal du pumpe nogle få gange til der opnås en fin forstøvning.
4. Hold sprayflasken lodret, som vist på tegningen. Bøj hovedet let forover. Hold for det ene næsebor, og anbring sprayens spids i det andet.
5. Pump 2 gange samtidigt med, at du trækker vejret ind gennem næseboret.
6. Gentag proceduren i det andet næsebor.



Har du brugt for meget Livostin næsespray:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Livostin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Har du glemt at bruge Livostin næsespray:

Hvis du er kommet til at springe en dosis over, fortsætter du bare med den næste dosis. Du skal ikke bruge dobbeltdosis.

4. Mulige bivirkninger



Livostin næsespray kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (ses hos 1-10 ud af 10 000 patienter):

Hurtig puls (takykardi), hjertebanken eller for højt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (ses hos mindre end 1 ud af 10 000 patienter):

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever en af ovennævnte bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (ses hos 1-10 ud af 100 patienter):

Hos ca. 5% af patienterne ses en forbigående let irritation af næseslimhinden lige efter applikationen.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge din læge eller på apoteket.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved eller medfører uacceptable gener. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du kan finde skema og vejledning på: www.laegemiddelstyrelsen.dk/laegemiddel/bivirkninger/indberetning/msk.asp

5. Hvordan opbevares Livostin næsespray?



Livostin næsesprayen skal opbevares utilgængeligt for børn og må ikke opbevares over 25°C.

Anvend ikke Livostin næsespray efter den udløbsdato (måned - år), der er trykt på pakningen efter »Anv. senest«.

6. Yderligere information

Afløber altid medicinrester eller medicin, hvor udløbsdatoen er overskredet, på apoteket.

Seneste revision af brugerinformationen: December 2003



JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG

ET&D Prepress

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - Fax CPM: +32 14605157

LEAFLET LIVOSTIN

Article Number : 260127

Dimensions : 134x204 (B/I/004/V1)

Pointsize : 7,6 pt

File Name : 260127.indd (MAC)

Market : DK

Sickcode : 1035

Operator : guy

Marleen

■ Black

L A B

Date : 1. 24-03-2004
2. 31-03-2004
3. 02-04-2004
4. 13-04-2004
5.