

Indlægsseddel

Information til brugeren

Betnovat® med chionoform creme og salve

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. Du får muligvis behov for at læse den igen.

Kontakt din læge eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål.

Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt. Du bør ikke give det videre til andre. Det kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som dine egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apoteket.

1. Virkning og anvendelse

Betnovat indeholder et stærktvirkende steroid (binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse. Chionoform virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe.

Betnovat med chionoform anvendes til behandling af udslæt, eksem og psoriasis, når huden samtidig er betændt.

Betnovat med chionoform salve bruges især ved tørre hudforandringer med afskalning.

Betnovat med chionoform creme anvendes ved væskende hudforandringer.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Betnovat med chionoform

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Betnovat med chionoform,

- hvis du er overfølsom over for de aktive stoffer, iod eller et af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat med chionoform.
- ved hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.
- ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- ved akne (bumser).
- ved betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- ved åbne sår med betændelse (kun efter lægens anvisning).
- ved virusinfektioner som f.eks. herpes og skoldkopper.
- til børn under et år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler

- Bør ikke anvendes til langvarig behandling, især hos børn og spædbørn.
- Hvis der forekommer irritation, anden hudreaktion eller infektionen spredes skal behandlingen straks afbrydes.
- Tætsluttende forbindelse eller plaster skal undgås ved eksem med infektion.
- Behandling af sarte hudområder som ansigt, øjenregion, armhuler, lyske, ved endetarmsåbningen og på kønsdelene skal ske med forsigtighed og i kun kort tid. Undgå at få Betnovat med chionoform i øjnene.

- Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.
- Betnovat med chionoform kan sløre, aktivere og forværre en hudreaktion.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun bruge Betnovat med chionoform efter lægens anvisning.

Amning

Du kan bruge Betnovat med chionoform i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen. Du bør ikke bruge Betnovat med chionoform på brystet, mens du ammer.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat med chionoform

Betnovat med chionoform creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) samt chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Betnovat med chionoform

Betnovat med chionoform bør altid bruges i nøje overensstemmelse med lægens instruktioner. Du bør konsultere din læge eller apoteket, hvis du er usikker.

Voksne: Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1 – 3 gange daglig.

Børn: Efter lægens anvisning.

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det er hænderne, som behandles.

Vær opmærksom på, at Betnovat med chionoform kan misfarve hud, hår og tøj

Har du brugt for meget Betnovat med chionoform?

Overdosering er usandsynlig, men i tilfælde af langvarig overdreven brug ses øget behåring, blålige striber i huden, øget pigmentering og nedsat kalium i blodet.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Betnovat med chionoform, end der står skrevet i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Har du glemt at bruge Betnovat med chionoform?

Smør et tyndt lag Betnovat med chionoform på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

Spørg din læge eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål

4. Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Betnovat med chionoform have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding.

Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Brændende fornemmelse, hudkløe.

Ikke almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Udslæt i ansigtet (rosacea), bristede blodkar, rødme, hudblødning.

Meget sjælden (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner, tynd hud, striber i underhuden, pigmentforandringer, øget behåring, forværring af symptomer, allergisk kontakteksem, psoriasis med pusfyldte blærer, udvidelse af små blodkar.

Symptomer på øget binyrebarkfunktion. Langvarig brug af meget store doser kan føre til hæmning af binyrebarkfunktionen og give de nævnte bivirkninger.

Der kan endvidere forekomme sløring og forværring af hudinfektioner, udslæt omkring munden, akne (bumser) samt udslæt med små blærer.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apoteket. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Betnovat med chionoform efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

6. Yderligere Information

Betnovat med chionoform creme indeholder:

De aktive indholdsstoffer er betamethason og clioquinol

De øvrige indholdsstoffer er hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphat dihydrat, chlorcresol, phosphorsyre eller natriumhydroxid (surhedsegulerende) og rensset vand.

Betnovat med chionoform salve indeholder:

Det aktive indholdsstof er betamethason.

De øvrige indholdsstoffer er paraffinolie og hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelse:

Både creme og salve er svag gul.

Creme og salve findes i tuber med 30 g.

Markedsføring i Danmark:

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: info@glaxosmithkline.dk

Fremstiller:

Glaxo Operations, Barnard Castle, England.

Revideret december 2006

GSK logo