

Indlægsseddel

Information til brugeren

Kemadrin® 5 mg tabletter Procyclidinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Kemadrin til dig personligt. Lad derfor være med at give Kemadrin til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Kemadrins virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kemadrin
3. Sådan skal du tage Kemadrin
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Kemadrin
6. Yderligere oplysninger

1. Kemadrins virkning og hvad du skal bruge det til

Kemadrin er et antikolinergikum, der virker ved at hæmme ufrivillige bevægelser og muskelstivhed.

Kemadrin anvendes til behandling af parkinsonisme (rystelammelse).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kemadrin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Kemadrin

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har ubehandlet grøn stær (snævervinklet glaukom).
- hvis du har problemer med at lade vandet og ikke modtager behandling for dette.
- hvis din mavetarmkanal er tilstoppet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Kemadrin

Din læge vil følge dig nøje

- hvis du lider af hurtig hjerterytme.
- hvis du lider af højt blodtryk.
- hvis du er disponeret for at få grøn stær.
- hvis du er disponeret for at få tilstopninger i mavetarmkanalen.
- hvis du har problemer med at lade vandet pga. forstørret prostata.
- hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
- hvis du er i behandling med lægemidler, som virker hæmmende på nervesystemet.

Kemadrin kan have en euforiserende effekt. Du må kun stoppe eller ændre behandlingen efter aftale med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Følgende lægemidler kan forstærke virkningen af Kemadrin

- monoaminoxidase-hæmmere (mod depression).
- antihistaminer (mod transportsyge og allergi).
- phentiaziner (mod psykoser).
- tricycliske antidepressiva (mod depression).
- paroxetin (mod depression).

Kemadrin kan påvirke effekten af

- levodopa (mod parkinson).
- metoclopramid (mod forstoppelse, kvalme og opkastning).
- quinidin (mod malaria).
- ketoconazol (mod svamp).

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Kemadrin, og/eller Kemadrin kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket.

Brug af Kemadrin sammen med mad og drikke

Du kan tage Kemadrin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid må kun tage Kemadrin efter lægens anvisning.

Erfaringerne med Kemadrin er begrænsede. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Kemadrin, hvis du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Kemadrin kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kemadrin

Kemadrin tabletter indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Kemadrin

Tag altid Kemadrin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Voksne: Den sædvanlige startdosis er 2,5 mg 3 gange dagligt. Denne dosis øges hver 2.-3. dag med 2,5-5 mg dagligt indtil den ønskede virkning opnås. Den maksimale dagsdosis er 12 tabletter (60 mg).

Ældre: Det kan her være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Kemadrin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Kemadrin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er uro, rastløshed, forvirring, søvnløshed, hallucinationer og hurtig hjerterytme. Pupillerne er ofte udvidede og langsomt reagerende. Ved alvorlig overdosering er symptomerne sygeligt søvnbehov, bevidstløshed og koma.

Hvis du har glemt at tage Kemadrin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Kemadrin

Det er vigtigt, at du ikke pludseligt stopper behandlingen med Kemadrin fra den ene dag til den anden. Behandlingen afsluttes normalt ved gradvist at reducere dosis. Følg lægens anvisninger.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Kemadrin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Forstyrrelser i øjets evne til at indstille sig efter afstanden, mundtørhed, forstoppelse, vandladningsbesvær.

Ikke almindelig (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Svimmelhed, nedsat hukommelse, nedsat indlæringsevne, kvalme, opkastning, tandkødsbetændelse, udslæt, uro, angst, nervøsitet, forvirring, desorientering, hallucinationer.

Sjælden (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): psykotiske symptomer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Sådan opbevarer du Kemadrin

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Kemadrin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Kemadrin tabletterne skal senest anvendes 3 måneder efter åbning af tabletglasset.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kemadrin indeholder

Aktivt stof: Procyclidinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Laktosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon, magnesiumstearat.

Kemadrins udseende og pakningsstørrelse

Kemadrin 5 mg er en hvid, let buet tablet med delekærv og mærket "S3A" og "WELLCOME".

Brunt tabletglas: 100 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: info@glaxosmithkline.dk

Fremstiller

Glaxo Wellcome, Bad Oldesloe, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2007

GSK logo

Yderligere information om Kemadrin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk