

PEVARYL® DEPOT vagitorier 150 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen.

- Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt din læge eller apoteket.
- Lægen har ordineret Pevaryl Depot til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Pevaryl Depot.
3. Sådan skal du bruge Pevaryl Depot.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Pevaryl Depot vagitorier er et svampedræbende middel.

Du kan bruge Pevaryl Depot mod betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Pevaryl Depot virker på.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER PEVARYL DEPOT

Brug ikke Pevaryl Depot hvis



- Du er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Pevaryl Depot.

Særlige forholdsregler



Brug ikke Pevaryl Depot samtidig med kondom eller pessar, da indholdsstofferne i Pevaryl Depot kan ødelægge gummiet, så præventionen ikke virker.

Hvis du bruger sæddræbende midler samtidig med Pevaryl Depot, skal du kontakte lægen, da Pevaryl Depot kan ødelægge det sæddræbende middel.

Du må ikke bruge Pevaryl Depot til behandling af andre former for svamp, end den lægen har ordineret det til.

Du skal stoppe behandlingen, hvis du får tegn på allergi eller irritation.

Hvis du er allergisk over for Pevaryl Depot kan det være, at du også er allergisk over for lignende svampemidler. Tal med lægen.

Undgå at få Pevaryl Depot i øjnene eller munden.

Brug af Pevaryl Depot sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Graviditet og amning



Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun bruge Pevaryl Depot under graviditeten efter aftale med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke bruge Pevaryl Depot. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed



Pevaryl Depot påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin



Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Pevaryl Depot og /eller Pevaryl Depot kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (warfarin, acenocoumarol).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PEVARYL DEPOT



Dosering



Voksne

1 vagitorie 1 gang ved sengetid.

Børn



Følg lægens anvisning.

Du får det bedste resultat ved at følge lægens anvisning og vejledningen herunder. Du kan bruge Pevaryl Depot, selvom du har menstruation.

Brugsanvisning:

Du skal tage vagitoriet ud af plastikstrippen ved at trække folierne fra hinanden ved den spidse ende af vagitoriet.

1. Det er bedst at sætte vagitoriet op **ved sengetid**.
2. Vask dine hænder omhyggeligt først.
3. Anbring dig i liggende stilling med knæene løftet og spredt og før forsigtigt vagitoriet så dybt ind i skeden som muligt med en finger.
4. Du kan eventuelt bruge hygiejnebind, da rester af vagitoriet kan sive ud i et døgn, efter du har sat vagitoriet op.

Hvis din partner også er smittet, skal han tale med lægen om også at blive behandlet.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for mange af Pevaryl Depot?

Du skal kontakte lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Pevaryl Depot end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du kommer til at spise Pevaryl Depot kan du få kvalme, opkastninger og diaré.

Har du glemt at bruge Pevaryl Depot ?

Du skal bruge Pevaryl Depot, så snart du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER

Pevaryl Depot kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af tunge, læber og ansigt og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Nældefeber, allergisk reaktion, kløe, rødme og udslæt (kontaktdermatitis) på det område, hvor du har brugt Pevaryl Depot.

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, så bivirkningerne kan blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved eller medfører uacceptable gener. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Pevaryl Depot utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Pevaryl Depot ved over 30°C.
- Brug ikke Pevaryl Depot efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Pevaryl Depot vagitorier indeholder

- Det aktive indholdsstof er econazolnitrat 150 mg.
- De øvrige indholdsstoffer er: Polygel; witepsol H 19; wecabee FS; vandfri, kolloid silica; stearylheptanoat.

Pakningsstørrelser

Pakning med 1 vagitorie.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

Revideret august/2006



JANSSEN-CILAG

© J-C 2007

CILAG SCHIAFFHAUSEN

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - Fax CPM: +32 14605157

LEAFLET PEVARYL

Market : DK

Article Number : **20408C**

Sickcode : 703

Dimensions : PP 2553B (148x210)

Operator : AND

Pointsize : 8 pt

File Name : 20408C.indd (mac)

L A B

 **Black**

Date : 1. 05-03-2007

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.