

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mycostatin oral suspension

100.000 IE /ml

Nystatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mycostatin
3. Sådan skal du bruge Mycostatin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Mycostatin oral suspension er et svampemiddel. Mycostatin oral suspension virker på flere svampearter. Mycostatin oral suspension anvendes til behandling af svamp i mund og mavetarmkanalen.

Det virksomme stof, nystatin, optages ikke i kroppen, men virker lokalt på slimhinder i mundhulen og i mavetarmkanalen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mycostatin

Brug ikke Mycostatin

- hvis du er allergisk over for det aktive stof (nystatin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Mycostatin oral suspension bør kun anvendes til behandling af svamp i mund, svælg og mavetarmkanalen.

Mycostatin oral suspension bør ikke anvendes til behandling af systemiske svampeinfektioner.

Ved forekomst af irritation eller overfølsomhedsreaktioner bør du afbryde behandlingen. Kontakt din læge.

Brug af anden medicin sammen med Mycostatin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Mycostatin sammen med mad og drikke

Mycostatin oral suspension skal anvendes efter et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan anvende Mycostatin oral opløsning under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du anvender Mycostatin oral opløsning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin oral suspension påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Mycostatin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218)

Mycostatin oral suspension indeholder konserveringsmidlet methylparahydroxybenzoat (E218) som kan give allergiske reaktioner, som også kan optræde efter behandlingens ophør.

3. Sådan skal du bruge Mycostatin

Brug altid Mycostatin nøjagtigt efter lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Flasken bør rystes inden brug.

Svampeinfektion i munden:

Voksne, børn (over 2 år), spædbørn (1 måned til 2 år) og nyfødte (fra fødslen til 1 måned):

1 ml 4 gange dagligt.

Den normale behandlingstid ved svamp i mundhulen er 1-2 uger.

Lægen kan anbefale større dosis.

Du bør indtage Mycostatin efter et måltid. Du skal holde suspensionen i munden så længe som muligt, før du synker den.

Hos spædbørn kan du give suspensionen dråbevis eller fortynde den med vand og smøre den på det angrebne område.

Svampeinfektion i mavetarmkanalen

Voksne:

5 ml 3 gange dagligt.

Lægen kan anbefale større dosis.

Børn, nyfødte og spædbørn (1 måned til 2 år):

1 ml 4 gange dagligt.

Du skal sluge suspensionen straks.

For at undgå et tilbagefald skal behandlingen fortsættes i 2-3 dage efter at symptomerne er væk.

Hvis du har taget for meget Mycostatin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mycostatin oral suspension, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastninger og diarré.

Hvis du har glemt at tage Mycostatin

Indtag den glemte dosis så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjælden til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1-10 ud af 10.000 patienter):
Stevens-Johnsons syndrom: Alvorlig hudlidelse ledsaget af feber og ledproblemer med blæreformede udslæt. Kontakt læge eller sygehus.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):

Overfølsomhed og hævelser i hud og slimhinder (angioødem), en reaktion hvor ansigt og hals kan svulme op.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 patienter):

Kvalme, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser, diarré, udslæt og nældefeber.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Mycostatin utilgængeligt for børn.

Opbevar Mycostatin i køleskab (2° C til 8° C).

Den åbne flaske kan opbevares ved stuetemperatur (15° C til 25 ° C) i højst en måned.

Brug ikke Mycostatin efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Mycostatin oral suspension indeholder:

- Det aktive indholdsstof i Mycostatin oral suspension er nystatin.
- De øvrige indholdsstoffer er: xylitol 200 mg, carmellosenatrium, methylparahydroxybenzoat (E218), pebermynteolie og vand.

Udseende

Mycostatin oral suspension er gul og har pebermyntesmag.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna
Sverige

Fremstiller

Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Importgatan 20
SE-401 20 Göteborg
Sverige

Repræsentant i Danmark

Bristol-Myers Squibb
Lyngby Hovedgade 98
2800 Lyngby

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2014