

Terbutalinsulfat Paranova 0,5 mg/dosis inhalationspulver

terbutalinsulfat

0588435903

Terbutalinsulfat Paranova svarer til lægemidlet Bricanyl®.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 - Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 - Lægen har ordineret Terbutalinsulfat Paranova til Dem personligt. Lad derfor være med at give Terbutalinsulfat Paranova til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 - Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Terbutalinsulfat Paranova
3. Sådan skal De bruge Terbutalinsulfat Paranova
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Terbutalinsulfat Paranova indeholder et inhalationspulver, der følger med indåndingsluften ned i lungerne, når De trækker vejret dybt gennem mundstykket.

Virkemåde

Terbutalinsulfat Paranova indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige forsnævring i bronkierne, som op-træder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Terbutalinsulfat Paranova virker i løbet af få minutter, og virkningen varer i ca. 6 timer.

Anvendelse

De skal bruge Terbutalinsulfat Paranova til behandling af astmaanfald og andre former for vejtrækningsbesvær. De skal kun bruge Terbutalinsulfat Paranova, når De har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Terbutalinsulfat Paranova forebyggende.

Lægen kan have givet Dem Terbutalinsulfat Paranova for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE TERBUTALINSULFAT PARANOVA

Tag ikke Terbutalinsulfat Paranova:

- hvis De er overfølsom overfor terbutalinsulfat.

Vær ekstra forsigtig med at tage Terbutalinsulfat Paranova

Tal med lægen hvis De:

- er i behandling med digoxin.
- har sukkersyge.
- har for højt stofskifte.
- er gravid.

Såfremt De lider af en hjertesygdom, bør De kontakte Deres læge, hvis De oplever brystsmærter, åndenød eller andre symptomer på forværret hjertesygdom, når De bruger Terbutalinsulfat Paranova.

Hvis De har svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis De samtidig tager vanddrivende medicin, binyrebarkhormoner eller astmamedicin med theophyllin.

Kontakt Deres læge, hvis medicinen ikke har samme virkning, som den plejer og De får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller hvis Deres forbrug af Terbutalinsulfat Paranova stiger.

Ved inhalation af terbutalinsulfat vil en smule af lægemidlet sætte sig i munden. For at undgå gener og bivirkninger herfra, bør munden skylles med vand efter hver inhalation.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Terbutalinsulfat Paranova. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

- medicin mod forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere).
- medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (digoxin).
- medicin mod grøn stær (visse øjendråber).
- andre midler til behandling af astma (f.eks. theophyllin).
- vanddrivende midler.
- binyrebarkhormoner.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De kan bruge Terbutalinsulfat Paranova under graviditet. Der bør dog udvises forsigtighed i første trimester af graviditeten.

Tal med lægen. Terbutalinsulfat Paranova kan hæmme verner under fødslen.

Amning

Terbutalinsulfat Paranova går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade Deres barn. Barnet kan få bivirkninger i form af irritabilitet og hurtig puls. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbutalinsulfat Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE TERBUTALINSULFAT PARANOVA

Brug altid Terbutalinsulfat Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

De bør kun bruge Terbutalinsulfat Paranova, når De har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling. De bør gå til regelmæssig kontrol for at få tjekket Deres inhalationsteknik.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 sug a 0,5 mg fire gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan De tage op til 3 sug a 0,5 mg under samme anfald. De bør ikke tage mere end 12 sug a 0,5 mg i døgnet.


Børn fra 10 år: 1 sug a 0,5 mg to gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan et barn tage op til 2 sug a 0,5 mg under samme anfald. Et barn bør ikke tage mere end 8 sug a 0,5 mg i døgnet.

Børn 3-10 år: 1 inhalation a 0,25 mg 3 gange daglig. Hvis det er nødvendigt kan barnet tage op til 4 inhalationer (1 mg) ved samme anfald. Et barn bør ikke tage mere end 16 inhalationer (4 mg daglig). Denne dosering til børn 3-10 år er ikke mulig med Terbutalinsulfat Paranova.

BRUGSANVISNING

Sådan anvendes Terbutalinsulfat Paranova

1. Beskyttelseshætten skrues af.
2. Hold Terbutalinsulfat Paranova lodret med det farvede bundstykke nedad. Bundstykket drejes én gang frem og tilbage.



3. Pust ud. Der må IKKE pustes ud i Terbutalinsulfat Paranova.


4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring. Tag så dyb og kraftig en indånding som muligt gennem munden.



5. Tag Terbutalinsulfat Paranova fra munden og ånd langsomt ud.

6. Hvis lægen har ordineret mere end én dosis, gentages behandlingen fra punkt 2-5.

7. Beskyttelseshætten skrues tæt på.



De må ikke tygge eller bide i mundstykket eller anvende Terbutalinsulfat Paranova, hvis den er defekt eller mundstykket har løsnet sig.

Det er ikke sikkert, at De kan smage eller føle medicinen, da det er en meget lille mængde, der bliver indåndet.

Terbutalinsulfat Paranova afgiver ved korrekt brug altid én dosis terbutalin - også selv om der er drejet flere gange.

Terbutalinsulfat Paranova er forsynet med en dosisindikator (se tegning).



Når det røde mærke kommer til syne øverst i dosisindikator-ten, er der ca. 20 doser tilbage. Dosisindikatoren tæller antal klik. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Terbutalinsulfat Paranova tom, og De skal kassere den. I bunden af Terbutalinsulfat Paranova er der et tørremiddel. Den lyd der kommer, når De ryster Terbutalinsulfat Paranova, stammer fra dette tørremiddel og ikke fra medicinen.

Rengør ikke mundstykket med vand, da fugt får inhalations-pulveret til at klumpe sammen. Rengør i stedet mundstykket med en tør klud.

Hvis De har brugt for meget Terbutalinsulfat Paranova inhalationspulver

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Terbutalinsulfat Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er hjertebanken, uregelmæssig puls, evt. blodtryksfald (besvimelse), angst, hovedpine, kvalme, længerevarende muskelkrampe og/eller rysten.

Hvis De har glemt at bruge Terbutalinsulfat Paranova

Terbutalinsulfat Paranova bør kun anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling.

Hvis De holder op med at bruge Terbutalinsulfat Paranova

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring af eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Terbutalinsulfat Paranova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmaligende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet (brystsmerter). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hovedpine.
- Rysten.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Hjertebanken.
- Længerevarende muskelkrampe.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, uro og rastløshed.
- Nældefeber og udslæt.
- Kvalme.
- Ekstra hjerteslag.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Terbutalinsulfat Paranova utilgængeligt for børn.
- Opbevar Terbutalinsulfat Paranova tørt.
- Opbevar Terbutalinsulfat Paranova med beskyttelseshætten skruet tæt til.
- De kan opbevare Terbutalinsulfat Paranova ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Terbutalinsulfat Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Terbutalinsulfat Paranova 0,5 mg/dosis inhalationspulver indeholder:

Aktivt stof: Terbutalinsulfat 0,5 mg/dosis.

Terbutalinsulfat Paranova indeholder ingen øvrige indholdsstoffer.

Terbutalinsulfat Paranovas udseende og paknings-størrelse:

Terbutalinsulfat Paranova er en flerdosis, inspirationsaktiveret pulverinhalator indeholdende et hvidt pulver. Inhalatoren indeholder enten 100 eller 200 doser. Inhalatoren er fremstillet af plastikdele. Terbutalinsulfat Paranova findes i pakningsstørrelsen 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2011.