

Tertensif® Retard 1,5 mg, depottabletter

indapamid

0384985904

Tertensif® Retard svarer til lægemidlet Natrilix® Retard

Tertensif® er et registreret varemærke, som tilhører Biofarma, Frankrig

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Tertensif® Retard til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Tertensif® Retards virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Tertensif® Retard
3. Sådan skal De tage Tertensif® Retard
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Tertensif® Retard
6. Yderligere oplysninger

1. Tertensif® Retards virkning og hvad De skal bruge det til

- Tertensif® Retard depottabletter virker længere end almindelige tabletter.
- Tertensif® Retard virker vanddrivende og nedsætter blodtrykket.
- De kan bruge Tertensif® Retard til behandling af for højt blodtryk.

Lægen kan have givet Dem Tertensif® Retard til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Tertensif® Retard

Tag ikke Tertensif® Retard, hvis De:

- er overfølsom over for indapamid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- er overfølsom over for medicin mod blærebetændelse (sulfonamider).
- har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion.
- har en meget alvorlig leversygdom med ændret bevidsthed, træthed, søvnløshed, uro, rysten (hepatisk encefalopati).
- har lavt kaliumindhold i blodet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Tertensif® Retard

Tal med lægen, inden De tager Tertensif® Retard, hvis De:

- har nedsat leverfunktion eller alvorlig leversygdom (cirrose).

- har forstyrrelser i væske- og saltbalancen.
- har nedsat nyrefunktion.
- har dårligt hjerte.
- er underernæret.
- har sukkersyge. Hvis De har sukkersyge, er det vigtigt, at De måler Deres blodsukker.
- har urinsyregigt (podagra).
- har forhøjet kalkindhold (calcium) i blodet.

I nogle tilfælde er det set øget følsomhed overfor sollys i forbindelse med behandling med lægemidler som Tertensif® Retard. Tal med lægen, hvis De oplever dette.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Tertensif® Retard. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Tertensif® Retard står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer. Spørg lægen.

Brug af anden medicin

Tal med Deres læge, hvis De tager

- medicin mod mani-depressiv sygdom (lithium).
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva fx amitriptylin, nortriptylin).
- medicin mod psykoser (fx chlorpromazin, sulpirid, haloperidol).
- medicin mod allergi (mizolastin).
- medicin mod smerter (fx ibuprofen, celecoxib, diclofenac, acetylsalicylsyre i høje doser).
- medicin for hjertet eller blodtrykket (digoxin eller ACE-hæmmer fx perindopril, ramipril, trandolapril).
- medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (fx sotalol, amiodaron).
- Antibiotika (erythromycin, moxifloxacin)
- vanddrivende medicin.
- medicin mod sukkersyge (metformin).
- medicin mod spastiske sygdomme (baclofen).
- afføringsmidler (cisaprid).
- binyrebarkhormon.
- medicin efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus).

Hvis De skal have indsprøjtning af antibiotikum (erythromycin), svampemiddel (amphotericin B) eller kontrastmidler ved røntgenundersøgelse, skal De fortælle lægen, at De tager Tertensif® Retard.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Tertensif® Retard sammen med mad og drikke

De kan tage Tertensif® Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Tertensif® Retard, hvis De er gravid.

Amning

De må ikke tage Tertensif® Retard, hvis De ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Tertensif® Retard kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tertensif® Retard

Tertensif® Retard indeholder lactose.

Kontakt lægen, før De tager tabletterne, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Tertensif® Retard

Tag altid Tertensif® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne: Den sædvanlige dosis er 1 tablet 1 gang daglig om morgenen (for at undgå vandladning om natten).

De må ikke tygge depottabletten, men skal synke den hel. Husk at drikke et glas vand.

Ældre: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge: Sikkerhed og virkning ved brug af Tertensif® Retard til børn og unge kendes ikke. De må derfor ikke anvende Tertensif® Retard til børn og unge.

Nedsat lever- og nyrefunktion

De må ikke tage Tertensif® Retard, hvis De har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Tertensif® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Tertensif® Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er kvalme,

opkastning, svimmelhed på grund af for lavt blodtryk, kramper, sløvhed, forvirring, meget stor, evt. aftagende eller ophørt vandladning.

Hvis De har De glemt at tage Tertensif® Retard

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis De holder op med at tage Tertensif® Retard

De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Fortæl det straks til lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandling med Tertensif® Retard er stoppet.

4. Bivirkninger

Tertensif® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Svaghed og kraftløse muskler på grund af nedsat kaliumindhold i blodet. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlig allergisk opsvulmning af hud og slimhinder, fx i ansigt og af til i mundhulen og struben. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorlig allergisk reaktion i huden evt. med afstødning af huden, evt. ledsaget af feber og ledproblemer i nogle tilfælde alvorlig, med blæreformede udslæt og betændelsesreaktioner. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
- Uregelmæssig puls, uregelmæssig hjerterytme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Nyresvigt. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Unormal leverfunktion. Kontakt straks læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Hvis De har nedsat leverfunktion, kan De udvikle en hjernesygdom (hepatisk encefalopati) med træthed, søvnløshed, uro og rysten. Kontakt straks læge.
- Hvis De har lupus erythematosus disseminatus (en sygdom med led- og

muskelmerter, feber og udslæt), kan Deres sygdom blive forværret.

- Forhøjet blodsukker. Kontakt lægen.
- Forhøjet indhold af urinsyre i blodet. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Hududslæt i afgrænsede små pletter (optræder oftere hos patienter, der i forvejen har allergi eller astma).

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- Opkastning.
- Mindre blødninger i hud og slimhinder (optræder oftere hos patienter, der i forvejen har allergi eller astma).

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svimmelhed på grund af lavt blodtryk.
- Træthed, hovedpine.
- Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
- Kvalme. Forstoppelse. Mundtørhed.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Utilpashed på grund af forstyrrelser i væske- og saltbalancen (kan blive alvorligt). Kontakt lægen.
- Øget følsomhed overfor sollys.

Tertensif® Retard kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver og blodsukker, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5. Sådan opbevarer De Tertensif® Retard

Opbevar Tertensif® Retard utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tertensif® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Tertensif® Retard 1,5 mg, depottabletter indeholder:

- Aktivt stof: Indapamid 1,5 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica, hypromellose, lactose, magnesiumstearat, povidon, glycerol, macrogol 6000, titandioxid (E 172).

Tertensif® Retards udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Tertensif® Retard er en hvid, rund depottablet.

Pakningsstørrelse
90 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen
Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:
Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2007