



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hyperiforce Tabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Hyperiforce er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge vejledningerne for Hyperiforce.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hyperiforce
3. Sådan skal du tage Hyperiforce
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Hyperiforce er et naturlægemiddel. Tabletterne indeholder et ekstrakt af planten prikbladet perikum.

Hyperiforce anvendes til behandling af nedtrykthed, modløshed og tristhed.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Hyperiforce for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HYPERIFORCE

Tag ikke Hyperiforce

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for prikbladet perikum eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon)
- hvis du får medicin til behandling af HIV (proteasehæmmere, non-nukleosid reverse transkriptasehæmmere)
- hvis du får lægemidler, der undertrykker immunforsvaret, f.eks. i forbindelse med organtransplantation eller ved svær sygdom (ciclosporin, tacrolimus).

Hyperiforce indeholder sojapolysaccharider, der kan indeholde sojaprotein. Sojapolysaccharider kan udløse allergiske reaktioner, men formentlig kun hos patienter, der er særligt overfølsomme over for jordnødder (peanuts) eller soja.

Vær ekstra forsigtig med at tage Hyperiforce

Hvis symptomerne forværrer eller fortsat er til stede efter 4-6 ugers behandling, skal du kontakte lægen.

Tal med lægen inden du tager Hyperiforce:

- hvis du har eller har haft manio-depressiv sygdom (skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning)
- hvis du har øget lysfølsomhed. Personer med lys hud bør undgå solbadning under behandling med prikbladet perikum
- hvis du tager anden medicin.
- Behandling med perikum bør afbrydes mindst 10 dage før planlagt operation grundet eventuelle interaktioner med lægemidler anvendt i forbindelse med bedøvelse.

I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Hyperiforce. Tal med din læge:

- hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion
- hvis du har anden alvorligere sygdom
- hvis du tager anden medicin (se punktet "Brug af anden medicin").

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Virkningen af Hyperiforce kan være til stede i mindst 2 uger efter at du er ophørt med behandlingen. Hvis du også tager et andet lægemiddel, der indeholder prikbladet perikum, kan indholdet i blodet af dette lægemiddel øges. Det kan være nødvendigt at justere doser.

Du bør ikke tage Hyperiforce, hvis du er i behandling med følgende:

- blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon)
- medicin til behandling af HIV (proteasehæmmere, non-nukleosid reverse transkriptasehæmmere)
- lægemidler, der undertrykker immunforsvaret, f.eks. i forbindelse med organtransplantation eller ved svær sygdom (ciclosporin, tacrolimus).

Tal med lægen, hvis du tager:

- hjertemedicin (digoxin, ivabradin, calciumantagonister som f.eks. verapamil)
- p-piller. Hyperiforce nedsætter p-pillernes virkning
- medicin mod svamp (af typen azolsvampemidler f.eks. voriconazol)
- medicin mod kræftsygdomme (f.eks. imatinib, irinotecan)
- medicin mod stærke smerter eller afvænnning fra stofmisbrug (methadon)
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
- medicin mod astma (theophyllin)
- medicin mod for meget mavesyre/mavesår (syrepumpehæmmere, f.eks. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol)
- medicin mod for højt fedtindhold i blodet (statiner, f.eks. atorvastatin, simvastatin)
- sovemedicin (midazolam)
- medicin mod migræne (triptaner, f.eks. sumatriptan)
- medicin mod depression (SSRI, tricykliske antidepressiva, nootropica (methylphenidat))
- medicin til behandling af ADHD





Øget lysfølsomhed er en bivirkning ved Hyperiforce. Du skal derfor tale med din læge, hvis du tager anden medicin, der har denne bivirkning. Det kan dreje sig om:

- medicin mod lægkræmper (quinin)
- medicin mod betændelse (tetracyklin) (antibiotikum),
- vanddrivende lægemidler (bendroflumethiazid)
- methoxalen mod psoriasis).

Brug af Hyperiforce sammen med mad og drikke

Du skal tage tabletten en halv time før et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Hyperiforce efter aftale med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Hyperiforce efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hyperiforce påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Hyperiforce

Hyperiforce indeholder sojapolsaccharider, der kan indeholde sojaprotein. Sojapolsaccharider kan udløse allergiske reaktioner, men formentlig kun hos patienter, der er særligt overfølsomme over for jordnødder (peanuts) eller soja.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE HYPERIFORCE

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 tablet 3 gange dagligt.

Du skal tage tabletten en halv time før et måltid. Drik et glas vand til.



Hvis du ikke får det bedre i løbet af 4-6 uger, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.

Børn: Du må kun bruge Hyperiforce til børn under 12 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Hyperiforce tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hyperiforce, end der står her, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

I tilfælde af overdosering bør patienten beskyttes mod sollys og andre kilder til uv-lys i 1-2 uger.

Hvis du har glemt at tage Hyperiforce

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Hyperiforce kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- lysfølsomhedsreaktioner i form af hudkløe og rødmen af huden, hyppigst hos personer med lys hud.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- mavesmerter.

Meget sjældne (frekvens ukendt)

- Træthed, rastløshed
- Allergiske hudreaktioner

Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på lægemiddels-tyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Hyperiforce ved almindelig stuetemperatur.

Brug ikke Hyperiforce efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflleverer altid medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hyperiforce indeholder:

- Aktiv bestanddel: Ekstrakt af prikbladet perikon, frisk urt. 1 tablet indeholder 40-73 mg ekstrakt svarende til 330 mikrogram total-hypericin beregnet som hypericin.
- Ekstraktet er fremstillet med ethanol.
- Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, sojapolsaccharid, hydrogeneret bomuldsfrøolie, natriumhydroxid (til pH-justering).

Hyperiforces udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Hyperiforce er runde, brunlige, hvælvede tabletter med skrå kant.

Pakningsstørrelse

Tabletbeholder med 60 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bioforce Danmark A/S
Håndværkervej 17 B
8643 Ans
Danmark



Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2009

