



INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

biorto Pantothensyre, hårde kapsler

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

biorto Pantothensyre er et stærkt vitaminpræparat. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for biorto Pantothensyre.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge biorto Pantothensyre
3. Sådan skal du tage biorto Pantothensyre
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

biorto Pantothensyre er et stærkt vitaminpræparat, som kan anvendes til forebyggelse og behandling af Pantothensyre (B5 Vitamin) mangel.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage biorto Pantothensyre for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide før du begynder at tage biorto Pantothensyre Tag ikke biorto Pantothensyre

- Hvis du er overfølsom overfor det aktive stof eller de øvrige indholdsstoffer.

Brug af anden medicin

- Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med biorto Pantothensyre eller biorto Pantothensyre kan påvirke behandlingen med anden medicin. Du skal derfor altid tale med apotek eller læge, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke vitamin- eller mineralpræparater samt kosttilskud.
- Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af biorto Pantothensyre sammen med andre lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater eller kosttilskud.

Brug af biorto Pantothensyre med mad og drikke

Der er ikke kendskab til problemer med brug af biorto Pantothensyre sammen med

mad. Du kan tage biorto Pantothensyre i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid må du kun tage biorto Pantothensyre efter aftale med din læge.

Amning:

biorto Pantothensyre kan anvendes i ammeperioden. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

biorto Pantothensyre påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage biorto Pantothensyre, hårde kapsler

Hvis din læge har sagt at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 kapsel dagligt.

Børn: Du må kun bruge biorto Pantothensyre til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange biorto Pantothensyre, hårde kapsler

- Pantothensyre kan ved overdosering give anledning til kvalme, opkastninger og diarré.
- Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere biorto

Pantothensyre, hårde kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

- Tag pakningen med

Hvis du har glemt at tage biorto Pantothensyre, hårde kapsler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

biorto Pantothensyre, hårde kapsler kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkning.

Sjældne bivirkninger (forekommer mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Diarré.

Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted
www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare biorto Pantothensyre, hårde kapsler ved almindelig temperatur.
- Brug ikke biorto Pantothensyre, hårde kapsler efter den udløbsdato, der står

på pakningen.

- Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere informationer

En biorto Pantothensyre kapsel indeholder:

Pantothensyre 100 mg som calciumpantothemat

De øvrige indholdsstoffer er:

Magnesiumstearat
Cellulose, mikrokrySTALLINSK
Silica, kolloid
Gelatine (kapsel)

biorto Pantothensyre kapslers udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Klare, todelte, hårde kapsler med hvidt fyld.

Pakningsstørrelse:

100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Bioforce Danmark AS
Håndværkervej 17 B
8643 Ans By
Telefon 87708790
e-mail: info@bioforce.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret August 2011