

Sepan 25 mg tabletter

Cinnarizin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Sepan uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Sepan.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Sepans virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sepan
3. Sådan skal du tage Sepan
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Sepan
6. Yderligere oplysninger

1. SEPANS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Sepan er et antihistamin.

Sepan hæmmer histamins virkning og dæmper derved kvalme.

Du kan tage Sepan mod kvalme ved transportsyge (fx køre-, sø- eller luftsyge).

Lægen kan have givet dig Sepan til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SEPAN**Tag ikke Sepan**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for cinnarizin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sepan

Tal med lægen, inden du tager Sepan, hvis du

- har forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
- har besvær med at lade vandet på grund af forstørret prostata (blærehalskirtel).
- har Parkinsons sygdom.
- drikker alkohol eller tager medicin, som virker beroligende eller angstdæmpende eller tager medicin mod depression.

Vær opmærksom på følgende

- Hvis du får ubehag i maven, kan det være nødvendigt at tage Sepan efter et måltid.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod angst og uro (anxiolytika).
- medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika).
- sovemedicin (hypnotika).
- medicin mod depression (moclobemid, isocarboxazid, tricykliske antidepressiva).
- medicin mod Parkinsons sygdom (selegilin).
- alkohol.

Du skal stoppe med at tage Sepan, mindst 4 dage inden du skal have foretaget en hudprøvetest (allergitest), for at undgå påvirkning af resultatet.

Brug af Sepan sammen med mad og drikke

Du kan tage Sepan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Sepan med et glas vand.

Indtagelse af alkohol kan forstærke Sepans sløvende virkning.

Hvis du får ubehag i maven, kan det være nødvendigt at tage Sepan efter et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Sepan efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Sepan efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre bil, motorcykel eller cykle.

Du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekan. Det betyder, at Sepan kan give bivirkninger f.eks. døsighed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sepan

Sepan indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SEPAN

Hvis din læge har ordineret Sepan til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Transportsyge**Voksne og børn over 15 år:**

1 tablet (25 mg) 1 halv time før afrejse.

Du kan derefter tage en halv tablet (12,5 mg) hver 6. time efter behov.

Børn under 15 år:

Du må kun bruge Sepan 25 mg tabletter til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Sepan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sepan, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er søvnliggende bevidsthedssvækkelse, dyb bevidstløshed (koma), opkastning, nedsat kraft i musklerne, rystelser, ufrivillige bevægelser og kramper.

Hvis du har glemt at tage Sepan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Sepan

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Sepan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Mundtørhed.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Vægtstigning, hovedpine, allergiske reaktioner, svedtendens.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Langvarig, ofte stærkt kløende hudsygdom kendetegnet ved små knuder i hud og mundslimhinder. Kontakt læge.
- Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt læge.
- Gulsot med hudkløe. Kontakt læge.

Hypigheden er ikke kendt:

- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Bevægelsesforstyrrelser, mavetarmsbesvær.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkningerne direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. SÅDAN OPBEVARER DU SEPAN

Opbevar Sepan utilgængeligt for børn.

Brug ikke Sepan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**Sepan 25 mg tabletter indeholder:**

- Aktivt stof: Cinnarizin
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, saccharose, talcum, hydrogeneret vegetabilsk olie, povidon.

**Sepans udseende og pakningsstørrelse
Udseende**

Runde hvide tabletter med delekærv og mærket "JANSSEN" på den ene side og "S-25" på den anden side.

Pakningsstørrelse

Blisterpakning indeholdende 50 stk. tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Janssen-Cilag A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
e-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA
Borgo San Michele
04010 Latina
Italien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2008
Yderligere information om Sepan på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk



JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.jnj.com
Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.jnj.com

LEAFLET Sepan

Market: DK

Article Number: 970081

Mat. ID Code: 350


Format Name: I/I/002/V2 (150x200)

Operator: Anne Mie

Technical Info/Spec:

Pointsize: 7 pt

File Name: 970081.indd (CS2-MAC)



Black

L A B

Date: 1.26-08-2008

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.