



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

NIMOTOP® **filmovertrukne tabletter 30 mg**

Nimodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De får måske brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Nimotop til Dem personligt. Lad derfor være med at give Nimotop til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Nimotops virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Nimotop
3. Sådan skal De tage Nimotop
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Nimotop
6. Yderligere oplysninger

1. NIMOTOPS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Nimotop virker ved at udvide blodkarrene, så blodet lettere kan passere. Nimotop virker især på blodkarrene i hjernen.

De kan bruge Nimotop til forebyggelse og behandling af sammentrækninger (spasmer) i hjernens blodkar, som skyldes blødninger i hjernen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE NIMOTOP

Tag ikke Nimotop

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for nimodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis de samtidig tager rifampicin (antibiotika).
- hvis de samtidig tager phenobarbital, phenytoin eller carbamazepin (medicin mod epilepsi).

Vær ekstra forsigtig med at tage Nimotop

- hvis De har væskeansamlinger eller forhøjet tryk i hjernen.
- hvis De har leversygdom.
- hvis De har lavt blodtryk.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin som ikke er købt på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Nimotop kan påvirke virkningen af andre lægemidler ligesom andre lægemidler kan påvirke virkningen af Nimotop.

Tal med Deres læge først, hvis De samtidig tager:

- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, valproat).
- antibiotika (rifampicin, quinupristin/dalfopristin eller makrolidantibiotika såsom erythromycin).
- medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
- medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol).
- medicin mod HIV (f.eks. ritonavir, zidovudin).
- medicin mod depression (f.eks. fluoxetin, nortriptylin, nefazodon).
- medicin mod forhøjet blodtryk.

Brug af Nimotop sammen med mad og drikke

De kan tage Nimotop sammen med mad og drikke. De bør dog undgå at spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, da dette kan forstærke virkningen af Nimotop.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Nimotop efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis De ammer, må De ikke tage Nimotop, da Nimotop bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Nimotop kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE NIMOTOP

Dosering

Den sædvanlige dosis er 2 tabletter (60 mg) 6 gange daglig.

De skal synke tabletterne hele med et glas vand. De bør undgå, at spise grapefrugt eller drikke grapejuice i forbindelse med tabletterne. Tag tabletterne med mindst 4 timers mellemrum.

Som regel vil Deres behandling med Nimotop begynde på sygehuset med drop af Nimotop i en blodåre i op til 14 dage. Derefter tager De tabletterne i ca. 7 dage efter nærmere besked fra lægen.

Nedsat levetid:

- Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Nimotop nødagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis De har taget for mange Nimotop tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Nimotop end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering er lavt blodtryk med svimmelhed og besvimelse, langsom puls, hjertebanken, mavegener og kvalme.

Hvis De har glemt at tage Nimotop

Glemmer De at tage medicinen, så tag den straks, når De husker det, eller spring den over, hvis det er tid til den næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for tabletter, som De har glemt at tage.

4. BIVIRKNINGER

Nimotop kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

- Nedsat antal blodplader i blodet.
- Allergisk reaktion, udslæt.
- Hovedpine.
- Hurtig puls.
- Lavt blodtryk, udvidelse af blodkar.
- Kvalme.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- Lav puls.
- Tarmslyng.
- Forbigående stigning i leverenzzymer.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DE NIMOTOP

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Nimotop efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**Nimotop indeholder:**

Nimotop, filmovertrukne tabletter, 30 mg.

- Aktivt stof: Nimodipin.
- Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrySTALLinsk; majsstivelse; povidon; crospovidon; magnesiumstearat; hypromellose; macrogol 4000.

Tilsat farve: Titandioxid (E171) og gul jernoxid (E 172).

Nimotops udseende og pakningsstørrelse

Nimotop er gule og runde tabletter mærket med SK og Bayerkors. Tabletternes diameter er 10 mm.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bayer HealthCare AG, D-51368 Leverkusen, Tyskland.

Repræsentant i Danmark:

Bayer A/S, Nørgaardsvej 32, DK-2800 Kgs. Lyngby.

Revideret: juni 2007