

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marzine® 50 mg tabletter

Cyclizinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få **Marzine®** uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for **Marzine®**:

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage **Marzine®**
3. Sådan skal du tage **Marzine®**
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Marzine® indeholder et stof (antihistamin) som lindrer symptomer på transportsyge som søsyge, køresyge og luftsyge.

Hvis din læge har sagt at du skal tage **Marzine®** for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MARZINE®

Tag ikke Marzine®, hvis:

- du er overfølsom (allergisk) over for cyclizinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- du har perioder med vejrtrækningsstop, mens du sover (søvnapnø).
- Du har snærvinklet grøn stær (snærvinklet glaukom)

Vær ekstra forsigtig med at tage Marzine®

Tal med lægen, hvis du har:

- forhøjet tryk i øjet. Hvis du har hovedpine, kvalme, synsnedsettelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær) må du ikke tage **Marzine®**.
- forsnævring af mavesækkens munding mod tolvfingertarmen.
- nedsat mave-/tarmfunktion.
- besvær med vandladningen pga. forstørret blærehalskirtel (prostata) eller forsnævring af blærehalsen.
- svær muskeltræthed (myasthenia gravis).
- alvorligt besvær med vejrtrækningen.
- tendens til kramper.

Du skal være forsigtig, hvis du drikker alkohol sammen med **Marzine®**, da den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med **Marzine®**. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

- Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: angst eller psykoser depression (MAO hæmmere og cykliske antidepressiva)
- parkinsons syge eller demens

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Marzine® sammen med mad og drikke

Du kan tage **Marzine®** sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage **Marzine®** efter aftale med lægen.

Amning:

Du må ikke tage **Marzine®**, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at **Marzine®** virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Marzine®

Marzine® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager **Marzine®**, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MARZINE®

Hvis din læge har ordineret **Marzine®** til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne sammen med rigelig væske.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år:

1 tablet (50 mg) 3 gange daglig, 1-2 timer før du ønsker en virkning.

Du må kun bruge **Marzine®** til børn under 12 år efter aftale med en læge.

Hvis du har taget for mange Marzine® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere **Marzine®** tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du tager for mange **Marzine®** tabletter, kan du blive døsigt og svimmel. Ved højere doser kan du blive ophidset, desorienteret, bevidsthedssvækket, hallucineret, angst, få hjertebanken, udvidelse af pupillerne, mundtørhed, uro, chok og kramper.

Hvis du har glemt at tage Marzine®

Har du glemt at tage **Marzine®** bør du blot tage 1 tablet når det er tid for næste dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Marzine® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Døsighed, mundtørhed, sløret syn.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Uro, søvnbesvær, udslæt med og uden kløe.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Marzine[®] opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare **Marzine**[®] ved almindelig temperatur.

Tag ikke **Marzine**[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Marzine[®] indeholder:

Aktivt stof: cyclizinhydrochlorid 50 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lactose; kartoffelstivelse; akaciegummi (E414) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Marzine[®] er hvide, runde tabletter med delekærv og mærket med "T4A" på den ene side.

Pakningsstørrelser

Marzine[®] findes i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS, Solvang 8, DK-3450 Allerød, telefon: 4452 8888, e-mail: info@meda.dk

Fremstiller:

Wrafton Laboratories Ltd., Exeter Road, Wrafton, Branton, Devon EX33 2DL, Storbritannien.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2011.