

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mylicon®

64 mg/ml orale dråber, emulsion dimeticon

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Mylicon.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mylicon.
3. Sådan skal du tage Mylicon.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mylicon virker ved at forhindre skumdannelse i maven og tarmene.

Du kan bruge Mylicon ved:

- for meget luft i maven,
- forberedelse til røntgenundersøgelse af maven og tarmen,
- forberedelse til gastroskopi (kikkertundersøgelse af mavesæk og tolvfingertarm),
- spædbarnskolik, kun efter lægens anvisning.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Mylicon for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MYLICON

Tag ikke Mylicon

hvis du er overfølsom (allergisk) over for dimeticon eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mylicon

Du må kun bruge Mylicon til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du bør ikke bruge Mylicon sammen med afføringsmidler, der indeholder mineralolie (paraffin), da en blanding af disse vil nedsætte virkningen.

Brug af Mylicon sammen med mad og drikke

Du kan bruge Mylicon sammen med mad og drikke.

Ved spædbarnskolik, skal du give Mylicon et kvarter før et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du kan bruge Mylicon under graviditet.

Amning: Du kan bruge Mylicon, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mylicon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MYLICON

Hvis din læge har ordineret Mylicon til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Mod for meget luft i maven og tarmene:

Voksne:

80 - 120 mg (30 - 45 dråber (1,2-1,8 ml)) 3 - 4 gange daglig. Kan tages under eller efter et måltid, og hvis nødvendigt også ved sengetid.

Før røntgen- og kikkertundersøgelse:

Gastroskopi:

80 - 160 mg (30-60 dråber (1,2-2,5 ml)) fortyndes med vand til 100 ml 15 minutter før undersøgelse.

Røntgenundersøgelse af mavesækken:

80 mg (30 dråber (1,25 ml)) iblandet barium kontrastmiddel.

Røntgenundersøgelse af tarmen:

40 mg (15 dråber (0,6 ml)) 4 gange daglig dagen før undersøgelse og 40 mg (15 dråber (0,6 ml)) på undersøgelsesdagen iblandet en udrensende opløsning samt 160 - 200 mg (60-75 dråber (2,5-3,1 ml)) iblandet barium kontrastmiddel.

Børn:

Du må kun bruge Mylicon til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Mod spædbarnskolik: 40 mg (15 dråber (0,6 ml)) et kvarter før måltid.



Brugsanvisning

Du skal omryste Mylicon omhyggeligt før brug. Du skal holde flasken lodret nedad og banke let i bunden af flasken for at få dråberne ud. Bland Mylicon i lidt mælk eller vand.

Hvis du har taget for meget Mylicon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Mylicon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Mylicon

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Mylicon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Åndedrætsbesvær og hævelser (ødem) i ansigt eller tunge. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Hududslæt og kløe.

Hyppigheden er ukendt: Let kvalme og forstoppelse.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Mylicon utilgængeligt for børn. Du kan opbevare Mylicon ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Mylicon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mylicon 64 mg/ml orale dråber, emulsion indeholder:

- aktivt stof: dimeticon. 1 ml (ca. 25 dråber) indeholder 64 mg dimeticon.
- øvrige indholdsstoffer: citronsyremonohydrat; natriumcitrat, vandfri; hypromellose; carbomer 974; natriumbenzoat (E211); natriumcyclamat; saccharinnatrium; hindbærsmag (syntetisk); vanillesmag; silica, kolloid; polyglykolstearylether; sorbinsyre (E200); rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Mylicon orale dråber er en hvid til gråhvid, viskøs emulsion med vanille-hindbærsmag.

Pakningsstørrelse

Mylicon findes i en glasflaske, der indeholder 30 ml og er forsynet med en dråbetæller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller:

Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest revideret
April 2010



F307694-159

PDF FILE

Orleans - Artwork Center

MYLICON 30 ml

DK

Component Number	Component type	Dimensions	Code descriptif générique	Version
F307694	Notice à plat / Flat Leaflet	148 x 210 mm	NOTP002	V 6.3

Safety code
Lætus n° 159

AFFILIATE APPROVAL

Approved by / Approuvé par :

Name:

Date:/...../.....

Signature:

FRONT	Colours	REAR
 PMS 135		 PMS 135
 NOIR		 NOIR