

Visine® Visiclear



Øjendråber, opløsning
10ml

0,5 mg/ml tetryzolinhydrochlorid

■ Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Visine Visiclear uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Visine Visiclear.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 6 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Visine Visiclear
3. Sådan skal du bruge Visine Visiclear
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

■ 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Visine Visiclear er øjendråber, som virker ved at få de små blodkar til at trække sig sammen og ved at nedsætte produktionen af væske i øjet.

Du skal bruge Visine Visiclear mod røde øjne på grund af akut irritation med tåreflåd, kløe og svie.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Visine Visiclear for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

■ 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE VISINE VISICLEAR

Brug ikke Visine Visiclear, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for tetryzolinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har snævervinklet grøn stær.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Visine Visiclear

Tal med lægen, inden du bruger Visine Visiclear, hvis du

- har hjerte-karproblemer.
- har for højt blodtryk.
- har forhøjet stofskiftet.
- har diabetes (sukkersyge).
- er ældre (over 65 år).
- har forstørret prostata.

Vær opmærksom på følgende

- Hvis dine øjne er irriterede pga. betændelse, et fremmedlegeme, eller fordi du har fået noget kemisk i øjet, skal du ikke bruge Visine Visiclear. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Visine Visiclear og det andet præparat.

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Visine Visiclear efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Visine Visiclear efter aftale med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Visine Visiclear kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Visine Visiclear

Visine Visiclear indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

■ 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VISINE VISICLEAR

Brug altid Visine Visiclear nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Vær omhyggelig med at plastflaskens spids ikke berører øjet eller anden overflade ved drypning, da dette kan forurene øjendråberne.

Luk omhyggeligt flasken efter brug.


Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1-2 dråber 2-3 gange daglig i højst 1 uge.

Ældre: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Børn: Du må kun bruge Visine Visiclear til børn under 15 år efter aftale med lægen.

Sådan åbnes flasken første gang



- 1) Afriv sikkerhedsforseglingen
- 2) Skru hætten stramt til. Derved gennembøres flaskespidsen af den tap, der er inde midt i hætten. Flasken er nu åben og klar til brug.

Hvis du har brugt for meget af Visine Visiclear øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Visine Visiclear, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdreven brug eller hvis du har drukket indholdet er langsom puls, søvnighed, lavt blodtryk, bevidstløshed og fald i kropstemperatur.

Hvis du har glemt at bruge Visine Visiclear

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Visine Visiclear

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

■ 4. BIVIRKNINGER

Visine Visiclear kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Smerter og uklart syn pga. sår på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Hjertebanken.
- Svedtendens.
- Kraftsløshed og svaghed.
- Hovedpine, rysten.
- Røde øjne, tørre øjne, smerter eller irritation i øjet.
- Stikkende og brændende følelse i øjet.
- Tågesyn, synsforstyrrelser.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Tåreflåd.
- Lysfølsomme øjne.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

- Store pupiller.

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Udtalt tørhed af øjets bindehinde og hornhinde med tilstopning af tårekanalen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til

Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

■ 5. OPBEVARING

Opbevar Visine Visiclear utilgængeligt for børn.

Efter åbning af flasken må du kun bruge af flasken i 1 måned.

Brug ikke Visine Visiclear efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Visine Visiclear, hvis opløsningen er uklar eller der er partikler i væsken.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

■ 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Visine Visiclear 0,5 mg/ml øjendråber indeholder:

- Aktivt stof: tetryzolinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Borsyre E284; boraks E285; natriumchlorid; natriumedetat; sterilt vand.
- Som konserveringsmiddel er der tilsat 0,1 mg benzalkoniumchlorid per ml.

Visine Visiclear udseende og pakningstørrelse

Udseende

Visine Visiclear er en klar opløsning.

Pakningsstørrelse

10 ml flaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af

markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien og/eller
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2780 Puurs, Belgien.

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2008

Yderligere information om Visine Visiclear på
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.