

Zinnat® 500 mg filmovertrukne tabletter

4977685908

Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis De har spørgsmål til behandlingen.
- Lægen har ordineret Zinnat® til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De tager Zinnat®.
3. Sådan skal De tage Zinnat®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Zinnat® er en hvid, oval tablet mærket GX EG2.

Zinnat® er et antibiotikum som tilhører gruppen cefalosporiner.

De kan bruge Zinnat® mod betændelser forårsaget af bakterier, der er følsomme for Zinnat®.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De tager Zinnat®

Tag ikke Zinnat® hvis:

- De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof (cefuroxim), andre cefalosporiner eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Zinnat®.
- De er overfølsom (allergisk) over for penicillin.

Særlige forholdsregler

Tal med lægen inden De tager Zinnat®, hvis:

- De er overfølsom over for penicillin eller andre antibiotika, da De også kan være overfølsom over for Zinnat®.
- De har astma eller allergi.
- De har nyre- eller leversygdom.

Kontakt lægen, hvis:

- De får voldsom diaré under behandlingen. Det kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse.
- De får opkastning og diaré.
- De er i behandling med Zinnat® mod betændelse forårsaget af skovflåt. De kan få feber og udslæt i begyndelse af behandlingen. Det vil gå væk igen efter få timer.

- Deres barn får høretab efter behandling med Zinnat® mod hjernehindebetændelse (meningitis).

Skal De behandles med Zinnat® i længere tid (mere end 10 dage), skal lægen regelmæssig undersøge Deres blod.

Langvarig brug af Zinnat® kan give nedsat virkning af medicinen.

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Zinnat®.

Brug af Zinnat® sammen med mad og drikkevarer

De skal tage Zinnat® kort tid efter et måltid og sammen med rigelig vand (op til 200 ml).

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zinnat®

Zinnat® indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give allergiske reaktioner, som kan optræde efter behandlingen.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Zinnat® efter lægens anvisning.

Amning:

Zinnat® udskilles i modermælken. Hvis behandling er nødvendig skal amning ophøre. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zinnat® kan hos enkelte give bivirkninger som svimmelhed, nervøsitet, rastløshed, forvirring, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl lægen, hvis:

- De tager vanddrivende medicin eller medicin mod for højt blodtryk (diuretika, furosemid).
- De tager medicin, som er skadelig for nyrerne (aminoglykosid-antibiotika).
- De får andre antibiotika (tetracykliner og chloramphenicol).
- De tager medicin mod urinsur gigt (probenecid).
- De tager syreneutraliserende midler mod

mavesår (antacida, histamin, proton-pumpehæmmere).

- De tager p-piller, da Zinnat® kan nedsætte virkningen. Brug andre former for svangerskabsforebyggelse, mens De tager Zinnat®.

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at ændre dosis.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal De tage Zinnat® Dosering

Ikke alle doseringer kan opnås med Zinnat® 500 mg.

Voksne: 1 - 2 tabletter på 250 mg (250 – 500 mg) 2 gange daglig.

Børn: 1 – 2 tabletter på 125 mg (125 – 250 mg) 2 gange daglig.

Nedsat nyrefunktion: Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

De skal tage Zinnat® kort tid efter et måltid og sammen med rigelig væske, helst et stort glas vand (op til 200 ml).

Behandlingen varer som regel 5 – 10 dage.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De taget for mange Zinnat®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Zinnat®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Overdosering kan give muskeltrækkninger og krampes.

Har De glemt at tage Zinnat®?

Har De glemt at tage Zinnat®, skal De blot fortsætte med Deres sædvanlige dosis - tag ikke dobbelt dosis.

Spørg Deres læge eller apoteket, hvis der er mere De vil vide.

4. Bivirkninger

Zinnat® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker. Kontakt straks læge.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber. Kontakt straks læge.
- Akut nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Akut nyresvigt med ophørt urindannelse. Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlig tarmbetændelse med langvarig, voldsom diaré. Kontakt straks læge.
- Hævelse af tunge, læber og ansigt, nældefeber, ledsmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (indenfor få minutter til timer) f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion/shock - kan være livsfarligt). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlig blodmangel med gulsot, bleghed og træthed. Kontakt straks læge.
- Hallucinationer hos ældre patienter eller patienter med høj feber eller med alvorlige betændelser. Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. Kontakt læge.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Mavesmerter, diaré og kvalme, opkastning.
- Allergiske reaktioner såsom hududslæt.
- Hovedpine, svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Svamp i mund og skede ved langvarig brug.
- Allergiske reaktioner såsom nældefeber, kløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Feber pga. overfølsomhedsreaktion mod Zinnat®.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Rastløshed, nervøsitet, forvirring.

Zinnat® kan herudover give bivirkninger, som De ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. nedsat antal hvide blodlegemer og forhøjede levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

Opbevar Zinnat® utilgængeligt for børn.

Tag ikke Zinnat® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Zinnat® indeholder:

- Zinnat® 500 mg filmovertrukne tabletter.
- Det virksomme indholdsstof i Zinnat® er cefuroxim som cefuroximaxetil.
- De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose, hydrogeneret vegetabilsk olie, natriumlaurylsulfat, kolloid silica, propylenglycol, methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), natriumbenzoat (E 211), titandioxid (E171).

Pakningsstørrelser:

Zinnat® findes i pakningsstørrelserne 12 stk. og 48 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Revideret januar 2007