

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lacril 14 mg/ml, øjendråber, opløsning

Polyvinylalkohol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel da, den indeholder vigtige oplysninger.

- Brug altid Lacril nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lacril
3. Sådan skal du bruge Lacril
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lacril øjendråber er en kunstig tårevæske, som bruges mod tørre øjne.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Lacril for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE LACRIL

Brug ikke Lacril

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af indholdsstofferne (angivet i afsnit 6).
- hvis du bruger bløde kontaktlinser. Se ”Lacril indeholder benzalkoniumchlorid”.

Brug af anden medicin sammen med Lacril

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal du altid bruge Lacril til sidst og tidligst 15 minutter efter de øvrige præparater.

Graviditet og amning

Du kan bruge Lacril under graviditet.

Du kan amme, selv om du bruger Lacril.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lacril kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Lacril indeholder benzalkoniumchlorid

Indholdet af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før de sættes i igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LACRIL

Brug altid Lacril nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er**Voksne**

1-2 dråber efter behov.

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Lacril til børn under 15 år efter aftale med en læge.

1. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.



2. Træk forsigtigt det nedre øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.



3. Tryk på flasken, så 1-2 dråber falder ned i øjet.



For at undgå forurening bør dråbespidsen ikke røre noget. Skru hættten på efter brug.

Hvis du har brugt for meget Lacril

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Lacril, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Øjensmerter, øjenirritation, røde øjne, tåreflåd, en fornemmelse af noget i øjet, øjenkløe, en allergisk reaktion i øjet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Brug senest Lacril 4 uger efter åbning.
- Opbevar Lacril utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Lacril efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lacril 14 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder

- Aktivt stof: Polyvinylalkohol.
- Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumchlorid, dinatriumphosphatseptahydrat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, dinatriumedetat, saltsyre/natriumhydroxid til at justere pH, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Lacril er en klar, farveløs opløsning i en plastflaske.

Pakningsstørrelse

Plastflaske, der indeholder 15 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irland

Repræsentant i Danmark:

Allergan Norden AB
Johanneslundsvägen 3-5
S-19481 Upplands Väsby
Sverige
Tel: +46 8 594 100 00

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 27. februar 2014