

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge Propine.

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
 - Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
 - Lægen har ordineret Propine til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
- Propine indeholder følgende aktive stof: Dipivefrinhydrochlorid 1 mg/ml.
 - Propine indeholder også: Natriumchlorid, saltsyre, benzalkoniumchlorid 0,05 mg/ml, natriumedetat og rensat vand.
 - Dipivefrin er et prodrug, som i øjet, omdannes til adrenalin. Adrenalinet virker ved at nedsætte produktionen af kammervand og øge afløbet af kammervand.
- Markedsføring i Danmark: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland
 - Fremstiller: Allergan Pharmaceuticals Ireland Westport, Co. Mayo, Irland.
 - Repræsentant i Danmark: Allergan Norden AB, Johanneslundsvägen 3-5, S-194 81, Upplands Väsby, Sverige, tel: +46 8 594 100 00.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Propine nedsætter trykket i øjet. Propine anvendes til behandling af øjentilstande (inklusive grøn stær), hvor der er forhøjet tryk.

DOSERING

Propine anvendes sædvanligvis 1 - 2 gange daglig. Følg instruktionen omhyggeligt, og spørg din læge eller apoteker, hvis du er i tvivl. Dette lægemiddel kontrollerer, men helbreder ikke tilstande som f.eks. grøn stær.

Propine skal anvendes hver dag for at virke effektivt. Det kan være nødvendigt at bruge andre lægemidler sammen med Propine for at kontrollere din tilstand.

BRUG IKKE PROPINE HVIS:

- du lider af snævervinkel glaukom.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

Før du bruger Propine bør du fortælle din læge:

- hvis du er allergisk (for eksempel dersom du tidligere har haft et astmatisk anfald) over for benzalkoniumchlorid eller andre af indholdsstofferne i Propine.
- hvis du bruger bløde kontaktlinser (benzalkoniumchlorid kan skade bløde kontaktlinser).
- Såfremt du lider af forhøjet blodtryk.

GRAVIDITET OG AMNING

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Propine under graviditet.

Amning:

Erfaringerne med Propine er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Propine, hvis du ammer. Spørg lægen.

TRAFIK- OG ARBEJDSSIKKERHED

Dette lægemiddel kan forårsage uklart syn, hvilket bør tages i betragtning, når du f. eks. kører bil eller foretager andre aktiviteter som kræver præcision.

BRUG AF ANDEN MEDICIN

Kontakt altid læge eller apotek, såfremt du bruger eller fornyelig har brugt andre lægemidler, også når det gælder receptfri medicin.

SÅDANT SKAL DU BRUGE PROPINE

Propine tages som øjendråber. Etiketten på flasken fortæller dig, hvor mange dråber, du skal tage ved hver dosering. Tag øjendråberne således:

1. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.
2. Træk forsigtig det underste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
3. Tryk den vendte dråbeflaske for at udløse en dråbe i dit øje.
4. Slip det underste øjenlåg og luk øjet i 30 sek.

Undgå at berøre flasketoppen. Skru hættten på efter brug. Den korrekte dosering er meget vigtig. Hvis du har spørgsmål, henvend dig til din læge eller apoteker.

HAR DU BRUGT FOR MEGET PROPINE?

Hvis du ved et uheld kommer til at tage for mange dråber, skylles øjet med vand. Tag din næste dosis til normal tid. Det vil sædvanligvis ikke føre til uønskede gener at tage for mange øjendråber. Kontakt din læge eller lægevagten (hospital), såfremt du ved et uheld har taget for meget medicin eller har drukket Propine.

For andre spørgsmål om lægemidlet, kontakt læge eller apotek.

HAR DU GLEMT AT BRUGE PROPINE?

Hvis du glemmer en drypning, så dryp så snart du kommer i tanke om det. Såfremt der kun er kort tid til næste drypning, udelades den glemte drypning, og der dryppes til normal tid.

BIVIRKNINGER

Propine kan som al anden medicin give bivirkninger.

Du kan føle en let svie og/eller brænde ved drypning. Hvis du bemærker nogen af følgende bivirkninger skal du kontakte din læge.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): rødme, kløe eller opsvulmning af øjenlåget, pigmenteringsaflejringer.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): åndenød, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, besvimelsesanfald eller svimmelhed, hovedpine, usædvanlig træthed.

Får du ondt i øjnene, eller forværres dit syn, bør du kontakte din læge.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

OPBEVARING

Opbevar Propine utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Propine ved over 25°C.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

ADVARSEL

Anvend ikke præparatet, hvis forseglingen er brudt. Må ikke anvendes efter udløbsdato (trykt på både flaske og karton).

Skal anvendes senest 4 uger efter første åbning.

VIGTIGT

Denne folder indeholder ikke al information om lægemidlet. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget kan du kontakte din læge for yderligere information

Revideret 28. marts 2007