

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Atarax 10 mg og 25 mg tabletter

Hydroxyzinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Atarax til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Ataraxs virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atarax
3. Sådan skal du tage Atarax
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Atarax
6. Yderligere oplysninger

1. ATARAXS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Atarax virker beroligende ved angst og uro. Det kan også anvendes ved tilstande med kløe, hvor en angst- og uro dæmpende virkning er ønskelig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ATARAX

Tag ikke Atarax

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for hydroxyzinhydrochlorid eller overfor cetirizin, andre piperazin derivater, aminophyllin, ethylendiamin eller nogen af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du lider af porfyri (arvelige forstyrrelser i stofskiftet).
- hvis du er gravid eller ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Atarax

Inden du påbegynder (eller under) behandlingen med Atarax oplys da lægen om følgende:

- hvis du lider af krampeanfald.
- hvis du har grøn stær.
- hvis du lider af blære-obstruktion (tilstopning af blæren).
- hvis du har nedsat bevægelighed i mave-tarmkanalen.
- hvis du lider af myastenia gravis (kronisk sygdom med alvorlig muskelsvækkelse).
- hvis du lider af demens.
- hvis du lider af hjertearytmi (uregelmæssighed i hjertets slag) eller kendt anlæg for hjertearytmi.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Atarax og/eller Atarax kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Det gælder bl.a.:

- Andre lægemidler, der har egenskaber som virker dæmpende på centralnervesystemet.
- Betahistin
- Lægemidler som indeholder anticholinesterase
- Monoamin oxidase hæmmere (MAO-hæmmere)
- Adrenalin
- Phenytoin
- Cimetidin
- CYP2D6 substrater

Behandling med Atarax bør stoppes 5 dage før en allergitest eller methacholin bronkie-test, for at undgå påvirkning af testresultaterne.

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

Brug af Atarax sammen med mad og drikke

Du kan tage Atarax sammen med mad og drikke.

Alkohol forstærker virkninger af Atarax. Du bør derfor undgå samtidig indtagelse af Atarax og alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Atarax, hvis du er gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Atarax.

Hvis behandling er nødvendig skal amning ophøre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekanter.

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle fordi Atarax virker sløvende, og det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Samtidig indtagelse af Atarax og alkohol eller andre sløvende midler bør undgås, da de forstærker denne virkning.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ATARAX

Tag altid Atarax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Symptomatisk behandling af angst:

50 mg/dag fordelt på 3 daglige doser på hhv. 12,5 mg-12,5 mg-25 mg.

Nogle patienter kan have brug for doser på op til 300 mg dagligt.

Symptomatisk behandling af pruritus (kløe):

Startdosis på 25 mg før hvile. Nogle patienter kan have brug for doser på op til 25 mg 3 til 4 gange dagligt.

Ældre:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn (fra 12 måneder):

Symptomatisk behandling af pruritus (kløe):

Fra 12 måneder til 6 år: 1 mg/kg/dag til 2,5 mg/kg/dag fordelt på flere doser.

Fra 6 år: 1 mg/kg/dag til 2 mg/kg/dag fordelt på flere doser.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for.

Hvis du har taget for mange Atarax tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atarax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

Kvalme, opkastning, hjertebanken, feber, træthed, skælven, forvirring eller hallucinationer.

Dette kan efterfølges af nedsat bevidsthed, nedsat vejrtrækning, krampeanfald, nedsat blodtryk eller ændringer i hjerterefrekvensen.

Dette kan resultere i koma, hertestop eller vejrtrækningsstop.

Hvis du har glemt at tage Atarax

Hvis du har glemt at tage Atarax, skal du tage den næste dosis som planlagt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Atarax

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Atarax kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Takykardi (hurtig puls). Overfølsomhed. Urinretention (manglende evne til at tømme blæren).

Unormale leverfunktionsværdier.

Du eller dine omgivelser skal kontakte læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Quinckes ødem (overfølsomhedsreaktion med hævelser i ansigt, læber, tunge, stemmebånd og /eller svælg, som giver synke- og vejrtrækningsbesvær og kan føre til kvælning/kollaps). Du eller dine omgivelser skal kontakte læge eller skadestue omgående.

Anafylaktisk shock (overfølsomhedsreaktion. Symptomer: nysen, løbende næse, hoste, myrekryb/brænden eller sovende fornemmelse i huden, vejrtrækningsbesvær, hæshed, opkastning,

forvirrethed, krampe, fald i blodtryk. Kan føre til hjertestop. Du eller dine omgivelser skal kontakte læge eller skadestue omgående).

Bronkospasmer (krampe i bronkierne. Symptomer: Øget slimproduktion i luftvejene og vejrtrækningsbesvær. Du eller dine omgivelser skal kontakte læge eller skadestue).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
Mundtørhed. Træthed/udmattelse. Hovedpine, beroligende virkning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
Svimmelhed, søvnløshed, skælven. Kvalme. Ildebefindende, feber. Urotilstand med rastløshed, forvirring.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU ATARAX

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Atarax efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Atarax indeholder:

Aktivt stof: hydroxyzinhydrochlorid 10 mg og 25 mg

Øvrige indholdsstoffer: 10 mg tablet: Majsstivelse; talkum; povidon; eudragit E; calciumstearat; macrogol 6000; titandioxid (E 171).

25 mg tablet: Cellulose, mikrokrySTALLinsk; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri; opadry Y-1-7000.

Atarax udseende og pakningstørrelse

Atarax 10 mg og 25 mg tabletter er hvide
Blisterpakning 100 stk

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

UCB S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Bruxelles

Belgien

Repræsentant

UCB Nordic A/S

Arne Jacobsens Allé 15

2300 København S

Danmark

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 06/2007