

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zantac® 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Zantac uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Zantac.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 4 uger.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zantac
3. Sådan skal du tage Zantac
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive lægemiddelstof er ranitidin. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes H₂-receptorblokkere. De virker ved at nedsætte dannelsen af mavesyre.

Voksne:

Zantac anvendes ved:

- Mavesår.
- Sår på tolvfingertarmen.
- Mavesår, der skyldes bakterien *Helicobacter pylori*, sammen med antibiotika.
- Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.
- Betændelse i spiserørets nederste del, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret.
- Kronisk dannelse af store mængder mavesyre (Zollinger-Ellisons syndrom).

Zantac anvendes også på hospitaler ved:

- Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse.
- Forebyggelse af mavesår ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner.

Børn (fra 3 år):

Zantac anvendes ved:

- Mavesår.
- Sår på tolvfingertarmen.
- Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Zantac for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zantac

Tag ikke Zantac

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Zantac

Tal med lægen, før du tager Zantac:

- hvis du er over 50 år
- hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion
- hvis du har mavesår
- hvis du har nedsat immunforsvar
- hvis du har en lungesygdom
- hvis du har sukkersyge (diabetes)
- hvis du har stofskiftesygdommen porfyri.

Gå jævnlig til kontrol hos lægen, hvis du tager medicin, der kaldes NSAID (gigtmedicin/smertestillende).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, fordi det kan være nødvendigt at ændre dosis:

- hvis du får blodfortyndende medicin som warfarin
- hvis du får medicin mod
 - hjertesygdomme (procainamid og N-acetylprocainamid)
 - diabetes (glipizid)
 - søvnløshed (triazolam, midazolam)
 - svamp (ketoconazol)
 - hiv-infektion (atazanavir, delaviridin)
 - lungecancer (gefitnib).

Optagelsen af Zantac nedsættes, hvis du samtidig indtager andre midler mod mavesyre og mavesår (syreneutraliserende eller høje doser af sukralfat). Zantac bør tages cirka 2 timer før disse.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Zantac, og/eller Zantac kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker yderligere oplysninger herom.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Zantac efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Zantac, da Zantac går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zantac kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Zantac

Hvis din læge har ordineret Zantac til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne tages sammen med et glas vand.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn og unge fra 12 år

Mavesår og sår på tolvfingertarmen:

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid i 4-8 uger. Ved sår på tolvfingertarmen kan dosis øges til 300 mg 2 gange daglig i 4 uger.

Forebyggende behandling ved mavesår og sår på tolvfingertarmen:

150-300 mg ved sengetid.

Sår på tolvfingertarmen og mavesår, som samtidig behandles med antibiotika:

300 mg ved sengetid eller 150 mg 2 gange daglig sammen med antibiotika. Du bør fortsætte med Zantac 2 uger, efter behandling med antibiotika er ophørt.

Mod betændelsestilstand i nederste del af spiserøret:

150 mg 2 gange daglig. Dosis kan øges til 150 mg 4 gange daglig i op til 12 uger.

Forebyggende behandling ved betændelsestilstand i nederste del af spiserøret og/eller halsbrand (for meget mavesyre):

150 mg 2 gange daglig.

Mod lungebetændelse i forbindelse med operation:

150 mg aftenen før operation og 150 mg 2 timer før operation.

Zollinger-Ellison's syndrom:

150 mg 3 gange daglig. Dosis kan eventuelt øges til i alt 6 g daglig.

Mavesår opstået ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner:

150 mg 2 gange daglig i stedet for injektion, når du kan begynde at spise igen.

Børn over 30 kg fra 3-11 år

Du må kun bruge Zantac til børn under 12 år efter aftale med en læge. Dosis afhænger af barnets vægt.

Den sædvanlige dosis er:

Mavesår og sår på tolvfingertarmen:

2 mg/kg 2 gange daglig i 4-8 uger. Kan eventuelt øges til 4 mg/kg 2 gange daglig, max. 300 mg daglig. Der skal gå ca. 12 timer mellem doserne.

Mod halsbrand (for meget mavesyre):

2,5 mg/kg 2 gange daglig i 2 uger. Kan eventuelt øges til 5 mg/kg 2 gange daglig, max. 600 mg daglig. Der skal gå ca. 12 timer mellem doserne.

Patienter over 50 år: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Zantac

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Zantac, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Zantac

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal have den næste dosis, så spring den glemte over. Tag aldrig dobbeltdosis.

4. Bivirkninger

Zantac kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Overfølsomhedsreaktioner: Du kan mærke, at du pludseligt får svært ved at trække vejret efter at have taget Zantac. Din vejrtrækning kan blive hvæsende, eller du hoster. Du kan også mærke, at det klør, og du hæver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller i svælget). **Hvis du får denne bivirkning, skal du straks kontakte lægen eller ringe 112.** Sådanne allergiske reaktioner over for Zantac ses sjældent eller meget sjældent (hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter).

Andre bivirkninger er angivet herunder:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Forbigående mavesmerter, forstoppelse, kvalme.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Udslæt. Påvirkning af lever- og nyrefunktion (forbigående). Feber.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Hovedpine. Diarré. Svimmelhed. Bevægelsesforstyrrelser. Forvirring. Nedsat evne til at se skarpt. Vrangforestillinger. Depression. Rødt hududslæt med infektion. Udvikling af bryster hos mænd og mælkesekretion. Impotens. Hårtab. Led- og muskelsmerter. Betændelse i bugspytkirtlen. Leverbetændelse, gulsot. Nyrebetændelse. Meget langsom puls og tendens til besvimelse. Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk>.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Zantac efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket.

6. Yderligere oplysninger

Zantac indeholder

Aktivt stof: Ranitidin som ranitidinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: MikrokrySTALLinsk cellulose, magnesiumstearat, methylhydroxypropylcellulose, triacetin, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Zantac 150 mg fillovertrukne tabletter er hvide, runde og mærket med "GXEC2".

Pakningsstørrelser

60 fillovertrukne tabletter i blister.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2011.

GSK logo

Den nyeste indlægsseddel kan findes på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.indlaegsseddel.dk/>.