

Canesten® 100 mg vaginaltabletter

clotrimazol

0210055906

Canesten® er et registreret varemærke, som tilhører Bayer Aktiengesellschaft

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- De kan få Canesten® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Canesten®.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre inden 3 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Canesten®
3. Sådan skal De bruge Canesten®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Canesten® er et svampedræbende middel. De kan bruge Canesten® mod betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Canesten® virker på.

Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge Canesten® for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE CANESTEN®

Brug ikke Canesten® hvis:

- De er overfølsom overfor clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Canesten®.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten®

De bør ikke starte behandling uden at tale med lægen, hvis:

- De er under 12 år.
- De er i eller efter overgangsalderen.
- De har gentagne betændelser over længere tid. Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.

Kontakt lægen hvis De får:

- Feber.
- Smerter i den nedre del af maven.
- Rygsmerter.
- Ildelugtende udflåd.
- Kvalme.

- Blødning fra skeden.
- Smerter i skulderen ved brug af Canesten®.
- Symptomer, som varer i mere end 7 dage.

Brug ikke Canesten® sammen med kondom eller pessar, da det kan nedsætte sikkerheden af disse midler.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Kontakt lægen inden De bruger Canesten®, hvis De tager medicin, som nedsætter immunsystemet (tacrolimus). Canesten® kan øge virkningen af denne medicin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De kan bruge Canesten® under graviditet. De må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditet, da denne kan beskadige livmoderen. Vask hænderne grundigt, inden vaginaltabletten føres op i skeden med fingeren. Det er vigtigt med god hygiejne, specielt i de sidste 4-6 uger af graviditeten.

Amning

De kan bruge Canesten®, selvom De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE CANESTEN®

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

- Vaginaltabletter skal indføres om aftenen.
- Indfør vaginaltabletten så dybt i skeden som muligt.
- Indføringen sker bedst, hvis De ligger ned med benene trukket let op.
- Vaginaltabletterne indføres ved at anvende applikatoren (indføringshylsteret). Under graviditet bør vaginaltabletterne indføres uden brug af applikatoren, for ikke at beskadige livmoderen.
- Vaginaltabletten skal blive opløst i skeden i løbet af natten. Hvis den ikke gør det,

og uopløste tabletstykker falder ud af skeden, skal De overveje at anvende vaginalcreme i stedet for vaginaltabletter.

- De bør ikke bruge Canesten® samtidig med, at De har menstruation.
- Hvis symptomerne ikke er forsvundet efter behandlingen, skal De kontakte lægen.
- Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt, men tilbagevendende infektioner kan være pga. anden sygdom. De skal kontakte lægen, hvis symptomerne vender tilbage indenfor 2 måneder.
- De må ikke anvende tamponer, væsker til udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i skeden samtidig med behandling med Canesten®.
- Vaginalt samleje bør undgås under behandling med Canesten®, da infektionen kan overføres til partneren.
- Virkningen og sikkerheden af latex produkter, som kondom og pessar, kan være nedsat under behandling med Canesten®.

Den sædvanlige dosis er Betændelse i skeden

Voksne:

6 dages behandling: 1 vaginaltablet (100 mg) indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage. Det er vigtigt at fortsætte behandlingen i 6 dage, selv om De får det bedre, for at undgå genopblussen af betændelsen.

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan De bruge Canesten® 1% creme (eller 1% vaginalcreme). Smør cremen på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger og i 3 dage efter symptomerne er væk.


Deres seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten® 1% creme eller 1% vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk.

Børn: De må kun bruge Canesten® til børn under 12 år efter lægens anvisning.


BRUGSANVISNING

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.




2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).



3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.
4. Træk stemplet ud af applikatoren efter brug og vask delene i varmt (ikke kogende) sæbevand. Skyl i rindende vand og tør omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren.



Hvis De har brugt for mange Canesten® vaginaltabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Canesten®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis De har glemt at bruge Canesten®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at bruge

Canesten®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Canesten® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter):

- Hudreaktioner med kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation og ubehag.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
- Åndenød, åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Allergiske reaktioner, nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Afskalning af huden omkring kønsorganerne.
- Mavesmerter.
- Hævelse pga. vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Bækkensmerter.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Canesten® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Canesten® over 30°C.
- Brug ikke Canesten® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Canesten® 100 mg vaginaltabletter indeholder:

- Aktivt stof: Clotrimazol 100 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Calciumlactat-pentahydrat, majsstivelse, crospovidon, vandfri kolloid silica, mælkesyre,

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose, mikrokrySTALLinsk cellulose.

Canesten®'s udseende og pakningsstørrelse:

Canesten® 100 mg er en hvid, aflang vaginaltablet, som er afrundet i den ene ende. Vaginaltabletten er mærket BAYER på den ene side og P3 på den anden side. Canesten® findes i pakningsstørrelsen 6 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2010