

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ventoline® 4 mg tabletter Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline
3. Sådan skal du tage Ventoline
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ventoline indeholder et bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene og herved ophæves den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Ventoline virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden forebyggende medicin, afhængig af hvor svær din astma er.

Du kan bruge Ventoline tabletter til behandling af astma og andre former for vejtrækningsbesvær.

Ventoline tabletter kan anvendes af voksne, unge og børn over 6 år.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VENTOLINE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ventoline:

- hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Ventoline:

- hvis du har svær astma, da der er risiko for, at du får nedsat kalium i blodet, hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller binyrebarkhormon
- hvis du har forhøjet stofskifte (*tyrotoksikose*)

- hvis du har forhøjet blodtryk
- hvis du har diabetes (sukkersyge). I så fald kan det være, at du skal udføre ekstra blodsukkertest, når du får Ventoline
- hvis du har eller har haft en hjertesygdom kendetegnet ved åndenød, uregelmæssig puls eller brystmerter (*angina*)
- hvis du har veer, da Ventoline kan hæmme disse.

Du skal jævnligt gå til lægen, således at du får Ventoline i den dosis, som passer til sværhedsgraden af din astma.

Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får flere symptomer på astma, såsom åndenød eller hoste, skal du tale med lægen. Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed.

Brug af anden medicin sammen med Ventoline

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Kontakt lægen, hvis du tager:

- betablokkere (f.eks. propranolol)
- steroider (f.eks. prednisolon)
- vanddrivende tabletter, også kendt som diuretika (f.eks. furosemid)
- medicin med xantin (f.eks. theophyllin eller aminophyllin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen.

Amning

Ventoline går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Ventoline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ventoline indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE VENTOLINE

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Administration

Ventoline tabletter virker i 4-6 timer.

Voksne og unge over 12 år

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (4 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Dosis kan eventuelt øges gradvist, op til højst 8 mg salbutamol 3-4 gange daglig.

Brug til børn

Børn mellem 6-12 år

Den sædvanlige dosis er ½ tablet (2 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Børn over 12 år

Den sædvanlige dosis er ½-1 tablet (2-4 mg salbutamol) 3-4 gange daglig.

Hvis du har taget for meget Ventoline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ventoline, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Kvalme, opkastning, hyppig vandladning, hurtigt åndedræt samt tørst og træthed, grundet højt blodsukker, kan være tegn på, at du har taget for meget Ventoline. Dette ses især hos børn.

Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for mange Ventoline tabletter. Lægen bør derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet, og ligeledes overvåge niveauet af serumlaktat, især ved vedvarende hurtigt åndedræt.

Behandling af symptomer med f.eks. kardio-selektive beta-blokkere (virkning på hjertet) kan gives til patienter med svære symptomer på hjertepåvirkning (hurtig hjerterytme og hjertebanken, der ikke lader sig behandle på anden måde, f.eks. behandling med væske). Beta-blokkere skal anvendes med stor forsigtighed til patienter med astma.

Hvis du har glemt at tage Ventoline

Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Ventoline

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ventoline.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

- hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)
- svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen
- hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- overfølsomhedsreaktioner som udslæt (nældefeber) og hævelser. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge og ved besvimelse, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- brystmerter på grund af hjerteproblemer, f.eks. hjertekrampe. Fortæl din læge, hvis du får disse symptomer, mens du bliver behandlet med Ventoline, men lad være med at stoppe med at bruge medicinen, med mindre du får besked på det.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

- rysten.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

- hovedpine
- hjertebanken
- muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

- rastløs uro
- svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- uro og rastløshed
- følelse af muskelspænding.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Ventoline tabletter kan opbevares ved almindelig temperatur.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ventoline 4 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, prægelatiniseret majsstivelse, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Ventoline 4 mg tabletter er runde, hvide tabletter mærket "GX CN5" på den ene side.

Pakningsstørrelser

Plastbeholder med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015