

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Prioderm[®] kutanopløsning 5 mg/ml malathion

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Prioderm.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den seneste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Prioderm
3. Sådan skal du bruge Prioderm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du kan bruge Prioderm mod hoved- og fladlus. Prioderm dræber lusene og deres æg.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Prioderm for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PRIODERM

Brug ikke Prioderm

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for malathion eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Prioderm

Hvis du har astma, skal du tale med din læge, inden du bruger Prioderm.

Du skal være opmærksom på, at:

- Prioderm ikke må komme i øjnene.
- anvende plast- eller gummihandsker, hvis du ofte behandler andre med Prioderm.
- Prioderm ikke må bruges mere end 1 gang om ugen og højst 3 uger i træk.

Hvis lusene ikke forsvinder efter gentagne behandlinger, skal du skifte til et andet produkt, da lusene måske ikke er følsomme for Prioderm.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan godt bruge Prioderm, selvom du tager anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Prioderm. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Prioderm efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Prioderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Prioderm

Prioderm kutanopløsning indeholder alkohol, som kan svie, hvis du har en følsom hud.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PRIODERM

Hvis din læge har ordineret Prioderm til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 2 år behandles som angivet nedenfor.

Du må kun bruge Prioderm til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Brugsanvisning

Hovedlus:

Alle i husstanden skal ses efter for lus med en tættekam. Alle, som har lus, skal behandles. Da det er vigtigt at dræbe lus og æg samtidig, skal du følge nedenstående anvisninger nøje. Hvis du kan udelukke ny smitte fra omgivelserne, og lusene ikke forsvinder efter gentagne behandlinger, skal du skifte til et andet produkt, da lusene måske ikke er følsomme for Prioderm.

Læs mere om hovedlus sidst i denne indlægsseddel.

1. Gnid ca. 25 ml Prioderm kutanopløsning (halvdelen af flaskens indhold) omhyggeligt ind i tørt hår, indtil alt håret er godt gennemfugtet. Du skal være særlig omhyggelig med at fordele opløsningen helt ned til hovedbunden og bag ørerne og i nakken, hvor lus og æg især findes.
2. Håret skal derefter tørre af sig selv uden brug af håndklæde eller hårtørre, da det kan nedsætte virkningen af Prioderm kutanopløsning.
3. Vask håret efter 12 timer i lunkent vand med almindelig shampoo.

Undertiden kan enkelte æg overleve behandlingen og nye lus klækkes. Disse dør sædvanligvis i løbet af få dage, men du skal kæmme med tættekam et par gange om ugen efter behandlingen for at sikre det bedste resultat af behandlingen.

Gentag behandlingen efter 8 dage. Du skal regelmæssigt tjekke for levende lus (brug tættekam), idet du kan være blevet smittet igen.

Fladlus:

1. Gnid 25-50 ml Prioderm kutanopløsning omhyggeligt ind i tørt hår på alle behårede områder, også de tyndt behårede. Du skal ikke behandle øjenvipper, men efterse dem for lus og æg, som fjernes med en pincet el. lign. Fortsæt til huden under hårene er godt gennemfugtet. Det kan svie kortvarigt.
2. Lad de behårede områder tørre af sig selv uden brug af håndklæde.
3. Vask efter 12 timer opløsningen af med almindelig sæbe. Brug lunkent vand.

Gentag behandlingen efter 8 dage.

Hvis du har brugt for meget Prioderm

- Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du føler dig utilpas efter at have brugt mere Prioderm, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.
- Prioderm er kun til udvortes brug. Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har indtaget Prioderm ved et uheld. Tag pakningen med.

4. BIVIRKNINGER

Prioderm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Akut forværring af astma. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Kontakteksem.
- Hårtab.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Prioderm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Prioderm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Prioderm 5 mg/ml kutanopløsning indeholder:

- Aktivt stof: Malathion. 1 ml Prioderm indeholder 5 mg malathion.
- Øvrige indholdsstoffer: Isopropanol, isopropylmyristat og Golden Delicious parfume P15498.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende:

Prioderm kutanopløsning er en klar, farveløs væske.

Pakningstørrelse:

Den findes i flaske med 50 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Norpharma A/S
Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Tlf: 45 17 48 00
Fax: 45 17 48 29

Fremstiller:

Mundipharma DC B.V.
Hoevelaken
Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i august 2011.

®: Prioderm er et registreret varemærke.

GENEREL INFORMATION OM HOVEDLUS**Hvordan ser hovedlus og deres æg ud**

Voksne hovedlus er 2-3 mm lange, og helt nyklækkede lus kan være mindre end 1 mm. Lus har ikke vinger, og de kan hverken flyve eller hoppe. Farven kan variere fra nærmest gennemsigtig gråhvid til meget mørk. Luseæg er ca. 0,8 mm lange og er kittet fast til hårene helt nede ved hovedbunden. Nylagte, levende æg sidder helt nede ved hårbunden og er hvidgule. Tomme, klækkede æg sidder længere ude på hårstrået og er mere hvide og ofte flade, mens mørkfarvede æg indeholder døde lusefostre. Æggene bliver siddende på hårstråene og vokser ud med håret. Sidder æggene mere end 1 cm fra hovedbunden, er der sandsynligvis tale om døde eller klækkede æg. Lusene lever af blod, som de suger fra hovedbunden op til 5 gange i døgnet. Kløe og irritation af hovedbunden skyldes et stof, som lusene spytter ned i såret, så blodet ikke størkner.

Hvordan smitter hovedlus

Tæt kontakt mellem hoveder anses for at være den eneste smittevej af betydning. Det vil ofte være i den nærmeste omgangskreds (legekammerater og/eller familie), at man skal søge smitekilden. Hovedlus kan leve op til 48 timer, hvis de kommer væk fra hovedbunden. Overlevelsestiden afhænger af temperatur, fugtighed, og hvornår de sidst har spist. Lus, der falder ud af håret, vil dog hurtigt blive svækket på grund af udtørring og mangel på føde. Derfor er det meget usandsynligt, at en lus fra omgivelserne skulle kunne finde tilbage til et hoved og være i stand til at etablere sig og begynde at lægge æg. Smitte fra kamme, børster, huer o.lign., der bruges af flere personer inden for et kort tidsrum, kan måske udgøre en vis risiko og bør derfor inddrages i lusebekæmpelsen. Lus, der lever på mennesker, kan ikke leve på andre dyr; derfor vil familiens kæledyr ikke udgøre nogen smitterisiko. Legetøjsbamser, plysdyr o.lign. udgør heller ikke nogen speciel risiko, da de er uegnede levesteder for lusene.

Kan hovedlus forebygges

Den eneste forebyggelse mod smittespredning er ved regelmæssigt (mindst en gang om ugen) at rede håret igennem med en tættekam. Der bør straks iværksættes en behandling og gives besked til omgangskredsen, hvis der findes levende lus. På denne måde opdages eventuelle lus hurtigt, smitten begrænses, og sandsynligheden for at blive smittet igen på et senere tidspunkt mindskes.

Mere information

Søg evt. mere information på bl.a. sundhedsplejerskernes hjemmeside www.fs10.dk, www.netdokter.dk, www.medicinmedfornuft.dk, www.sundhedsguiden.dk og www.medicin.dk.