

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev

Ompakket og frigivet af

PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev

Persantin® Retard er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim.

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Persantin® Retard 200 mg

hårde depotkapsler
dipyridamol

P620104-E

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Persantin® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin® Retard
3. Sådan skal du tage Persantin® Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Persantin® Retard nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper.

Du kan tage Persantin® Retard til forebyggelse af blodpropper, hvis du har haft en blodprop i hjernen eller forbigående lammelser, talebesvær eller føleforstyrrelser (transitorisk cerebral iskæmi, TCI).

Du kan tage det sammen med anden forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene, hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre.

Lægen kan have givet dig Persantin® Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGES PERSANTIN® RETARD

Tag ikke Persantin® Retard

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Persantin® Retard

Tal med lægen inden behandling med Persantin® Retard, hvis du har:

- Alvorlig hjerte- eller karsygdom.
- En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis).

Hvis du skal have foretaget en undersøgelse af din hjertefunktion, skal du inden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Persantin® Retard. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

- Medicin mod muskelsygdom (myasthenia gravis).
- Medicin mod forhøjet blodtryk.
- Medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- Medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xantiner).
- Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin eller acetylsalicylsyre).

Brug af Persantin® Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Persantin® Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2013



620104(E)

1303 DK

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Persantin® Retard. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Persantin® Retard, da dipyridamol går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin® Retard kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PERSANTIN® RETARD

Tag altid Persantin® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis erVoksne

1 depotkapsel 2 gange daglig (1 kapsel om morgenen og aftenen).

Depotkapslerne skal synkes hele sammen med et glas vand.

Ved utålelig hovedpine

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Persantin® Retard, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn må kun få Persantin® Retard 200 mg depotkapsler efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Persantin® Retard kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin® Retard kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som varmek fornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine. Du kan også få fald i blodtrykket, hurtigt åndedræt, hurtig puls, smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, blødningstendens og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Persantin® Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Persantin® Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Persantin® Retard.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Persantin® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger**Almindelige bivirkninger:**

(Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter).

- Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112.

Sjældne bivirkninger:

(Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter).

- Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbensbuen på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Åndenød pga. overfølsomhed. Hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller andre dele af kroppen, kontakt læge eller skadestue.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Hvæsende åndedræt eller problemer med at trække vejret (bronkospasmer). Kontakt læge eller skadestue.
- Øget blødning under eller efter operation. Kontakt læge eller skadestue.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger**Meget almindelige bivirkninger:**

(Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter).

- Diarré
- Kvalme
- Hovedpine
- Svimmelhed.

Almindelige bivirkninger:

(Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter).

- Muskelsmerter.
- Opkastning.
- Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Hædture.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive opdateret. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Persantin® Retard utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Persantin® Retard ved temperaturer over 30 °C.

Tag ikke Persantin® Retard efter den udløbsdato, der står på karten eller etiketten. Udløbsdato (EXP) er sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Persantin® Retard 200 mg, hårde depotkapsler indeholder:

- Aktivt stof: Dipyridamol
- Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, povidon, talkum, akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2), triacetin, dimeticon 350 og stearinsyre.
- Kapselskallerne indeholder: Gelatine, titandioxid (E 171), rød og gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelserUdseende

Persantin® Retard depotkapsler er gelatinekapsler, der indeholder små gule kugler. Kapselfarverne er rødbrun og orange.

Pakningsstørrelser

Persantin® Retard fås i hvide plastbeholdere med 30, 2 x 30 eller 60 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.