

Oplysninger om Cetirizin ratiopharm 10 mg filmovertrukne tabletter

Læs hele denne information godt igennem før De begynder at anvende medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Cetirizin ratiopharm til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som De skal læse, før De anvender Cetirizin ratiopharm
3. Sådan skal De tage Cetirizin ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Lægemiddelgruppe

Cetirizin ratiopharm er et antihistamin til behandling af allergiske sygdomme. Cetirizin ratiopharm virker ved at hæmme virkningen af histamin, som medvirker ved udvikling af den allergiske reaktion. Begyndende virkning ses indenfor 2 timer. Virkningen varer i mindst 24 timer.

Hvad anvendes Cetirizin ratiopharm til

Cetirizin anvendes til behandling af symptomer ved følgende allergiske sygdomme:

Voksne og unge over 12 år:

Sæsonbetinget og helårs allergisk rinit (næsekatar), allergisk betinget øjenbetændelse og nældefeber.

Børn 6-12 år:

Sæsonbetinget og helårs allergisk rinit (næsekatar) og nældefeber.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De anvender Cetirizin ratiopharm

Anvend ikke Cetirizin ratiopharm, hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, cetirizindihydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cetirizin ratiopharm
- har alvorligt nedsat nyrefunktion

Børn under 6 år må ikke anvende Cetirizin ratiopharm

Se desuden afsnittet om Graviditet og amning.

Særlige forholdsregler

Deres læge bør vide, hvis De

- har nedsat lever- eller nyrefunktion. Dosis skal da nedsættes i samråd med Deres læge.
- er i langtidsbehandling med Cetirizin ratiopharm. På grund af mundtørhed er der øget risiko for karies, hvorfor det er vigtigt med god mundhygiejne.
- samtidig indtager af alkohol. Cetirizin ratiopharm kan forstærke alkohols virkning.
- er i behandling med lægemidler, der påvirker centralnervesystemet.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Skal De have foretaget en allergitest, bør De afbryde behandlingen med Cetirizin ratiopharm 3 dage før testen for at undgå påvirkning af denne.

Cetirizin ratiopharm kan forstærke virkningen af alkohol og lægemidler, der påvirker centralnervesystemet

Brug af Cetirizin ratiopharm sammen med mad og drikkevarer

tabletten indtages bedst med væske (f.eks. ½ glas vand).

Vigtige oplysninger om indholdsstofferne i Cetirizin ratiopharm

Dette lægemiddel indeholder laktose. Kontakt Lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet & Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun bruge Cetirizin ratiopharm efter lægens anvisning. Der er begrænsede erfaringer med anvendelse af Cetirizin til gravide.

Amning

Erfaringerne med Cetirizin ratiopharm er begrænsede. De bør derfor ikke bruge Cetirizin ratiopharm, hvis De ammer. Spørg lægen.

3. Sådan skal De tage Cetirizin ratiopharm

Dosering

Følg altid lægens doseringsanvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for. Spørg Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Normal dosis til voksne og unge over 12 år:

1 tablet (10 mg) daglig.

Hvis De bliver døsige af behandlingen, kan tabletten indtages om aftenen.

Normal dosis til børn 6-12 år:

1 tablet (10 mg) daglig eller ½ tablet (5 mg) 2 gange daglig (morgen og aften).

Normal dosis til børn under 30 kg:

5 mg (½ tablet) én gang daglig.

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Må ikke anvendes til børn under 6 år.

Dosis skal nedsættes til personer med nedsat nyre- og leverfunktion.

Må ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion.

Hvis De mener, at virkningerne af Cetirizin ratiopharm er for kraftige eller for svage, bør De tale med Deres læge eller apotek herom.

Har De taget for meget Cetirizin ratiopharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Cetirizin ratiopharm end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Ved overdosering er der risiko for symptomer nævnt i bivirkningsafsnittet.

Ved behandlingskrævende overdosering kan mavesækken udskylles eller der anvendes aktivt kul. Behandling foretages af læge/sygehus.

Hvis De glemmer at tage Cetirizin ratiopharm

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. behandlingen skal fortsættes som normalt.

4. Bivirkninger

Cetirizin ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

mundtørhed, hovedpine, svimmelhed, døsigthed, søvnighed hos børn og voksne, ophidselse, mavegener og fordøjelsesforstyrrelser.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Unormal leverfunktion.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Allergiske hudreaktioner og angioneuritisk ødem (væskeansamlinger i underhuden). Såkaldt okulogyr krise, især hos børn (krampe tilstand i øjnene, hvor øjenæblerne sætter sig fast, normalt opad). Leverbetændelse

Fortæl lægen eller apoteket, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på lægemiddelstyrelsens hjemmeside: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

6. Yderligere information

Cetirizin ratiopharm 10 mg filmovertrukne indeholder

- Det aktive stof er cetirizin. En tablet indeholder henholdsvis 10 mg cetirizin.
- De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellose 5cP (E 464) og macrogol 400.

Tabletten er hvid, rund med delekærv på den ene side.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tel.: 45 46 06 60

Revideret august/2006