

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Citalopram ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Citalopram ratiopharm

10 mg, 20 mg og 40 mg

filmovertrukne tabletter

Citalopram

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning af Citalopram ratiopharm og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Citalopram ratiopharm
3. Sådan skal De tage Citalopram ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Citalopram ratiopharm
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning af Citalopram ratiopharm og hvad De skal bruge det til

- Citalopram tilhører en gruppe midler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoninoptagshæmmere).
- I hjernen findes et stof, der hedder serotonin. Mangel på serotonin menes at være en af årsagerne til depression. Det vides ikke med sikkerhed, hvordan citalopram virker, men det kan bidrage til at øge mængden af serotonin i hjernen.
- Citalopram ratiopharm anvendes til at behandle depression (moderate til svære depressive perioder).

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Citalopram ratiopharm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Citalopram ratiopharm, hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- samtidig tager eller for nyligt har taget en type medicin, der kaldes MAO-hæmmere (MAO = monoaminooxidasehæmmere - medicin bl.a. mod depression) Tal med lægen, før De begynder at tage Citalopram ratiopharm, da der måske skal gå op til 14 dage, efter at De er holdt op med at bruge en MAO-hæmmer. MAO-hæmmeren selegilin (mod Parkinsons sygdom), kan anvendes, men dosis må ikke overstige 10 mg dagligt. Hvis De skifter fra Citalopram ratiopharm til en MAO-hæmmer, skal der gå mindst syv dage, før De begynder at tage MAO-hæmmeren.
- samtidig tager pimozid (medicin til behandling af visse psykiatriske lidelser)

Fortæl det til lægen, før De begynder at tage Citalopram ratiopharm, hvis noget af dette gælder for Dem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Citalopram ratiopharm, hvis De

- tager anden medicin (se "Brug af anden medicin")
- har diabetes - i så fald skal lægen måske justere doseringen af insulin eller anden medicin til at sænke blodsukkeret.
- har epilepsi eller tidligere har haft anfald, eller De er begyndt at få krampeanfald under behandling med Citalopram ratiopharm. I tilfælde af et krampeanfald kan lægen vælge at afslutte behandling med Citalopram ratiopharm
- får elektrochok (elektrokonvulsiv behandling)
- lider af tilstande med mani/hypomani (overaktiv adfærd eller tankevirksomhed). Lægen kan beslutte at stoppe behandlingen med Citalopram ratiopharm, hvis De er på vej ind i en manisk fase.
- tidligere har haft blodningsforstyrrelser eller let kommer til at bløde, eller hvis De får medicin, der kan øge tendensen til at bløde (se afsnittet "Brug af anden medicin")
- er disponeret for visse hjertelidelser (forlængelse af det såkaldte QT-interval i et hjertediagram), eller hvis der er mistanke om, at De har medfødt langt QT-syndrom, eller De har lave kalium- eller magnesiumværdier i blodet
- har andre psykiatriske lidelser (psykoser)
- lider af nedsat lever- eller nyrefunktion I så fald kan lægen være nødt til at nedsætte dosis af Citalopram ratiopharm.

Fortæl det til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for Dem, da det kan berøre hvilken behandling De bør have.

Fortæl det omgående til lægen, hvis De får nogle af følgende symptomer under behandling med Citalopram ratiopharm - det kan betyde, at De har et såkaldt serotoninergt syndrom. Symptomerne på dette omfatter rastløshed, rysten/skælven, pludselige muskeltrækninger og feber. I så fald vil lægen omgående stoppe behandlingen med Citalopram ratiopharm.

I sjældne tilfælde og især hos ældre patienter kan Citalopram ratiopharm nedsætte mængden af natrium i blodet og medføre uheldig mængsig produktion af et hormon i hjernen, der regulerer kroppens væskebalance (SIADH-syndrom). Fortæl det til lægen, hvis De begynder at få kvalme og utilpasset med muskelsvækkelse eller at blive forvirret, mens De får Citalopram ratiopharm.

Børn og unge under 18 år

Citalopram ratiopharm bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Vær desuden opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og angst), når de tager denne type lægemidler. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Citalopram ratiopharm til patienter under 18 år ud fra en opfattelse af, at det vil være det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Citalopram ratiopharm, og De ønsker at tale om dette. De bør informere Deres læge, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der tager Citalopram ratiopharm. Der foreligger endnu ikke langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling, ved brug af Citalopram ratiopharm hos denne aldersgruppe.

Tanker om at skade sig selv

Mennesker, der er deprimerede, kan somme tider få tanker om at skade sig selv eller tage livet af sig. Sådanne tanker kan tage til, når De begynder at tage medicin mod depression, da det varer noget tid, før medicinen virker.

Visse patientgrupper kan være mere tilbøjelige til at nære disse tanker:

- yngre mennesker
- personer, der tidligere har tænkt på at begå selvmord eller skade sig selv.

Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet, når som helst De får sådanne tanker. Somme tider vil De måske ikke være opmærksom på dette, og det kan derfor være en hjælp at bede en ven eller pårørende om også at holde øje med tegn på forandringer i Deres adfærd.

ratiopharm

Vær særlig forsigtig, hvis De får symptomer såsom en fornemmelse af rastløshed og psykomotorisk uro, så De føler, at De ikke kan holde Dem i ro, hvilket normalt er forbundet med subjektivt ubehag (akatisi). Dette opstår for det meste i løbet af de første ugers behandling. Disse fornemmelser kan tage til, hvis doseringen af Citalopram ratiopharm øges (se afsnit 4 "Bivirkninger").

Abstinenssymptomer efter afbrydelse af behandlingen

Det er almindeligt at få abstinenssymptomer, når behandlingen med Citalopram ratiopharm afbrydes, især hvis det sker brat. Risikoen for abstinenssymptomer kan afhænge af en række faktorer inklusive behandlingsvarighed og dosering, samt hvor hurtigt doseringen reduceres. Svimmelhed, sanseforstyrrelser (inklusive paræstesier), søvnforstyrrelser (inklusive søvnløshed og intense drømme), ophidselse eller angst, kvalme og/eller opkastning, skælven og hovedpine er de mest almindelige reaktioner. Generelt er disse symptomer lette til moderate, men hos nogle patienter kan de optræde i svær grad. Normalt opstår de i løbet af de første par dage efter afbrydelse af behandlingen, men i meget sjældne tilfælde har symptomerne optrådt hos patienter, som er kommet til at springe en dosis over. Generelt er symptomerne selvbegrænsende og aftager i løbet af 2 uger, mens de dog hos nogle kan være langvarige (mindst 2-3 måneder). Derfor bør Citalopram ratiopharm nedtrappes gradvist i et forløb på flere uger eller måneder, alt efter hvordan De har det.

Hvis De får uudholdelige symptomer efter nedsættelse af dosis, kan det overvejes at genoptage behandlingen med den sidst anvendte dosis citalopram. Derefter kan lægen fortsætte med at reducere dosis, men med langsommere nedtrapning.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er især vigtigt for lægen at få kendskab til, om De er i behandling med:

- MAO-hæmmere og pimozid (se under "Tag ikke Citalopram ratiopharm")
- triptaner (medicin mod migræne såsom sumatriptan)
- tramadol (mod svære smerter)
- antikoagulantia, dipyridamol og ticlopidin (blodfortyndende medicin)
- acetylsalicylsyre, nonsteroid antiinflammatoriske midler (NSAID-midler) såsom ibuprofen (medicin til behandling af betændelsestilstande og smerter)
- antipsykotika (phenothiaziner [f.eks. thioridazin], thioxanthenener, butyrophenoner [f.eks. haloperidol]), atypiske antipsykotika, f.eks. risperidon (medicin til behandling af visse psykiatriske lidelser)
- tricykliske antidepressiva (medicin mod depression)
- urtemedicin, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum)
- cimetidin, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol (medicin til at nedsætte produktionen af mavesyre)
- tryptophan, oxitriptan (serotonin-forstadier)
- lithium (medicin mod mani)
- imipramin, desipramin, clomipramin, nortriptylin (medicin mod depression)
- fluvoxamin (medicin mod depression og tvangstanke/tvangshandlinger)
- mefloquin (medicin mod malaria)
- bupropion (medicin mod depression og som hjælp til at holde op med at ryge)
- flecainid, propafenon (medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme)
- metoprolol (medicin mod hjertesvigt)
- medicin, der kan give ændringer i et hjertediagram (forlænge QT-intervallet) eller nedsætte mængden af kalium eller magnesium i blodet. Spørg lægen eller apoteket, om den medicin, De tager eller anvender samtidig med Citalopram ratiopharm, hører til denne gruppe.

Brug af Citalopram ratiopharm sammen med mad og drikke

Undgå at drikke alkohol under behandlingen med Citalopram ratiopharm.

De kan tage Citalopram ratiopharm alene eller sammen med mad.

Tabletter indtages bedst med væske (f.eks. 1/2 glas vand).

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Der er begrænsede erfaringer med brug af citalopram under graviditet. Tag ikke Citalopram ratiopharm, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid, med mindre lægen anser det for absolut nødvendigt.

Undgå en brat afslutning på behandlingen med Citalopram ratiopharm. Hvis De tager Citalopram ratiopharm i de sidste 3 måneder af graviditeten, skal De fortælle dette til lægen, da barnet kan have symptomer ved fødslen. Disse symptomer opstår sædvanligvis i løbet af det første døgn efter barnets fødsel. Barnet kan f.eks. lide af søvnbesvær, problemer med at die, åndedrætsbesvær, blålig hud, have det for varmt eller for koldt, kaste op, græde meget, have stive eller slappe muskler, apati, skælven, rysten eller anfald. Kontakt omgående lægen for at få vejledning, hvis Deres barn har nogle af disse symptomer ved fødslen.

Amning

Citalopram udskilles i modermælk i små mængder. Der er risiko for påvirkning af barnet. Hvis De får Citalopram ratiopharm, skal De tale med lægen, før De begynder at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram ratiopharm har mindre eller moderat indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Medicin, der påvirker centralnervesystemet, kan nedsætte dømmekraften samt reaktionsevnen i nødsituationer. Undgå at køre bil eller betjene maskiner, indtil De ved, hvordan Citalopram ratiopharm påvirker Dem. Tal med lægen eller apoteket, hvis De er i tvivl.

3. Sådan skal De tage Citalopram ratiopharm

Dosering

Tag altid Citalopram ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

10 mg

Voksne

Den anbefalede startdosis er 2 filmovertrukne tabletter (20 mg citalopram) dagligt. Denne dosis kan øges op til 4 filmovertrukne tabletter

(40 mg citalopram) dagligt efter behov. Den maksimale dosis er 60 mg dagligt.

Ældre patienter (>65 år)

Dosis bør nedsættes til halvdelen af den anbefalede dosis, f.eks. 1-2 filmovertrukne tabletter (10-20 mg citalopram) dagligt. Denne dosis kan øget efter behov. Den maksimale dosis er 40 mg dagligt.

Nedsat leverfunktion

Den anbefalede startdosis er 1 filmovertrukket tablet (10 mg citalopram) dagligt i de første to uger. Dosis må ikke overstige 3 filmovertrukne tabletter (30 mg citalopram) dagligt.

20 mg Voksne

Den anbefalede startdosis er 1 filmovertrukket tablet (20 mg citalopram) dagligt. Denne dosis kan øges op til 2 filmovertrukne tabletter (40 mg citalopram) dagligt efter behov. Den maksimale dosis er 3 filmovertrukne tabletter (60 mg citalopram) dagligt.

Ældre patienter (>65 år)

Dosis bør nedsættes til halvdelen af den anbefalede dosis, f.eks. 1-2 filmovertrukne tabletter (10-20 mg citalopram) dagligt. Denne dosis kan øget efter behov. Den maksimale dosis er 2 filmovertrukne tabletter (40 mg citalopram) dagligt.

Nedsat leverfunktion

Den anbefalede startdosis er 1/2 filmovertrukket tablet (10 mg citalopram) dagligt i de første to uger. Dosis må ikke overstige 11/2 filmovertrukket tablet (30 mg citalopram) dagligt.

40 mg

Citalopram ratiopharm 40 mg er ikke egnet til alle de nedenfor angivne doseringer. Til disse doseringer findes der andre præparater med citalopram på markedet.

Voksne

Den anbefalede startdosis er 1/2 filmovertrukket tablet (20 mg citalopram) dagligt. Denne dosis kan øges op til 1 filmovertrukket tablet (40 mg citalopram) dagligt efter behov. Den maksimale dosis er 11/2 filmovertrukket tablet (60 mg citalopram) dagligt.

Ældre patienter (>65 år)

Dosis bør nedsættes til halvdelen af den anbefalede dosis, f.eks. 10-20 mg citalopram dagligt. Denne dosis kan øget efter behov. Den maksimale dosis er 1 filmovertrukket tablet (40 mg citalopram) dagligt.

Nedsat leverfunktion

Den anbefalede startdosis er 10 mg citalopram dagligt i de første to uger. Dosis bør ikke overstige 30 mg dagligt.

Citalopram ratiopharm bør gives som en enkelt dosis til indtagelse gennem munden enten morgen eller aften. Den/de filmovertrukne tabletter kan indtages alene eller sammen med mad, men bør tages med lidt væske.

Virkningen af Citalopram ratiopharm kan ikke mærkes med det samme. Der vil gå mindst to uger, før De kan mærke bedring. Fortsæt med at tage citalopram i 4-6 måneder efter, at symptomerne er gået væk.

Afbrydelse af behandlingen

Citalopram ratiopharm bør nedtrappes langsomt for at nedsætte risikoen for abstinenssymptomer. Lægen vil gradvist reducere dosis i løbet af 1-2 uger (se "Vær forsigtig med at bruge Citalopram ratiopharm").

Hvis De har taget for meget Citalopram ratiopharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Citalopram ratiopharm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Følgende symptomer kan forekomme: Søvnighed, koma, være ude af stand til at bevæge kroppen (stupor), krampeanfald, øget hjertebanken, øget svedtendens, kvalme, opkastning, blåfarvning af læber, tunge, hud og slimhinder (skyldes manglende iltning af blodet) og hurtig vejrtrækning. Endvidere kan der opstå serotonergt syndrom (symptomer: Se under "Vær særlig forsigtig med at bruge Citalopram ratiopharm").

Hvis De har glemt at tage Citalopram ratiopharm

Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage den næste dosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis De holder op med at tage Citalopram ratiopharm

De må ikke holde op med at tage Citalopram ratiopharm, før lægen anbefaler det. Citalopram ratiopharm bør nedtrappes langsomt, idet det anbefales at nedtrappe dosis gradvist i løbet af mindst 1-2 uger. Det er vigtigt, at De følger lægens anvisninger. Hvis De holder op med at tage Citalopram ratiopharm, og specielt hvis det sker for brat, kan De få abstinenssymptomer (se "Vær særlig forsigtig med Citalopram ratiopharm"). Tal med lægen, hvis De får abstinenssymptomer, efter at De er holdt op med at tage Citalopram ratiopharm.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller følger Dem usikkert på.

4. Bivirkninger

Citalopram ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger kan dog forekomme især i begyndelsen af behandlingen, og aftager sædvanligvis, efterhånden som depressionen aftager. Bivirkningerne vil oftest være milde og forbigående.

De bivirkninger, der er indberettet for citalopram, er beskrevet nedenfor opstillet efter hyppighed.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- søvnighed, søvnløshed, ophidselse, nervøsitet, hovedpine, rysten, svimmelhed
- problemer med at indstille øjnene på forskellige afstande
- galopperende hjerte (palpitationer)
- kvalme, mundtørhed, forstoppelse, diaré, øget svedtendens
- svækkelse og træthed (asteni)

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- vægttab eller vægtøgning
- søvnforstyrrelser, nedsat koncentrationsevne, unormale drømme, hukommelses-tab, angst
- nedsat lyst til sex
- øget eller nedsat appetit
- apati
- forvirring
- migræne
- myrekryb eller følelsesløshed i huden uden påviselig grund (paræstasier)
- nedsat syn
- øget hjertebanken, blodtryksfald når man rejser sig fra siddende/liggende stilling (somme tider ledsaget af svimmelhed), forhøjet eller for lavt blodtryk
- snue, bihulebetændelse
- fordøjelsesbesvær, opkastning, mavesmerter, luft i maven, øget spytksekretion
- udslæt, kløe
- vandladningsbesvær, øget vandladning (polyuri)
- ejakulationsbesvær, forsinket eller udeblevne orgasme hos kvinder, smertefulde menstruationer, impotens
- smagsforstyrrelser

- træthed, gaben

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- eufori
- øget lyst til sex
- ekstrapyramidale lidelser (nedsatte bevægelser, stivhed, rysten)
- krampeanfald
- susen for ørerne (tinnitus)
- nedsat hjertebanken
- hoste
- anormale leverfunktionsværdier
- lysfølsomhed
- muskelsmerter
- allergiske reaktioner
- pludseligt bevidsthedstab (fra nogle få sekunder til flere minutters varighed (synkope))
- generel utilpashed

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- blødning (f.eks. fra skeden, mave-tarm-systemet, ekkymose og andre blødninger i huden eller blødning i slimhinderne)
- selvmordstanker/selvmoedsadfærd (se "Vær særlig forsigtig med at tage Citalopram ratiopharm")
- rastløshed, kan ikke sidde eller stå stille (se "Vær særlig forsigtig med at tage Citalopram ratiopharm")
- især hos ældre patienter kan Citalopram ratiopharm nedsætte mængden af natrium i blodet og medføre uhensigtsmæssig produktion af et hormon i hjernen, der regulerer kroppens væskebalance (SIADH-syndrom).
- serotonergt syndrom

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- ser og hører ting, der ikke er der (hallucinationer), overaktiv adfærd eller tanker (mani), uvirkelighedsfølelse (depersonalisation), panikanfald (alle disse symptomer kan også skyldes selve depressionen)
- uregelmæssig hjertebanken
- angioneurotisk ødem (pludselig hævelse af hud og slimhinder på grund af væskeophobning [f.eks. i hals og tunge], åndenød og/eller kløe og udslæt). I tilfælde af disse symptomer: Hold op med at tage Citalopram ratiopharm og kontakt omgående lægen.
- ledsmerter
- unormal produktion af mælk i brysterne hos mænd og kvinder
- anafylaktiske reaktioner (alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som kan medføre shock [voldsomt blodtryksfald, blegthed, ophidselse, svag og hurtig puls, klam hud og nedsat bevidsthed] på grund af en pludselig udvidelse af blodkarrene).

Abstinenssymptomer efter afbrydelse af behandlingen

Se under "Vær særlig forsigtig med at bruge Citalopram ratiopharm.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. Sådan opbevarer De Citalopram ratiopharm

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Citalopram ratiopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er til den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Citalopram ratiopharm indeholder

10 mg
Aktivt stof: citalopram. 1 filmovertrukket tablet indeholder 10 mg citalopram (som hydrobromid).

20 mg
Aktivt stof: 1 filmovertrukket tablet indeholder 20 mg citalopram (som hydrobromid).

40 mg
Aktivt stof: 1 filmovertrukket tablet indeholder 40 mg citalopram (som hydrobromid).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: mannitol, mikrokrySTALLinsk cellulose, kolloid silica (vandfri), magnesiumstearat. Tabletovertræk: hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E171).

Citalopram ratiopharms udseende og pakningsstørrelse

10 mg
Runde, hvide tabletter med en diameter på 6 mm.

20 mg
Runde, hvide tabletter med delekærv og en diameter på 8 mm.
Tabletten kan deles i lige store halvdele.

40 mg
Runde, hvide tabletter med delekærv og en diameter på 10 mm.
Tabletten kan deles i lige store halvdele.

Pakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 100x1, 250 eller 500 filmovertrukne tabletter

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstillere

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Citalopram ratiopharm, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 46 06 60

Dette lægemiddel er autoriseret i medlemsstaterne i EEA under følgende navne:

Belgien:	Citalopram-ratiopharm
Danmark:	Citalopram ratiopharm
Den Tjekkiske Republik:	Citalopram-ratiopharm
Finland:	Citalopram-Ratiopharm
Holland:	Citalopram ratiopharm
Norge:	Citalopram ratiopharm
Slovakiet:	Citalopram-ratiopharm
Spanien:	Citaleq
Storbritannien:	Citalopram
Sverige:	Citalopram ratiopharm
Tyskland:	Citalopram-ratiopharm
Østrig:	Citalopram ratiopharm

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli/2007