

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Diclofenac ratiopharm Rapid til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Diclofenac ratiopharm Rapid 50 mg filmovertrukne tabletter Diclofenac

ratiopharm**1. Oversigt over indlægssedlen**

1. Diclofenac ratiopharm virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Diclofenac ratiopharm Rapid
3. Sådan skal De tage Diclofenac ratiopharm Rapid
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Diclofenac ratiopharm Rapid
6. Yderligere oplysninger

1. Diclofenac ratiopharm Rapid virkning og hvad De skal bruge det til

- Diclofenac ratiopharm Rapid er et inflammationshæmmende, smertestillende og feberdæmpende præparat.
- Diclofenac ratiopharm Rapid bruges til kortvarende symptomatisk behandling af følgende akutte tilstande: Reumatiske inflammationssygdomme (hævelse og irritation af muskler og led). Smerte- og inflammationsstilstande ved skader og operationer. Tandpine. Menstruationssmerter. Akut behandling af migræne med eller uden aura.

Diclofenac ratiopharm Rapid tabletter er ikke indikeret til børn under 14 år.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Diclofenac ratiopharm Rapid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Diclofenac ratiopharm Rapid, hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, diclofenac, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diclofenac ratiopharm Rapid.
- lider af mavesår eller sår på tolvfingertarmen
- har fået allergiske reaktioner såsom astma, allergisk snue eller nældefeber i forbindelse med indtagelse af acetylsalicylsyre eller andet smertestillende og inflammationshæmmende lægemiddel
- har øget blødnings tendens eller porfyri (øget forekomst af rødt farvestof i urinen)
- har alvorlig nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion
- er gravid i tredje trimester

Lægemidler som Diclofenac ratiopharm Rapid kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde ("myokardieinfarkt") og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har oplevet slagtilfælde eller mener, at du er i risiko for dette (hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesterol eller ryger), bør du tale med din læge eller apoteket om behandlingen.

Se desuden afsnittet om Graviditet og amning.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diclofenac ratiopharm Rapid, hvis De

- har haft sygdomme eller blødninger i mavearmkanalen
- har nedsat lever- hjerte- eller nyrefunktion
- har haft hjertesvigt eller forhøjet blodtryk
- har, eller tidligere har haft astma
- er i behandling med vanddrivende eller blodfortyndende medicin
- er gravid i første og andet trimester
- forsøger at blive gravid, specielt hvis De har problemer med at blive gravid

Ældre personer skal være forsigtige med at anvende diclofenac på grund af risikoen for forringet nyrefunktion.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Det er især vigtigt for lægen at få kendskab til, om De er i behandling med:

- litium (med manio-depressiv sygdom), digoxin (hjertemedicin) og methotrexat (gigtmiddel samt til kræftbehandling), idet diclofenac kan øge disse stoffers plasmakoncentrationer
- ciclosporin (gigtmiddel samt til kræftbehandling), idet diclofenac kan øge ciclosporins giftige påvirkning af nyrerne.
- quinoloner (antibiotikum), idet kombineret brug kan give krampor.
- glucokortikoider (betændelseshæmmende og smertestillende lægemidler), idet samtidig brug øger risikoen for mavearmblødninger.
- vanddrivende og blodfortyndende medicin samt tabletter mod sukkersyge.
- lægemidler til forhøjet blodtryk (beta-blokkere, ACE-hæmmere og diuretika), idet diclofenac kan mindske disse stoffers virkning.

Højere doser end de anbefalede kan medføre alvorlige risici. Anvend derfor ikke forskellige typer smertestillende midler samtidigt uden lægens ordination.

Brug af Diclofenac ratiopharm Rapid sammen med mad og drikkevarer

Tabletten indtages bedst med væske (f.eks. 1/2 glas vand).

Graviditet & Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke anvende Diclofenac ratiopharm Rapid under graviditetens sidste 3 måneder. Påvirkning af fostret kan også forekomme i graviditetens første 6 måneder, hvorfor De ikke bør anvende diclofenac i denne periode medmindre det er klart nødvendigt. Spørg lægen. Diclofenac kan mindske evnen til at blive gravid og øge risikoen for abort. De bør

derfor undgå at anvende diclofenac hvis De forsøger at blive gravid.

Amning

Diclofenac bliver udskilt i modermælken, men ved anbefalede doser påvirkes det ammende barn ikke. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenac ratiopharm Rapid kan hos enkelte give bivirkninger såsom sløvhed, svimmelhed, synsforstyrrelser, hvilke kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Diclofenac ratiopharm Rapid

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt Lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter

3. Sådan skal De tage Diclofenac ratiopharm Rapid

Dosering

Følg altid lægens doseringsanvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for. Spørg Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Normal dosis til voksne og børn over 14 år med akutte smertetilstande er 50-150 mg fordelt på 2-3 doser.

Migræne: I tilfælde af migræne bruges indledningsvist 50 mg ved første tegn på et anfald. Hvis der indenfor 2 timer efter indtag ikke opnås tilstrækkelig smertelindring, kan der tages yderligere 50 mg. Hvis det er nødvendigt, kan der tages supplerende doser på 50 mg hver 4.-6. time. Den daglige dosis bør ikke overstige 200 mg.

Har De taget for meget Diclofenac ratiopharm Rapid

Kontakt umiddelbart lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Diclofenac ratiopharm Rapid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering kan være lavt blodtryk, mave-tarm irritation, nyresvigt, kramper, nedsat vejrtrækning.

Hvis De har glemt at tage Diclofenac ratiopharm Rapid

De må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for glemte enkelt doser. fortsæt som normalt med næste dosis.

4. Bivirkninger

Diclofenac ratiopharm Rapid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Lægemidler som Diclofenac ratiopharm Rapid kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde ("myokardieinfarkt") og slagtilfælde.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Mavepine og andre mavetarmforstyrrelser (f.eks. kvalme, opkastning, diarré, mavekrampe, fordøjelsesbesvær, øget dannelse af tarmgas, appetitløshed. Hovedpine, svimmelhed. Udslet, kløe. Øget mængde leverenzymen.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

leverbetændelse med eller uden gulsot.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

blødning og sår i mavetarmkanalen, betændelse i mund og på tungen, spiserørsbeskadigelse, forsnævring i tarmen og forstoppelse. Dødelig. Overfølsomhedsreaktioner som astma, anafylaktiske reaktioner (akut allergisk reaktion om-

fattende lavt blodtryk).

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Myrekryb, hukommelsesforstyrrelser, desorientering, synsforstyrrelser (slørret syn, dobbeltsyn), svækket hørelse, tinnitus, søvnløshed, pirrelighed, krampetæknninger, depression, ængstelse, mareridt, skælven, psykotiske reaktioner, smagsforstyrrelser og meningitis. hudbetændelse, eksem, røde udslet på huden og i munden, irriteret hud med forhorning og bladet afskalning (eksfoliativ dermatitis), hårtab, lysfølsomhedsreaktioner, små allergiske blødninger i huden. akut nyresvigt, blod og proteiner i urinen, nyrebetændelse, nefrotisk syndrom (symptomkompleks med høj proteinudskillelse i urinen, hævelser og øget fedtindhold i blodet) og nedbrydelse af nyrepapillærer (papillær nekrose). Dødelig leverbetændelse. Ændrede blodtal, anæmi. hjertebanken, brystsmerte, forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Betændelse af kar og lungebetændelse. Impotens.

Afbryd medicineringen og kontakt omgående lægen, hvis De i løbet af behandlingen får følgende meget sjældne symptomer: Stevens-Johnsons syndrom (blæreformede udslet på hud og/eller slimhinder med feber), Lyells syndrom (afstødning af omfattende hudområder, samt organbeskadigelse, særlig af lunger og nyrer).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. Sådan opbevarer De Diclofenac ratiopharm Rapid

Brug ikke Diclofenac ratiopharm Rapid efter den udløbsdato, der står på pakningen

Opbevares utilgængeligt for børn.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De må ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Diclofenac ratiopharm Rapid 50 mg filmovertrukne tabletter

- Det aktive stof er diclofenac. En tablet indeholder 50 mg diclofenackalium.
- De øvrige indholdsstoffer er mikrokrySTALLINSK cellulose, laktosemonohydrat, majsstivelse, carmelloseatrium, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hypromellose, glycerol, titandioxid (E171), rød og gul jernoxid (E172).

Markedsføres i Danmark af

Diclofenac GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstillere

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Diclofenac ratiopharm Rapid, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm Tel.: 45 46 06 60

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar/2007