

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Felodipin ratiopharm 2,5 mg, 5 mg og 10 mg depottabletter
Felodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Felodipin ratiopharm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin ratiopharm
3. Sådan skal du tage Felodipin ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Felodipin tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes selektive kalciumblokkere. Disse virker afslappende og udvidende på blodkarrerne ved at mindske mængden af kalcium som kommer in i arteriernes muskelceller. Efterhånden som blodkarrerne udvides falder blodtrykket. Din læge har ordineret dig denne medicin for at sænke dit høje blodtryk (hypertension).

Lægen kan have givet dig Felodipin ratiopharm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin ratiopharm

Tag ikke Felodipin ratiopharm, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for felodipin eller andre dihydropyridiner (lægemidler som amlodipin, isradpin, nifedipin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i tableten.
- har haft shock, som var forårsaget af utilstrækkelig blodcirkulation p.g.a. hjertesvigt (kardinogent shock).
- har angina pectoris (brystsmerter selv i hvile) som forværres og bliver uforudsigeligt.
- har haft hjerteinfarkt indenfor de seneste 8 uger.
- har andre alvorlige hjertesygdomme, som alvorlig forsnævring af hjerteklapperne (aorta- og mitralklapstenose) eller blodets passage ud af hjertet er besværet eller ukontrolleret hjertesvigt. Spørg din læge.
- har alvorligt nedsat leverfunktion.
- er gravid.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Felodipin ratiopharm, hvis du

- har rytmeforstyrrelser i hjertet, nedsat pumpefunktion i hjertet, hjertebanken (tachycardia) eller forsnævninger omkring hjerteklapperne (aorta- eller mitralklapstenose).
- har leverproblemer, idet dit blodtryk kan falde mere. Din læge vil overveje en dosisreduktion.
- har alvorlig nedsat nyrefunktion.

Spørg lægen hvis du er i tvivl.

Behandlingen med Felodipin ratiopharm bør ikke afsluttes pludseligt, eftersom en kraftig blodtryksstigning kan opstå. Blodtryksfaldet ved brug af felodipin kan hos udsatte/disponerede

patienter medføre hurtig puls med efterfølgende blodmangel i hjertemuskelen og hjertekrampe. I værste tilfælde kan hjerterinfarkt forekomme.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med:

- digoxin (hjertemedicin). Lægen vil nedsætte digoxin dosis.
- andre blodtryksænkende lægemidler.
- medicin mod depression.
- cimetidin (mod mavesår).
- erythromycin, clarithromycin, telithromycin (mod bakterieinfektioner).
- rifampicin (antibiotikum mod tuberkulose).
- visse lægemidler til behandling af HIV-infektion (proteasehæmmere).
- itraconazol, ketoconazol (svampemidler).
- karbamazepin, fenytoin, barbiturater (lægemidler mod epilepsi) eller perikum (naturpræparat mod depression). Disse kan mindske virkningen af felodipin, hvorfor lægen kan øge din dosis.
- Fenobarbital (søvnmedicin), kan mindske virkningen af felodipin, hvorfor lægen kan øge din dosis.
- hydrochlorthiazid (vanddrivende middel).
- ciclosporin (lægemiddel til nedsættelse af immunforsvaret).

Brug af Felodipin ratiopharm sammen med mad og drikke

Grapejuice kan påvirke virkningen af lægemidler som Felodipin ratiopharm. Drik ikke grapejuice når du tager dine tabletter.

Du kan indtage Felodipin ratiopharm tabletterne på tom mave eller sammen med lidt mad. Undlad at indtage Felodipin ratiopharm depottabletter med meget fed mad.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Tag ikke Felodipin ratiopharm hvis du er gravid.

Små mængder felodipin kan overføres til barnet via modermælken. Tal med din læge inden du bruger dette lægemiddel, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Felodipin ratiopharm kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder især i begyndelsen af behandlingen, i forbindelse med ændret dosering, ved skift af lægemiddel eller samtidig alkoholindtagelse.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Felodipin ratiopharm

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Felodipin ratiopharm

Tag altid Felodipin ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Tabletter skal tages hele om morgenen med tilstrækkelig væske (f.eks. et glas vand).

Tabletterne må ikke tygges eller knuses. Felodipin ratiopharm depottabletter er beregnet til at frigive det aktive stof jævnt over hele døgnet.

Voksne

Den normale dosis er 5 mg felodipin en gang daglig. Afhængig af virkningen på dig kan dosis øges til 10 mg felodipin. Maksimal døgndosis er 10 mg felodipin.

Ældre

Den anbefalede initialdosis er 2,5 mg en gang daglig. Ved behov kan lægen forsigtigt øge dosis.

Nedsat nyrefunktion

Normal dosering anvendes ved let til moderat nedsat nyrefunktion.

Ved alvorligt nedsat nyrefunktion vil lægen give en lavere dosis.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion skal du ikke tage Felodipin ratiopharm. Ved nedsat leverfunktion vil lægen give en lavere dosis.

Brug til børn

Felodipin anbefales ikke til børn.

Hvis du har taget for meget Felodipin ratiopharm

Kontakt **umiddelbart** lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Felodipin ratiopharm, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Felodipin ratiopharm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag tabletten så snart du husker og fortsæt siden som normalt med den næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Felodipin ratiopharm

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen! Ved pludselig stop i behandlingen kan der i enkelte tilfælde opstå alvorligt højt blodtryk.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Felodipin ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis en af følgende bivirkninger opstår, skal du umiddelbart kontakte lægen eller gå til nærmeste skadestue:

- hurtig hævelse af ansigtet, læber, tunge eller hals
- allergiske reaktioner som hvæsende åndedræt, åndenød, ekstrem svimmelhed eller kollaps, eller alvorlige udslag med røde pletter og blærer.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- hovedpine
- rødmen i ansigtet, nakken og øverste del af brystkurven
- ringen for ørerne.

Disse symptomer kan opstå specielt i begyndelsen af behandlingen, eller ved høje doser eller når dosis ændres. Oftest forsvinder symptomerne under fortsat behandling.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- hævede arme og ben
- angina pectoris (smerter i brystregionen), specielt i begyndelsen af behandlingen.

Hos patienter, der i forvejen har angina pectoris, kan antallet, varigheden og sværhedsgraden af anfaldene øges.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- svimmelhed, træthed, besvimelse, uro, myrekryb

- hjertebanken, hurtig puls, for lavt blodtryk
- åndenød
- ildebefindende, opkastninger, diaré, forstoppelse
- hudreaktioner og allergiske reaktioner såsom kløe, udslæt, nældefeber og overfølsomhed overfor sollys
- hævelser i tandkødet
- muskelsmerter, ledsmerter, rystelser
- vægtforøgelse, svedning.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- betændelse i blodkarrene.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- hjerteinfarkt (kun hos patienter med brystkrampe [angina] på grund af for stort blodtryksfald)
- unormale levertal
- skællende hud
- impotens, forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd
- kraftigere menstruationsblødninger end normalt
- hævelse i hud og slimhinder
- feber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Felodipin ratiopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Felodipin ratiopharm hvis der er synlige tegn på nedbrydelse af tabletten.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Felodipin ratiopharm indeholder

- Det aktive stof er felodipin. En depottablet indeholder henholdsvis 2,5 mg, 5 mg og 10 mg felodipin.
- De øvrige indholdsstoffer er mikrokrySTALLinsk cellulose, lactosemonohydrat, hypromellose, polyvidon K25, propylgallat, silica, kolloid vandfri, magnesiumstearat, talcum, propylenglykol, gul jernoxid (E 172), titandioxid (E171).
Styrkerne 5 mg og 10 mg indeholder desuden rød jernoxid (E172).

Felodipin ratiopharms udseende og pakningsstørrelser

Depottablet 2,5 mg: Rund, bikonveks, gul filmovertrukket tablet præget med "2,5"

Depottablet 5 mg: Rund, bikonveks, lyserød filmovertrukket tablet præget med "5"

Depottablet 10 mg: Rund, bikonveks, rødbrun filmovertrukket tablet præget med "10"

Pakningsstørrelser:

2,5 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 100, 100x1 depottabletter.

5 og 10 mg: 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 98, 100 x 1, 100 eller 250 depottabletter.

Det er muligt, at ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Repræsentant for Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tel.: 45 46 06 60

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 2011.