

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Finasterid ratiopharm 5 mg filmovertrukne tabletter
Finasterid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Finasterid ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Finasterid ratiopharms virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Finasterid ratiopharm
3. Sådan skal De tage Finasterid ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Finasterid ratiopharm
6. Yderligere oplysninger

1. Finasterid ratiopharms virkning og hvad De skal bruge det til

Finasterid ratiopharm hører til en gruppe lægemidler, der kaldes 5-alfa-reduktasehæmmere. De virker ved at reducere størrelsen af prostata, blærehalskirtlen hos mænd.

Finasterid ratiopharm anvendes til behandling og kontrol af godartet forstørrelse af prostata (godartet prostatahypertrofi). Det får den forstørrede prostata til at skrumpes, forbedrer uringennemstrømningen og symptomerne på godartet prostatahypertrofi samt nedsætter risikoen for akut vandladningsbesvær og behovet for en operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Finasterid ratiopharm

Tag ikke Finasterid ratiopharm, hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- er kvinde (se også under "Graviditet og amning")
- er barn

Vær ekstra forsigtig med at bruge Finasterid ratiopharm, hvis De

- har en stor mængde resturin og/eller alvorligt nedsat uringennemstrømning. I så fald skal De undersøges nøje for indsnævring af urinvejene.
- har en leversygdom. Plasmakoncentrationen af finasterid kan være forhøjet hos disse patienter.
- hvis Deres seksualpartner er eller kan blive gravid bør De beskytte hende fra kontakt med Deres sæd, som kan indeholde små mængder af lægemidlet.

Hvis et af disse punkter gælder for Dem eller tidligere har gjort det, skal De tale med lægen om det.

I så fald bør De før indledning af behandling med finasterid og løbende under behandlingen have en lægeundersøgelse (herunder rektal eksploration) og få bestemt indholdet af prostata-specifikt antigen (PSA) i serum.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Der er ikke påvist væsentlige lægemiddelinteraktioner.

Brug af Finasterid ratiopharm sammen med mad og drikke

Tabletterne indtages bedst med væske (f.eks. ½ glas vand).

De kan tage Finasterid ratiopharm alene eller sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Finasterid ratiopharm er udelukkende beregnet til mænd.

Kvinder, som er eller som kunne blive gravide, må ikke håndtere knuste eller knækkede Finasterid ratiopharm tabletter. Hvis finasterid optages gennem huden eller indtages gennem munden af en gravid kvinde, der venter en dreng, kan barnet blive født med misdannede kønsorganer

Tabletterne er filmovertukne, hvilket forebygger kontakt med finasterid, så længe tabletterne ikke brydes eller knuses.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Finasterid ratiopharm påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid ratiopharm

Tabletterne indeholder lactose. Patienter med de sjældne arvelige lidelser galactoseintolerans, lactasemangel (som det kendes hos samer) og glucose- og galactosemalabsorption, bør ikke tage dette lægemiddel.

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Finasterid ratiopharm

Dosering

Tag altid Finasterid ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Den normale dosis er 1 tablet om dagen, hvilket svarer til 5 mg finasterid.

De filmovertukne tabletter kan enten tages på tom mave eller med mad og drikke. Tabletten bør synkes hel og må ikke deles eller knuses.

Selvom tidlig bedring kan forekomme, kan det være nødvendigt at fortsætte behandlingen i mindst seks måneder for at bedømme, om der er opnået en positiv virkning. Deres læge vil oplyse Dem om, hvor længe De bør fortsætte med Finasterid ratiopharm 5 mg. Afbryd ikke behandlingen i utide, da symptomerne så kan komme igen.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke erfaring med brug af Finasterid ratiopharm 5 mg hos patienter med nedsat leverfunktion (se også under "Vær særlig forsigtig med at anvende Finasterid ratiopharm 5 mg").

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig. Brug af Finasterid ratiopharm 5 mg hos patienter, som skal i hæmodialyse, er endnu ikke undersøgt.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

De bør fortælle det til Deres læge eller apotek, hvis De føler, at virkningen af Finasterid ratiopharm 5 mg er for stærk eller for svag.

Hvis De har taget for meget Finasterid ratiopharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Finasterid ratiopharm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Dette gælder også, hvis et barn får medicinen i sig ved en fejltagelse.

Hvis De har glemt at tage Finasterid ratiopharm

Hvis De glemmer at tage en dosis Finasterid ratiopharm 5 mg, kan De tage den, så snart De kommer i tanke om den, med mindre det snart er tid til næste dosis. I så fald skal De fortsætte med at tage medicinen som anvist.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål om brug af lægemidlet.

4. Bivirkninger

Finasterid ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De hyppigste bivirkninger er impotens og nedsat lyst til sex. Disse bivirkninger opstår normalt ved starten på behandlingen, men varer sædvanligvis ikke længe hos de fleste patienter, hvis de fortsætter med behandlingen. Der kan også forekomme træthed.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)
Impotens.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)
Nedsat lyst til sex, nedsat sædmængde, brystspændinger/forstørrede bryster, problemer med sædafgang. Udslæt.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)
Testikelsmerter.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Kløe, urticaria (nældefeber), overfølsomhedsreaktioner såsom hævelser i ansigt og læber.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Udskillelse af væske fra brystet, knuder i brystet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. Sådan opbevarer De Finasterid ratiopharm

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Finasterid efter den udløbsdato, der står på beholderen og den ydre emballage. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Finasterid ratiopharm indeholder

- Aktivt stof: En filmovetrukket tablet indeholder 5 mg Finasterid.
- Øvrige indholdsstoffer: Tabletkernen indeholder lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret (majs)stivelse, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat. Tablettens overtræk indeholder hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, macrogolstearat (type I).

Finasterid ratiopharms udseende og pakningsstørrelse

Finasterid ratiopharm er hvide, runde, bikonvekse, filmovetrukne tabletter med en diameter på 7 mm og præget med "F" og "5" på den ene side.

Blisterpakninger af PVC/PVDC/aluminium: 15, 28, 30, 50, 98, 100 & 50 x 1, 100 x 1.

HPDE-flasker: 100.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Finasterid ratiopharm, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tlf.: 45 46 06 60

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni/2008