

creon[®] 25.000

hårde enterokapsler

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen.

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Creon 25.000 er røde/klare kapsler.
- Creon 25.000 enterokapsler indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Du kan tage Creon 25.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.
- Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER CREON 25.000

- *Tag ikke Creon 25.000 enterokapsler hvis:*
 - Du er overfølsom overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Creon 25.000.
 - Du er allergisk over for svineprotein eller andre svineprodukter.
 - Du har akut betændelse i bugspytkirtlen.
 - Du har akut forværring af kronisk lidelse i bugspytkirtlen.
- *Særlige forholdsregler:*
 - Du skal kontakte lægen, hvis:
 - Du har svær forstoppelse,
 - tarmen ikke fungerer, eller
 - der er betændelse i tarmen.
 - Hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Creon 25.000 efter lægens anvisning.
- *Brug af Creon 25.000 sammen med mad og drikkevarer*
Det er bedst at tage Creon 25.000 sammen med mad og drikke.



- *Graviditet og amning*

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Creon 25.000 enterokapsler efter lægens anvisning.

Amning:

Du kan amme, selvom du tager Creon 25.000.

Trafik og arbejdssikkerhed

Creon 25.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. SÅDAN SKAL DU TAGER CREON 25.000

- *Dosering*

Voksne: 1 enterokapsel til de 3 hovedmåltider.

Behandlingen starter med lav dosis og bliver derefter justeret til dit behov. Du må kun ændre din dosis i samråd med lægen.

Børn:

Du må kun give Creon 25.000 enterokapsler til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Du kan synke kapslerne hele, eller du kan åbne dem, og bruge granulatet som drys på f.eks. ymer. Det er vigtigt at indtage granulatet STRAKS efter at du har blandet det. Granulatet må IKKE tygges.

Indtag altid rigelig væske (2–3 liter) hver dag i de perioder, hvor du bruger Creon 25.000.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

- *Har du taget for meget Creon 25.000?*

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Creon 25.000, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn.



- *Har du glemt at tage Creon 25.000?*
Glemmer du at tage en dosis, så tag den i forbindelse med næste måltid. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Creon 25.000 kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

- *Meget sjældne bivirkninger* (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Bindevævsforandringer i tyktarmen. Forsnævring af tyktarmen og blod i afføringen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- *Almindelige bivirkninger* (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Mavesmerter.
- *Ikke almindelige bivirkninger* (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Diaré, kvalme, forstoppelse, opkastning, unormal afføring og udslæt.
- *Frekvens ukendt: Vægttab, irritation ved endetarmen og luft i maven.*
Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

- Opbevar Creon 25.000 utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Creon 25.000 ved over 30 °C.
- Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på fordærv.
- Brug ikke Creon 25.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Afløber altid medicinrester på apoteket.

Creon 25.000 indeholder:

- Creon 25.000 hårde enterokapsler
- Det aktive indholdsstof i Creon 25.000 er pankreatin svarende til

Amylase	18.000 EP-enheder
Lipase	25.000 EP-enheder
Protease	1.000 EP-enheder
- Hjælpestofferne er: Macrogol 4000; hypromellosephthalat; cetyl alkohol; triethylcitrat; dimeticon.
- Gelatinekapslen er farvet med gul og rød jernoxid (E172) og titandioxid (E171) og indeholder natriumlaurylsulphat.
- *Creon 25.000 enterokapsler er sukker- og lactosefri.*

Markedsføring i Danmark:

Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20 · D-30173 Hannover · Tyskland

Repræsentant i Danmark:

Solvay Pharma APS
Hørkær 28 · DK-2730 Herlev

Fremstiller:

Solvay Pharmaceuticals GmbH
Justus-von-Liebig-Strasse 33 · D-31535 Neustadt · Tyskland

Revideret marts 2007



1040496

