

duspatalin[®] retard

depotkapsler, hårde 200 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage Duspatalin Retard.

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Duspatalin Retard til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Duspatalin Retard.
3. Sådan skal du tage Duspatalin Retard.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

Duspatalin Retard, depotkapsler, hårde 200 mg indeholder:

- Det aktive indholdsstof er mebeverinhydrochlorid.
- Hjælpestofferne er: Magnesiumstearat; polyacrylat 30%, dispergeret; talcum; hypromellose; methacrylsyreethylacrylat copolymer (1:1); glyceroltriacetat; gelatine; titandioxid (E171).

Markedsføring i Danmark:

Abbott Healthcare Products B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 Weesp
Holland

Fremstiller:

Abbott Healthcare SAS
Route de Belleville, Lieu dit Maillard
01400 Châtillon sur Chalaronne
Frankrig

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12
8121 AA Olst
Holland

Repræsentant i Danmark:

Abbott Products ApS
Hørkær 28
DK-2730 Herlev

1. Virkning og anvendelse

- Duspatalin Retard 200 mg er en hvid kapsel.
- Duspatalin Retard virker afslappende på tarmens muskulatur.
- Du kan bruge Duspatalin Retard til behandling af kramper i maven og tarmen.
- Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Duspatalin Retard

• Tag ikke Duspatalin Retard hvis:

Du er overfølsom over for det aktive indholdsstof eller et eller flere af hjælpestofferne.

• Særlige forholdsregler:

Du bør ikke tage Duspatalin Retard, hvis du har smerter i maven, og du samtidig har forstoppelse.

• Brug af Duspatalin Retard sammen med mad og drikkevarer

Du forbedrer måske virkningen af Duspatalin Retard, hvis du tager det $\frac{1}{2}$ time før et måltid.

• Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Duspatalin Retard efter lægens anvisning.

Amning:

Du må kun tage Duspatalin Retard efter lægens anvisning.

3. Sådan skal du tage Duspatalin Retard

• Dosering

Voksne:

1 depotkapsel 2 gange daglig, morgen og aften.

Du skal tage depotkapslerne med lidt vand. Du må ikke tygge dem.

Følg altid lægens anvisning.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du bør kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen.

• Har du taget for meget Duspatalin Retard?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Duspatalin Retard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomerne på overdosering er mundtørhed, hjertebanken og hurtig puls.

• Har du glemt at tage Duspatalin Retard?

Tag aldrig dobbelt dosis for glemte doser. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis.

4. Bivirkninger

Duspatalin Retard kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):
Hævelse af tunge, læber og ansigt. Åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter):
Nældefeber, udslæt. Svimmelhed, hovedpine, søvnproblemer, anoreksi.
Langsom puls. Mave-tarmbesvær.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.
Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevar Duspatalin Retard utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Duspatalin Retard ved temperaturer over 30° C.
- Opbevar ikke Duspatalin Retard koldt.
- Opbevar Duspatalin Retard i original emballage, da lægemidlet er lysfølsomt.
- Brug ikke Duspatalin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Revideret juni 2010

1071736 CL1062



↑
code laetus