

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Inotyol

Ichthammol, zinkoxid og titandioxid.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Inotyol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

OBS Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Inotyol
3. Sådan skal du bruge Inotyol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere information

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Inotyol er en tjæreholdig salve.

Du kan bruge Inotyol til:

- At lindre svie og kløe ved hudirritation.
- At behandle røde barnenumser.
- At behandle forskellige former for eksem.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE INOTYOL

Brug ikke Inotyol:

- hvis du er allergisk over for et eller flere af de aktive stoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Inotyol (angivet i pkt. 6).
- hvis du har væskende og betændte sår i det hudområde, du behandler.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør ikke bruge Inotyol, hvis du vil tage solbad eller gå i solarium.

Inotyol kan smitte af på tøjet.

Brug af anden medicin sammen med Inotyol

Du kan bruge Inotyol sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Inotyol under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Inotyol.

Du må ikke bruge Inotyol på brystvorterne, hvis du ammer.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Inotyol

Inotyol salve indeholder lanolin, som kan give lokalt hududslæt (f. eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE INOTYOL

Dosering

Voksne:

Smør salven på huden 1-3 gange daglig.

Børn:

Du bør ikke bruge Inotyol salve til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Smør salven på barnets hud 1-3 gange daglig.

Hvis du har brugt for meget Inotyol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Inotyol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Inotyol.

Hvis du har glemt at bruge Inotyol

Du skal smøre salven på, når du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter)

- Kontakteksem.

Hyppigheden ikke kendt

- Øget følsomhed af huden over for lys.
- Betændelse i hårsække.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Inotyol utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Inotyol over 30 °C.

Brug ikke Inotyol efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Inotyol, salve indeholder:

- Aktive stoffer pr 1 g salve: Ichthammol 15 mg, zinkoxid 150 mg, titandioxid (E171) 50 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Vandfri lanolin, hvid blød paraffin, tynd paraffinolie, lavendelolie, rensset vand.

Pakningsstørrelser:

Tube, 50 g

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Laboratoires Fournier S.A.S.
42 Rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes
Frankrig

Fremstiller:

Laboratoires URGO
ZI Excellence 2000,
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Frankrig

Dansk repræsentant

Abbott Laboratories A/S
Emdrupvej 28C
2100 København Ø
Telefon 39 77 00 00

Revideret
Marts 2013