



Filmovertrukne tabletter 0,2 mg og 0,4 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage Physiotens.

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Physiotens til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Physiotens.
3. Sådan skal du tage Physiotens.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

- Du kan bruge Physiotens til behandling af for højt blodtryk.
- Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Physiotens

• Tag ikke Physiotens hvis du lider af:

- Overfølsomhed over for det aktive indholdsstof eller et eller flere af hjælpestofferne.
- Forstyrrelser i hjerterytmen med uregelmæssig og /eller meget langsom eller meget hurtig puls.
- Anden alvorlig hjertesygdom.
- Hjertekramper (angina pectoris).
- Alvorlig leversygdom.
- Alvorligt nedsat nyrefunktion.
- Allergisk reaktion med hævelser i ansigtet, mundhulen og strubehovedet (Quinckes ødem).

• Særlige forholdsregler:

- Du må kun tage Physiotens efter lægens anvisning, hvis du har:
- Dårlig blodforsyning til benene (claudicatio intermittens).
 - Forstyrrelser i blodforsyningen til arme og/eller ben (Raynauds sygdom).
 - Haft blodprop i hjertet for nylig.
 - Forstyrrelser i blodforsyningen til hjernen.
 - Parkinsons sygdom.
 - Epilepsi.
 - Grøn stær.
 - Depression.

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Physiotens.

Hvis du afbryder behandlingen, skal du nedtrappe gradvis. Tal med lægen. Hvis du tager Physiotens og en betablokker samtidig, skal du nedtrappe behandling med betablokkeren, før du afbryder behandlingen. Du kan ellers få tilbagefald af for højt blodtryk.

• Brug af Physiotens sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Physiotens sammen med mad og drikke. Tabletterne bør tages med tilstrækkelig væske.

• Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Physiotens

Physiotens indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager medicinen, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

• Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Physiotens under graviditet.

Amning :

Hvis du ammer, må du ikke tage Physiotens.

• Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Physiotens kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

• Brug af anden medicin

Physiotens kan forstærke virkningen af anden medicin. Tal med lægen, hvis du tager:

- Andre blodtryksnedsættende midler (antihypertensiva).
- Alkohol.
- Beroligende midler.
- Sovemedicin.
- Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).
- Hjertemedicin (digoxin).
- Insulin eller tabletter mod diabetes (sulfonylurinstoffer).
- Gigtmidler (antireumatika).
- Medicin mod for meget fedt i blodet.
- Medicin mod urinsur gigt (allopurinol, probenecid).
- Medicin mod sår i maven eller tolvfingertarmen.
- Medicin mod forstyrrelser i stofskiftet.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Physiotens

• Dosering

Voksne:

Tag til at begynde med 1 tablet på 0,2 mg om morgenen.

Din behandling skal ændres med 3 ugers mellemrum, indtil blodtrykket er blevet normalt.

Den sædvanlige dosis er 2 tabletter på 0,2 mg (eller 1 tablet på 0,4 mg) daglig, fordelt på morgen og aften. Følg lægens anvisning.

Nogle patienter kan have brug for mere Physiotens:

Du kan tage 3 tabletter på 0,2 mg daglig, fordelt morgen og aften. Følg lægens anvisning.

Den højeste dosis er: 2 tabletter på 0,2 mg (eller 1 tablet på 0,4 mg) fordelt på flere gange om dagen.

Ældre:

Hvis dine nyrer virker normalt, skal du tage det samme som andre voksne.

Børn:

Du må ikke give Physiotens til børn og unge under 16 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Du må ikke tage mere end 1 tablet på 0,2 mg (eller 1/2 tablet på 0,4 mg). Den samlede dosis på en dag må ikke være større end 2 tabletter på 0,2 mg (eller 1 tablet på 0,4 mg). Følg lægens anvisning.



Nedsat leverfunktion:

Har du en leverfunktion, der er lidt nedsat, kan du tage det samme som andre voksne. Tal med lægen.
Har du alvorlig leversygdom, må du ikke bruge Physiotens. (Se også under ”Særlige forholdsregler”).

Hvis du afbryder behandlingen, skal du aftrappe dosis gradvis i løbet af 2 uger. Tal med lægen.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

• Har du taget for meget Physiotens?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Physiotens, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomerne på overdosering er hovedpine, sløvhed, søvnighed, for lavt blodtryk, svimmelhed ved skift fra liggende til stående stilling, svaghed, langsom hjerterytme, træthed, mavesmerter og mundtørhed. Sjældent opkastning. Meget sjældent kan blodtrykket stige.

• Har du glemt at tage Physiotens?

Tag aldrig dobbelt dosis. Glemmer du en dosis, så fortsæt med den næste enkelt dosis.

4. Bivirkninger

Physiotens kan som al anden medicin give bivirkninger.

Du kan i starten af behandlingen få bivirkninger, men de forsvinder ofte igen i løbet af de første uger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)*
Forstyrrelser i blodforsyningen til arme og/eller ben med smerter og blåfarvning af huden, hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet (Quinckes ødem).

Meget sjældne bivirkninger *(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)*
Gulsot, alvorlig leversygdom.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger *(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)*
Hovedpine, svimmelhed, søvnighed, sløvhed, mundtørhed.

Almindelige bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)*
Forandret tænkemåde, søvnforstyrrelser,

kvalme, forstoppelse og andre mave-tarmgener, kraftesløshed.

Ikke almindelige bivirkninger *(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)*
Brystudvikling hos mænd, impotens, nedsat sexlyst, depression, angst, søvnbesvær, tør kløende eller brændende fornemmelse i øjet, svimmelhed når du rejser dig op, snurren og prikken i arme og ben, hududslæt, kløe, vandladningsproblemer, væskeophobning i kroppen, svaghedsfølelse i benene, appetitmangel, smerte i ørespytkirtlen.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevar Physiotens utilgængeligt for børn.
- Tag ikke Physiotens efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Physiotens, filmovertrukne tabletter 0,2 mg og 0,4 mg indeholder:

- Det aktive indholdsstof er moxonidin.
- Hjælpestofferne er: Lactose, povidon, crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, ethylcellulose, macrogol 6000, talkum, titandioxid (E 171), jernoxid rød (E 172).

Markedsføring i Danmark:

Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
Tyskland

Fremstiller :

Solvay Pharmaceuticals
Avenue Foch
01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Frankrig

Repræsentant i Danmark:

Solvay Pharma APS
Hørkær 28
DK-2730 Herlev

Revideret januar 2006

