

Indlægsseddel: Information til brugeren

Treo® Citrus 500 mg og 50 mg

Brusetabletter

acetylsalicylsyre (500 mg) og koffein (50 mg)

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Treo® Citrus uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Treo® Citrus.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Treo® Citrus
3. Sådan skal du tage Treo® Citrus
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Treo® Citrus er et middel mod smerter.

Du kan tage Treo® Citrus mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter og tandpine. Du kan også tage Treo® Citrus mod migræne.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TREO® CITRUS

Tag ikke Treo® Citrus hvis du:

- er overfølsom over for acetylsalicylsyre, koffein eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smertestillende medicin mod f.eks. hovedpine og gigtsmerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen og diclofenac).
- har mavesår (blodige opkastninger og/ eller sort afføring).
- har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader.
- har dårlig lever.
- har dårlige nyrer.
- har dårligt hjerte.
- er gravid i 7. - 9. måned.

Børn under 15 år med feber må ikke få Treo® Citrus.

Vær ekstra forsigtig med at tage Treo® Citrus

Tal med lægen inden du tager Treo® Citrus, hvis du:

- har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim eller allergiske lidelser.
- har tendens til smerter og ubehag fra maven eller tarmen f.eks. mavesår.
- har nedsat lever- eller nyrefunktion.
- har en stofskiftesygdom (glucose-6-phosphatdehydrogenase mangel, G6PD-mangel).
- tager anden medicin mod smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen og diclofenac).
- tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol).
- skal vaccineres mod skoldkopper.

Vær opmærksom på følgende



Hvis du er over 65 år skal du undgå langvarig brug af Treo® Citrus på grund af risiko for blødning i mavetarmkanalen. Tal med lægen.

Hvis du tager Treo® Citrus mod hovedpine i længere tid (mere end 10 dage om måneden i mere end 3 måneder), kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Treo® Citrus indeholder koffein, som kan øge risikoen for at migræne forværres. I nogle tilfælde kan koffein udløse migræneanfald og omvendt kan pludselig afbrydelse af behandling med koffein medføre abstinenshovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen.

Du må ikke tage Treo® Citrus i dagene før en operation. Tal med lægen.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Treo® Citrus. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- for meget mavesyre (aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid).
- sukkersyge (f.eks. metformin, glimepirid og glibenclamid).
- for højt blodtryk (f.eks. enalapril, ramipril, perindopril, amlodipin, felodipin og diltiazem).
- dårligt hjerte (quinidin, adenosin)

- depression (fluvoxamin)
- psykoser (clozapin)
- manio-depressiv sindslidelse (lithium)
- smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac).
- urinsur gigt (probenecid).
- visse former for gigt og kræft (methotrexat).
- grøn stær (acetazolamid).
- epilepsi (valproat og acetazolamid).
- gigt og bindevævssygdomme (prednisolon og methylprednisolon).
- Samt
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon og clopidogrel).
- vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton).
- naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder Ginkgo Biloba.
- hvis du skal vaccineres mod skoldkopper.

Brug af Treo® Citrus sammen med mad og drikke

Du kan tage Treo® Citrus i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Treo® Citrus i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.

Du må kun tage Treo® Citrus i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Kvinder der ønsker at blive gravide

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Treo® Citrus eller kun tage Treo® Citrus i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.

Treo® Citrus kan gøre det sværere at blive gravid. Spørg lægen om der er en anden behandling.

Amning

Treo® Citrus går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Treo® Citrus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Treo® Citrus

Denne medicin indeholder 15 mmol natrium (345 mg) pr. tablet. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TREO® CITRUS

Hvis din læge har ordineret Treo® Citrus til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal opløse brusetabletten i ½ glas vand.

Lad opløsningen bruse færdig, før du drikker den.

Virkningen bliver ikke bedre med mere end 2 tabletter ad gangen. Treo® Citrus virker i 4-6 timer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Svage smerter: 1-2 tabletter 1-4 gange daglig.

Migræne: 2 tabletter 1-4 gange daglig. Bør højst anvendes i 10 dage om måneden.

Børn: Du må kun bruge Treo® Citrus til børn under 15 år efter lægens anvisning. Brug aldrig Treo til børn under 15 år, hvis de har feber

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

Hvis du har taget for mange Treo® Citrus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere tabletter end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er svimmelhed, øresusen, døvhed, øget svedtendens, uro, kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning, rastløshed, feber. I alvorlige tilfælde hjertesvigt, akut nyresvigt, alvorligt nedsat blodsukker hos børn. Derudover bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, muskelinfiltrationer, kramper og sløvhed (især hos børn), døsighed, udslæt, hævelser i ansigt, kløe, blåfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Treo® Citrus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Treo® Citrus

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Treo® Citrus kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Stærke smerter i øverste del af maven på grund af sår eller hul på mavesæk eller tolvfingertarm. Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Vejrtrækningsbesvær og astmalignende anfald (kan forekomme oftere hos astmatikere). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodigt opkast og/eller sort afføring pga. blødning i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (der forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt straks læge eller skadestue.

Hyppigheden ikke kendt

- Feber, opkastninger, sløret bevidsthed hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Rysten.
- Kvalme, diaré, opkastning, sure opstød, halsbrand.
- Søvnløshed, uro.

Ikke almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Sløvhed, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus).
- Allergiske reaktioner som nældefeber og snue.
- Svedtendens.

Sjældne bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Forstyrrelser i nyrefunktionen. Kan blive alvorlig. Tal med lægen.
- Blodmangel med træthed og gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer, ved medfødt G6PD mangel. Kan være alvorlig. Tal med lægen.
- Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.

Hyppigheden ikke kendt

- Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Treo® Citrus kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren, nyrerne og forandringer i blodet.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde være andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg lægen eller apoteket hvis du ønsker oplysninger om disse bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Treo® Citrus utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Treo® Citrus ved almindelig temperatur.

Brug ikke Treo® Citrus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Treo® Citrus, hvis beholderen lugter af eddike.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Treo® Citrus 500 mg / 50 mg, brusetabletter indeholder:

- Aktive stoffer: acetylsalicylsyre og koffein.
- Øvrige indholdsstoffer: vandfri citronsyre, natriumhydrogencarbonat, docusatnatrium, natriumbenzoat (E211), citronaroma (indeholder saccharose).

Treo® Citrus udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Treo® Citrus er hvide runde brusetabletter.

Pakningsstørrelser

Treo® Citrus findes i pakningsstørrelser med 10 brusetabletter, 20 brusetabletter og 60 (3x20) brusetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød.

Fremstiller

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg, Sverige.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010