

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MICROPAQUE 1 g/ml Oral suspension og rektalvæske, suspension

Bariumsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Micropaque
3. Sådan får du Micropaque
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Micropaque er et kontraststof til røntgenundersøgelser af spiserør, mave, tynd- og tyktarm, som herved bliver tydelige på røntgenbilledet.

Kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og *ikke* i forbindelse med behandling.

2. DET SKAL DU OM MICROPAQUE

Du må ikke få Micropaque, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for bariumsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har hul på tarmen eller du tror du har mavesår eller andre mave- eller tarmproblemer (f.eks. forsnævring eller forstoppelse).

Fortæl lægen, hvis du har nogle af disse problemer.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Micropaque

Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

- skal have andre røntgenundersøgelser i de følgende dage.
- lider af forstoppelse.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Micropaque sammen med mad og drikke

Afhængig af hvilken del af fordøjelseskanalen du skal have undersøgt, skal du være fastende eller have en særlig diæt og et lavement (tømming af tarmen). Tal med lægen eller sundhedspersonalet.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du vil normalt ikke blive behandlet med Micropaque, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Amning

Lægen vil vurdere, om du må amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Micropaque påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Micropaque

Denne medicin indeholder:

- 1,18 g natrium pr. 500 ml suspension. Fortæl lægen, hvis du er på en saltfattig diæt.
- 170 mg kalium pr. 500 ml suspension. Fortæl lægen, hvis du er på en kaliumfattig diæt og/eller har nedsat nyrefunktion.
- Natriumpropylparahydroxybenzoat (E217) og natriummethylparahydroxybenzoat (E219). Kan give allergiske reaktioner (kan komme efter undersøgelsen).

3. SÅDAN FÅR DU MICROPAQUE

Brug altid Micropaque nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Dosering

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af typen af undersøgelse.

Brugsanvisning

Afhængig af hvilken del af fordøjelseskanalen, du skal have undersøgt, vil du få Micropaque:

- indført i endetarmen som en tarmindhældning (lavement)
- eller som en væske du skal drikke (oral suspension).

Hvis du skal have en tarmindhældning, vil sundhedspersonalet forklare, hvordan det foregår.

Hvis du skal drikke Micropaque, vil du muligvis skulle drikke mere end en 1 liter. Du skal drikke al den Micropaque-væske, du har fået.

Før du skal undersøges:

- Hvis du skal have undersøgt spiserøret, maven, tolvfingertarmen eller tyndtarmspassagen, skal du være fastende (ikke have spist eller drukket).
- Hvis du skal have undersøgt tyktarmen, skal du i 3 dage før undersøgelsen have en fiberfattig diæt. Dagen før undersøgelsen vil du få et lavement for at tømme tarmen.

Hvis du har brugt for meget Micropaque, oral suspension eller rektalvæske

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Micropaque, og du føler dig utilpas. Hvis du tager for meget Micropaque, kan du få forstoppelse.

4. BIVIRKNINGER

Micropaque kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock).
- Hvis du ved et uheld har fået noget af denne medicin ned i lungerne, kan du få tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne.
- Voldsomme smerter i maven med meget dårlig almentilstand enten pga. betændelse i bughinden, blindtarmsbetændelse eller blodprop i maven.
- Besvimelse og meget dårlig almentilstand pga. kredsløbskollaps.
- Akut lungesvigt med åndenød.
- Pludselige blødninger i huden og meget dårlig almentilstand.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Forstoppelse.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Kvalme.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Diarré, mavekramper, oppustethed.
- Nældefeber, udslæt.
- Besvimelse ved dobbeltkontrastundersøgelse af tyktarmen.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke fryses.

Brug ikke Micropaque efter den udløbsdato, der står på beholderen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Micropaque 1 g/ml, oral suspension og rektalvæske indeholder:

Aktivt stof: Bariumsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Kaliumsorbat (E 202), saccharinnatrium (E 954), xanthangummi (E 415), natriumcarboxymethylcellulose (E 466), natriummethylparahydroxybenzoat (E 219), natriumpropylparahydroxybenzoat (E 217), vanille-karamelsmagsstof*, svovlsyre, rensset vand.

*Består af vanillin, ethylvanillin, propylenglycol, vand, karamel, ethanol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Micropaque er en hvid, tyk, blød suspension med vanilleduft.

Pakningsstørrelse

Micropaque fås i flasker à 2 liter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Guerbet
BP 57400
95943 Roissy CdG cedex
Frankrig

Repræsentant for Danmark

Vicare Medical A/S
Kongevejen 150B
3460 Birkerød
Tlf.: +45 45 82 33 66

Fremstiller

Guerbet
BP 57400
95943 Roissy CdG cedex
Frankrig

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2008