

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Lansoprazol ratiopharm 15 mg enterokapler, hårde
Lansoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

- De kan få Lansoprazol ratiopharm uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Lansoprazol ratiopharm.
- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre 4 uger.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Lansoprazol ratiopharm virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lansoprazol ratiopharm
3. Sådan skal De tage Lansoprazol ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Lansoprazol ratiopharm
6. Yderligere oplysninger

1. Lansoprazol ratiopharm virkning og hvad De skal bruge det til

Lansoprazol, det virksomme stof i Lansoprazol ratiopharm er en såkaldt protonpumpehæmmer. Det virker ved at hæmme udskillelsen af mavesyre og reducerer dermed syreindholdet i maven.

Brugsområdet for Lansoprazol ratiopharm

Symptom behandling af refluxsøfagit (slimhinde besvær i spiserøret, oplevet som halsbrand og sure opstød).

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lansoprazol ratiopharm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Lansoprazol ratiopharm

hvis de er overfølsom (allergisk) overfor Lansoprazol eller nogle af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lansoprazol ratiopharm

Deres læge bør vide, hvis De har nedsat leverfunktion. Hvis De får synsforstyrrelser skal de kontakte øjenlæge.

Lansoprazol øger mavens pH værdi. Dette medfører en let forhøjet risiko for bakterieinfektioner i maven.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Det er især vigtigt for lægen at få kendskab til, om De er i behandling med:

- fluvaxamin (antidepressivt middel), som øger mængden af lansoprazol i blodet.

- ketoconazol & itraconazol (svampemidler) og theophyllin (astma medicin) idet deres optagelse mindsker ved brug af lansoprazol, samtidigt som de øger mængden af lansoprazol i blodet
- makrolider som clarithromycin, protease hæmmere (anti-HIV medicin), idet deres mængde i blodet øges samtidigt som de øger mængden af lansoprazol i blodet
- lægemidler hvis mængde i blodet øges af lansoprazol. F.eks. digoxin (hjertemedicin), tacrolimus (medicin som mindsker immunforsvaret), carbamazepin og fenytoin (antiepileptika)
- lægemidler hvis optagelse i blodet forsinkes af lansoprazol f.eks. amoxilin (antibiotika)
- warfarin (mindsker blodets koaguleringssevne)

Brug af Lansoprazol ratiopharm sammen med mad og drikkevarer:

Samtidig indtagelse af mad fører til at optagelsen af Lansoprazol ratiopharm bliver langsommere. Tag kapslen før morgenmaden og ved behov før aftensmaden.

Graviditet & Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Erfaringerne med lansoprazol er begrænsede. Lansoprazol ratiopharm bør derfor ikke bruges under graviditeten. Spørg lægen.

Amning

Erfaringerne med lansoprazol ved amning er begrænsede. Lansoprazol ratiopharm anbefales derfor ikke uden opvejning af fordele og risici. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lansoprazol ratiopharm kan på enkelte give svimmelhed og virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lansoprazol ratiopharm

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt Lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Lansoprazol ratiopharm

Dosering

Tag altid Lansoprazol ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket..

Kapslerne skal sluges hele med væske. Kapslerne kan også åbnes, men indholdet må ikke tygges eller knuses. De må ikke tage lægemidlet sammen med mad. Tag kapslen før morgenmaden og ved behov før aftensmaden.

refluksøsofagit (halsbrand og sure opstød)

15 mg en gang daglig, eller ved behov 30 mg fordelt på to daglige doser i op til 4 uger. Hvis symptomerne ikke lindres i løbet af 4 uger med en daglig dosis på 30 mg, anbefales yderligere undersøgelser.

Ved nedsat lever- eller nyrefunktion

Ved nedsat nyrefunktion, samt ved mildt nedsat leverfunktion bør daglig dosis ikke overstige 30 mg. Ved moderat nedsat leverfunktion bør daglig dosis ikke overstige 15 mg. På grund af manglende erfaring anbefales Lansoprazol ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Børn

Lansoprazol anbefales ikke til børn på grund af manglende erfaring.

Ældre

Dosis bør tilpasses individuelt i doser af 15-30 mg daglig. Dosis bør ikke overstige 30 mg daglig.

Hvis De mener at virkningen af Lansoprazol ratiopharm er for kraftig eller for svag, bør De rådføre dem med lægen eller apoteket om dette.

Har De taget for meget Lansoprazol ratiopharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Lansoprazol ratiopharm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis De glemmer at tage Lansoprazol ratiopharm

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Tag følgende dosis som normalt.

4. Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Lansoprazol ratiopharm give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 og mindre end 1 ud af 1000 patienter)
skjoldbruskkirtelbetændelse. Hallucinationer. Leverbetændelse, gulsot. Nyrebetændelse. Visse alvorlige forandringer i blodbilledet. Angioødem (hævelser i ansigtet, læbe, svælg, arme og ben).

Meget sjældne (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000)

Alvorligere hudsygdomme som Stevens-Johnson syndrom (blæreformede udslæt på hud og/eller slimhinder med feber) og toksisk epidermal nekrolyse (områder af hudens yderste lag afstødes). Agranulocytose (få granulocytter i blodet). Anafylaktisk shock (kraftig allergisk reaktion).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 100 og mindre end 1 ud af 10 patienter)
Kvalme, diaré, mavesmerter, forstoppelse, opkastninger, luft i maven, fordøjelsesproblem, eksem, nældefeber og kløe. Hovedpine og svimmelhed. Udmattelse.

Ikke almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 1000 og mindre end 1 ud af 100 patienter)
Tør mund eller hals, appetitløshed. Øgning i leverenzymværdier. Smagsforstyrrelser.

Sjældne (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 og mindre end 1 ud af 1000 patienter)
svampeinfektion i spiserøret, betændelse i tungen, udslæt med små hudblødninger, hårtab, kraftig svedproduktion, erythema multiforme (blå/rødt udslæt), rastløshed, sygelig søvnighed, søvnløshed, døsigthed, depression, forvirring, svimmelhed med fornemmelse af, at omgivelserne drejer rundt, rysten, myrekryb. Forandringer i blodbilledet. Hjertebanken og

brystsmerter. Perifert ødem (hævelse). Muskel - og ledsmerter. Synsforstyrrelser, feber, sammentrækninger i bronkierne.

Meget sjældne (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000)

Tyktarmsbetændelse, mundbetændelse, sort tunge. Forstørrede brystkirtler hos mænd, mælkesekretion. Impotens, generel sygdomsfølelse. Øgede niveauer af kolesterol og fedt i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. Sådan opbevarer De Lansoprazol ratiopharm

Opbevares utilgængelig for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Blister: Opbevares i originalpakning beskyttet mod fugt.

Beholder: Opbevares i beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Lansoprazol ratiopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. Yderligere oplysninger

Lansoprazol ratiopharm indeholder

Det aktive indholdsstof er lansoprazol 15 mg.

Øvrige indholdsstoffer er: granulat: Hypromellose, lactosemonohydrat, crospovidon, glycerolbehenat, talcum, titandioxid E 171, silica, kolloid vandfri, methacrylsyre – ethylacrylat copolymer, triethylcitrat. Kapsel: gelatine, titandioxid E 171, natriumlaurilsulfat. Blæk: shellac, propylenglycol, sort jernoxid E 172.

Lansoprazol ratiopharms udseende og pakningsstørrelse

Hvid hård gelatinekapsel, der indeholder hvide eller næsten hvide bikonvekse minitabletter.

Kapslen er påtrykt 15 på underdelen og LP på overdelen.

Pakningsstørrelserne er 7, 10, 14, 28, 30, 49 og 56 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Lansoprazol ratiopharm, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tel.: 45 46 06 60

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2007