

Loratadin ratiopharm, 10 mg tabletter

Læs hele denne information godt igennem før De begynder at anvende medicinen

- Denne medicin kan fås uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Hvis De ikke har fået det bedre inden få dage, eller hvis De har fået det værre, skal De kontakte lægen.

Denne indlægsseddel fortæller:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som bør læses før De anvender Loratadin ratiopharm.
3. Sådan skal De tage Loratadin ratiopharm.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter indeholder:

- Det aktive stof er 10 mg loratadin.
- De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, majsstivelse og magnesiumstearat.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Repræsentant i Danmark:

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm
Tel.: 45 46 06 60

1. Virkning og anvendelse

Lægemiddelgruppe

Loratadin ratiopharm er et antihistamin til behandling af allergiske sygdomme. Loratadin ratiopharm virker ved at hæmme virkningen af histamin, som medvirker ved udvikling af den allergiske reaktion.

Hvad anvendes Loratadin ratiopharm til

Loratadin ratiopharm anvendes til behandling af allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og allergisk rinit (næsekatar).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De anvender Loratadin ratiopharm

Anvend ikke Loratadin ratiopharm, hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for Loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Loratadin ratiopharm.

Særlige forholdsregler:

Deres læge bør vide, hvis De

- har nedsat leverfunktion. Dosis skal nedsættes.
- skal gennemgå en hudprøvetest. Behandlingen med Loratadin ratiopharm bør afbrydes 48 timer inden, for at resultaterne ikke påvirkes.

Brug af Loratadin ratiopharm sammen med mad og drikkevarer

Tabletterne indtages bedst med væske (f.eks. ½ glas vand). De kan tage Loratadin ratiopharm sammen med mad og drikke. Samtidig indtagelse af mad kan forsinke optagelsen af loratadin, men har ingen betydning for effekten af lægemidlet.

Vigtige oplysninger om indholdsstofferne i Loratadin ratiopharm:

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet & Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke anvende Loratadin ratiopharm under graviditet, eftersom sikkerheden ikke er tilstrækkelig belyst.

Amning

Hvis De ammer, må De ikke bruge Loratadin ratiopharm, det bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loratadin ratiopharm kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin:

Behandlingens virkning og sikkerhed kan blive påvirket, hvis dette lægemiddel indtages samtidig med visse andre lægemidler. Ligeledes kan andre lægemidler blive påvirket, hvis de tages samtidig med Loratadin ratiopharm. De bør derfor oplyse det til Deres læge eller apotek, hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, også hvis der er tale om håndkøbsmedicin og naturmedicin. Ligeledes bør De oplyse det til Deres læge, hvis De får ordineret anden medicin under behandling med Loratadin ratiopharm.

3. Sådan skal De tage Loratadin ratiopharm

Dosering

Normal dosis for voksne og børn over 12 år, samt børn i alderen 2-12 år med en kropsvægt over 30 kg: 1 tablet en gang daglig.

Til børn på 2-12 år med en kropsvægt på 30 kg eller mindre: ½ tablet en gang daglig.

Sikkerheden og effekten hos børn under 2 år er ikke bestemt. Loratadin ratiopharm bør derfor ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Har De taget for meget Loratadin ratiopharm:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Loratadin ratiopharm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis De glemmer at tage Loratadin ratiopharm:

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

4. Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Loratadin ratiopharm give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), unormal leverfunktion, hurtig hjerterytme, hjertebanken, mave- og tarmbetændelse og udslæt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 100 og mindre end 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine, nervøsitet, træthed, søvnløshed.

Ikke almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 1000 og mindre end 1 ud af 100 patienter)

Øget appetit.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Hårtab, svimmelhed, kvalme, mundtørhed.

Fortæl lægen eller apoteket, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret maj/2004