

**INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**  
**Paroxetin ratiopharm 20 mg filmoovertrukne tabletter**  
**Paroxetin**

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Paroxetin ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Paroxetin ratiopharms virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Paroxetin ratiopharm
3. Sådan skal De tage Paroxetin ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Paroxetin ratiopharm
6. Yderligere oplysninger

**1. Paroxetin ratiopharms virkning og hvad De skal bruge det til**

**Paroxetin ratiopharm anvendes til behandling af voksne med depression og/eller angsttilstande.** De angsttilstande, som behandles med Paroxetin ratiopharm, er: obsessiv-kompulsiv tilstand (gentagne tvangstanker eller tvangshandlinger), panikangst (panikanfald, også når de skyldes agorafobi (angst for åbne pladser), socialfobi (angst for og undgåelse af socialt samvær) eller posttraumatisk belastningsreaktion (angst, der skyldes en traumatisk hændelse) og generaliseret angst (generel ængstelse eller nervøsitet). Paroxetin ratiopharm hører til gruppen af såkaldte SSRI-præparater eller selektive serotoningenoptagshæmmere. I hjernen findes et stof, der hedder serotonin. Personer, der lider af depression eller angst, har mindre serotonin end andre. Virkningen af Paroxetin ratiopharm og andre SSRI-præparater er ikke helt afklaret, men de medvirker til at øge mængden af serotonin i hjernen. Det er vigtigt, at De får den rette behandling af depression eller angst, så De kan få det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**2. Det skal De vide, før De begynder at tage Paroxetin ratiopharm**

**Tag ikke Paroxetin ratiopharm, hvis De**

- **får medicin af typen monoaminooxidase-hæmmere** (MAO-hæmmere inklusive moclobemid) eller har taget denne medicin på et tidspunkt inden for de sidste to uger. Lægen vil vejlede Dem i, hvordan De bør starte på Paroxetin ratiopharm, efter at De er stoppet med at tage MAO-hæmmeren.
- **får et antipsykotisk middel**, der hedder thioridazin eller pimoqid.
- **er allergisk (overfølsom)** over for paroxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paroxetin ratiopharm (se pkt. 6 "Yderligere oplysninger").

**Vær ekstra forsigtig med at bruge Paroxetin ratiopharm, hvis De**

- får anden medicin (se nedenfor under *Brug af anden medicin*)
- har en nyre-, lever- eller hjertesygdom
- har epilepsi eller tidligere har haft anfald eller kramper
- tidligere har haft maniske tilstande (overaktiv adfærd eller tankevirksomhed)
- får elektrochok (elektrokonvulsiv behandling)

- tidligere har lidt af blødningsforstyrrelser eller får anden medicin, som kan øge risikoen for blødninger (dette omfatter blodfortyndende midler som warfarin, antipsykotika som perphenazin eller clozapin, tricykliske antidepressiva, såkaldte NSAID-præparater (nonsteroid antiinflammatoriske midler mod smerter og betændelsestilstande) såsom acetylsalicylsyre, ibuprofen, celecoxib, etodolac, diclofenac, meloxicam, rofecoxib)
- har diabetes
- er på saltfattig diæt
- har glaukom (grøn stær = forhøjet tryk i øjet)
- er gravid eller prøver at blive gravid (se nedenfor under *Graviditet og amning*)
- er under 18 år (se nedenfor under *Børn og unge under 18 år*)

### **Børn og unge under 18 år**

**Paroxetin ratiopharm bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år.** Patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (hovedsagelig aggressivitet, trodsighed og angst), når de tager Paroxetin ratiopharm. Kontakt lægen, hvis De eller Deres barn har fået ordineret Paroxetin ratiopharm, og De ønsker at diskutere dette. De bør informere Deres læge, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos Dem selv eller Deres barn under behandling med Paroxetin ratiopharm. Langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling, er endnu ikke påvist ved brug af Paroxetin ratiopharm hos denne aldersgruppe.

I undersøgelser af Paroxetin ratiopharm hos patienter under 18 år var de almindelige bivirkninger, der forekom hos mellem 1 og 10 ud af 100 børn/unge, stigning i selvmordstanker og selvmordsforsøg, selvpåførte skader, en fjendtlig, aggressiv eller uvenlig holdning, manglende appetit, rysten, unormal svedtendens, hyperaktivitet (for megen energi), ophidselse, følelsesudsving (inklusive gråd og humørsvingninger). Undersøgelserne viste også, at børn og unge, der fik sukkerpiller (placebo) i stedet for Paroxetin ratiopharm oplevede de samme symptomer, om end de forekom knap så hyppigt.

Nogle patienter i undersøgelserne med personer under 18 år fik abstinenssymptomer, når de holdt op med at tage Paroxetin ratiopharm. De svarede for det meste til virkningerne hos voksne, når de holdt op med at tage Paroxetin ratiopharm (se afsnit 3 nedenfor: *Sådan skal De tage Paroxetin ratiopharm*). Endvidere var det almindeligt (forekom hos færre end 1 ud af 10), at patienter under 18 år fik mavepine, følte sig nervøse med følelsesudsving (inklusive gråd, humørsvingninger, forsøg på at skade sig selv, selvmordstanker og selvmordsforsøg).

### **Tanker om selvmord og forværring af Deres depression eller angstlidelse**

Hvis De er deprimeret og/eller lider af angst, kan De somme tider tænke på at skade Dem selv eller Tage Deres eget liv. Sådanne tanker kan tage til, når De begynder at tage medicin mod depression, da det tager tid, før medicinen virker, normalt omkring to uger men nogle gange længere.

De kan være mere tilbøjelige til at nære disse tanker:

- De tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller skade Dem selv
- De er en ung voksen. Information fra kliniske studier har vist en øget risiko for selvmordsrelateret opførsel hos voksne under 25 år som led af psykiske sygdomme og som blev behandlet med antidepressive midler.

**Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet,** når som helst De får sådanne tanker.

**Det kan være en hjælp at fortælle en pårørende Eller en nær ven,** at De er deprimeret eller lider af angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kunne bede dem om at fortælle Dem, hvis de mener, at Deres depression eller angst tager til, eller hvis de er bekymret over forandringer i Deres adfærd.

### **Vigtige bivirkninger, som forekommer med Paroxetin ratiopharm**

Nogle patienter, som tager Paroxetin ratiopharm, får akatisi, hvilket er en bivirkning, der får dem til at **føle sig rastløs og ude af stand til at sidde eller stå stille**. Andre patienter får noget, der kaldes et **serotonergt syndrom**, hvor de oplever alle eller nogle af følgende symptomer: forvirring, rastløshed, svedtendens, rysten, kuldegysninger, hallucinationer (mærkelige syn eller lyde), pludselige muskelryk eller hurtigt

hjertebanken. **Kontakt lægen**, hvis De bemærker nogle af disse symptomer. Flere oplysninger om disse eller andre bivirkninger ved Paroxetin ratiopharm er omtalt i afsnit 4 nedenfor: *Bivirkninger*.

### Brug af anden medicin

Fortæl altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Paroxetin ratiopharm eller øge sandsynligheden for, at De får bivirkninger. Desuden kan Paroxetin ratiopharm påvirke andre virkningen af lægemidler. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- De såkaldte **monoaminooxidasehæmmere** (MAO-hæmmere, inklusive moclobemid) – se ovenfor under *De bør ikke tage Paroxetin ratiopharm*
- Thioridazin eller pimozid, som er **antipsykotika** – se ovenfor under *De bør ikke tage Paroxetin ratiopharm*
- Acetylsalicylsyre, ibuprofen eller andre lægemidler kaldet NSAID-præparater (nonsteroid antiinflammatoriske midler) som celecoxib, etodolac, diclofenac, meloxicam og rofecoxib mod **smerte og betændelse**
- Tramadol (**smertestillende middel**)
- Triptaner, som er midler mod **migræne** såsom sumatriptan
- Andre **antidepressiva**, herunder andre SSRI-præparater og tricykliske antidepressiva som clomipramin, nortriptylin og desipramin
- Tryptophan, som er et **kosttilskud**
- Medicin såsom lithium, risperidon, perphenazin, clozapin (antipsykotika), som anvendes til at behandle visse **psykiske lidelser**
- En kombination af fosamprenavir og ritonavir, som anvendes til at behandle **HIV-infektioner** (HIV = humant immundefekt virus)
- Prikbladet perikon, som er et naturlægemiddel mod **depression**
- Phenobarbital, phenytoin, natriumvalproat og carbamazepin til behandling af **anfald** eller **epilepsi**
- Atomoxetin, som anvendes til at behandle **ADHD** (står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
- Procyclidin til at afhjælpe ufrivillig rysten, specielt ved **Parkinsons sygdom**
- Warfarin eller anden medicin (såkaldte antikoagulantia) til at **fortynde blodet**
- Propafenon, flecainid og medicin til behandling af **uregelmæssig hjerterytme**
- Metoprolol, en betablokker til at behandle **forhøjet blodtryk og hjertesygdom**
- Rifampicin til behandling af **tuberkulose (TB)** og **spedalskhed**
- Linezolid, et **antibiotikum**

**Spørg Deres læge til råds, hvis De tager eller for nylig har taget noget af den omtalte medicin**, og De ikke allerede har omtalt dette for lægen. Dosis skal måske ændres, eller De skal have anden medicin.

**Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.** Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

### Brug af Paroxetin ratiopharm sammen med mad og drikke

Undgå at indtage alkohol, mens De tager Paroxetin ratiopharm. Alkohol kan forværre Deres symptomer eller bivirkningerne.

### Graviditet og amning

Kontakt omgående lægen, **hvis De allerede tager Paroxetin ratiopharm og netop har fundet ud af, at De er gravid**. Kontakt også lægen, **hvis De planlægger at blive gravid**. Nogle undersøgelser tyder på, at der er en øget risiko for hjertefejl hos spædbørn, hvis mødre fik Paroxetin ratiopharm under graviditetens første måneder. Ifølge disse undersøgelser optrådte hjertefejl hos færre end 2 ud af 100 spædbørn (under 2%), hvis mødre fik paroxetin tidligt i graviditeten, mens hjertefejl normalt forekom hos 1 ud af 100 spædbørn (1%) i hele befolkningen. Hvis alle former for medfødte misdannelser tages i betragtning, er der ingen forskel mellem antallet af spædbørn, der fødes med misdannelser, efter at deres mødre havde taget Paroxetin ratiopharm under graviditeten, sammenholdt med det samlede antal misdannelser hos almenbefolkningen. De og Deres læge kan vedtage, at det vil være bedre for Dem at skifte til anden behandling eller gradvist

holde op med at tage Paroxetin ratiopharm, mens De er gravid. Det er dog også muligt, at lægen ud fra Deres situation vil mene, at det er bedre for Dem at fortsætte med Paroxetin ratiopharm.

**Hvis De tager Paroxetin ratiopharm i graviditetens sidste 3 måneder**, skal De fortælle dette til jordemoderen, da barnet kan have symptomer ved fødslen. Disse symptomer opstår sædvanligvis i løbet af det første døgn efter barnets fødsel. Barnet kan f.eks. lide af søvnbesvær, spiseproblemer, åndedrætsbesvær, blålig hud, have det for varmt eller for koldt, lide af kvalme, hyppig gråd, stive eller slappe muskler, apati, skælven, rysten eller anfald. **Kontakt lægen, jordemoderen eller sundhedsplejersken for at få vejledning**, hvis De er bekymret over, at Deres barn havde nogle af disse symptomer ved fødslen.

**Paroxetin ratiopharm kan udskilles i modermælk i meget små mængder.** Hvis De får Paroxetin ratiopharm, skal De tale med lægen igen, før De begynder at amme.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

De mulige bivirkninger ved Paroxetin ratiopharm omfatter svimmelhed, forvirring, søvnighed eller uskarpt syn. De må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis De får disse bivirkninger.

## 3. Sådan skal De tage Paroxetin ratiopharm

**Paroxetin ratiopharm bør altid tages i nøje overensstemmelse med lægens anvisninger.** De bør konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Somme tider kan De have behov for at tage mere end 1 tablet eller ½ tablet. Se på skemaet for at finde frem til, hvor mange tabletter De bør tage.

| Dosis | Så mange tabletter skal De tage                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 10 mg | ½ tablet                                                 |
| 20 mg | <1 tablet<br>eller 2 hvide til svagt lyserøde tabletter> |
| 30 mg | 1½ tablet                                                |
| 40 mg | 2 tabletter                                              |
| 50 mg | 2½ tabletter                                             |
| 60 mg | 3 tabletter                                              |

De normale doser ved forskellige tilstande fremgår af følgende skema:

|                                    | Startdosis | Anbefalet døgndosis | Maksimal døgndosis |
|------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Depression                         | 20 mg      | 20 mg               | 50 mg              |
| Obsessiv-kompulsiv tilstand        | 20 mg      | 40 mg               | 60 mg              |
| Panikangst                         | 10 mg      | 40 mg               | 60 mg              |
| Socialfobi                         | 20 mg      | 20 mg               | 50 mg              |
| Posttraumatisk belastningsreaktion | 20 mg      | 20 mg               | 50 mg              |
| Generaliseret angst                | 20 mg      | 20 mg               | 50 mg              |

**Deres læge vil anvise den rette dosis for Dem, når De begynder at tage Paroxetin ratiopharm.** De fleste begynder at få det bedre i løbet af et par uger. Spørg lægen til råds, hvis De ikke får det bedre inden for denne periode. Lægen vil måske vælge at optrappe dosis gradvist - med 10 mg ad gangen – til en maksimal døgndosis.

**Tag tabletter om morgenen sammen med mad.** Dette vil reducere risikoen for at få kvalme.

**Synk dem med et glas vand.**

## **Tabletterne må ikke tygges.**

Deres læge vil tale med Dem om, hvor længe De skal blive ved med at tage tabletterne. Det kan dreje sig om adskillige måneder eller endnu længere.

## **Ældre**

Den maksimale dosis til ældre over 65 år er 40 mg daglig.

## **Patienter med lever- eller nyresygdom**

Hvis Deres lever- eller nyresygdom volder problemer, kan lægen beslutte at give Dem en lavere dosis Paroxetin ratiopharm end normalt.

## **Har De taget for meget Paroxetin ratiopharm**

**De må aldrig tage flere tabletter, end lægen anbefaler.** Kontakt omgående lægen eller skadestuen, hvis De eller en anden har taget flere Paroxetin ratiopharm tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Vis dem tabletpakningen.

En person, der har taget en overdosis af Paroxetin ratiopharm kan have et eller flere af de symptomer, der omtales nedenfor i afsnit 4 *Bivirkninger*, eller følgende symptomer: kvalme, forstørrede pupiller, feber, hovedpine, ukontrollable muskelspændinger.

## **Hvis De glemmer at tage Paroxetin ratiopharm**

Tag medicinen på samme tid hver dag.

**Hvis De glemmer at tage en dosis, og De kommer i tanke om det før sengetid,** skal De tage den med det samme. Fortsæt som sædvanlig næste dag.

**Hvis De først kommer i tanke om det om natten eller næste dag,** skal De springe den glemte dosis over. Måske vil De få abstinenssymptomer, men de går sikkert over, når De har taget den næste dosis til sædvanlig tid.

## **Sådan skal De gøre, hvis De ikke får det bedre**

**Paroxetin ratiopharm afhjælper ikke symptomer med det samme** – alle midler mod depression virker først efter nogen tid. Nogle mennesker begynder at få det bedre i løbet af et par uger, mens der kan gå længere tid for andre. Nogle mennesker, der får midler mod depression, får det værre, før det begynder at hjælpe. Konsulter lægen igen, hvis De ikke får det bedre i løbet af et par uger. Deres læge bør give Dem en ny tid et par uger efter, at De startede med behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis De ikke har fået det bedre.

## **Sådan holder De op med at tage Paroxetin ratiopharm**

**De må ikke holde op med at tage Paroxetin ratiopharm, før Deres læge anbefaler det.**

**Når De holder op med at tage Paroxetin ratiopharm,** vil Deres læge hjælpe Dem med en langsom nedtrapning af dosis i løbet af nogle uger eller måneder – derved mindskes risikoen for abstinenssymptomer. Det kan for eksempel gøres ved at nedtrappe dosis af Paroxetin ratiopharm med 10 mg om ugen. De fleste oplever, at symptomerne ved afbrydelse af behandlingen er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle kan symptomerne være alvorligere eller vare længere.

**Hvis De får abstinenssymptomer,** når De holder op med tabletterne, kan lægen foreslå en langsommere nedtrapning. Kontakt Deres læge, hvis De får svære abstinenssymptomer, når De holder op med at tage Paroxetin ratiopharm. Lægen kan foreslå, at De begynder på tabletterne igen og dernæst bruger længere tid på at nedtrappe dem.

**Selv om De får abstinenssymptomer, vil De alligevel kunne holde op med behandlingen.**

## **Abstinenssymptomer ved behandlingsstop**

Ifølge undersøgelser bemærker 3 ud af 10 patienter et eller flere symptomer, når de holder op med at tage Paroxetin ratiopharm. Nogle abstinenssymptomer ved behandlingsstop forekommer hyppigere:

**Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):**

- Bliver svimmel eller usikker på benene eller mister balancen
- Fornemmelser som prikken/stikken, svien og (mindre almindeligt) fornemmelser som ved elektrisk stød også i hovedet, susen, hvæsen, fløjten, ringen eller anden vedvarende lyd i ørerne (tinnitus)
- Søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed)
- Angst
- Hovedpine

**Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):**

- Kvalme
- Svedudbrud (også om natten)
- Rastløshed eller ophidselse
- Skælven/rysten
- Forvirring eller desorientering
- Diaré (tynd afføring)
- Letpåvirkelig eller irriterbar
- Synsforstyrrelser
- Uregelmæssig eller voldsom hjertebanken (palpitationer)

**Kontakt Deres læge, hvis De er bekymret over abstinenssymptomerne efter at være holdt op med Paroxetin ratiopharm.**

Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål om brug af lægemidlet.

#### **4. Bivirkninger**

Som alle andre lægemidler kan Paroxetin ratiopharm have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne forekommer sædvanligvis i løbet af de første uger af behandlingen.

**Kontakt lægen, hvis De får nogle af følgende bivirkninger under behandlingen:**

De kan blive nødt til omgående at kontakte lægen eller tage på hospitalet.

**Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):**

- **Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet, hvis De får usædvanlige blå mærker eller blødninger**, hvilket omfatter blod i opkast eller afføring.
- **Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet, hvis De opdager, at De ikke er i stand til at lade vandet.**

**Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):**

- **Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet, hvis De får kramper** (anfald).
- **Hvis De føler Dem rastløs og er ude af stand til at sidde eller stå stille**, kan De have fået såkaldt akatisi. Denne tilstand kan forværres, hvis doseringen af Paroxetin ratiopharm øges. **Kontakt lægen**, hvis De har det sådan.
- **Hvis De føler Dem træt, svækket eller forvirret, og Deres muskler føles smertende, stive eller ukoordinerede**, kan De mangle natrium i blodet. **Kontakt lægen**, hvis De mærker nogle af disse symptomer.

**Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):**

- **Allergiske reaktioner på Paroxetin ratiopharm.**  
**Kontakt omgående lægen eller tag direkte på hospitalet**, hvis De får et rødt og ujævnt udslæt eller hævelser i øjenlåg, ansigt, læber, mund eller tunge, begynder at klø eller får svært ved at trække vejret eller synke.
- **Hvis De får alle eller nogle af de følgende symptomer**, kan De have fået et **serotonergt syndrom**. Symptomerne på dette omfatter forvirring, rastløshed, svedtendens, rysten, kuldegysninger,

- hallucinationer (mærkelige syn eller lyde), pludselige muskelryk eller hurtig hjertebanken. **Kontakt lægen**, hvis De har det sådan.
- **Akut glaukom** (grøn stær).  
**Kontakt lægen**, hvis Deres øjne begynder at gøre ondt, og synet bliver uskarpt.
- Leversvigt

### **Andre mulige bivirkninger af behandlingen**

#### **Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):**

- Kvalme. Ved at tage medicinen om morgenen kan De nedsætte risikoen for at få kvalme.
- Forandringer i seksualdrift eller seksualfunktion For eksempel udebleven orgasme samt hos mænd, unormal erektion og ejakulation.

#### **Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):**

- Manglende appetit
- Søvnløshed (insomni) eller søvnighed
- Svimmelhed eller rysten/skælven
- Ophidselse
- Usædvanlig svækkelse
- Uskarpt syn
- Gaben, mundtørhed,
- Diaré eller forstoppelse
- Vægtstigning
- Svedtendens

#### **Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000):**

- Kortvarig stigning eller fald i blodtrykket, hjertet banker hurtigere end normalt
- Nedsatte bevægelser, stivhed, rysten eller unormale bevægelse af mund og tunge
- Hududslæt
- Forvirring
- Hallucinationer (mærkelige syn eller lyde)
- Ukontrollabel, ufrivillig vandladning (urin-inkontinens)

#### **Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):**

- Unormal produktion af mælk i brysterne hos mænd og kvinder
- Langsom hjertebanken
- Leverpåvirkning, der viser sig i leverfunktionsprøver.
- Panikangst
- Overaktiv adfærd eller tanker (mani)
- Uvirkelighedsfølelse over for egen person (depersonalisation)
- Angst
- Led- eller muskelsmerter

#### **Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):**

- Leverproblemer, der gulfarver huden eller det hvide i øjnene.
- Væskeophobning (ødemer), der kan give hævelser i arme og ben
- Overfølsomhed over for sollys
- Smertefuld og vedvarende erektion af penis
- Nedsat antal blodplader (øger risikoen for blødning eller blåmærker).

I forbindelse med brug af Paroxetin ratiopharm har nogle patienter oplevet susen, hvæsen, fløjten, ringen eller anden vedvarende lyd i ørerne (tinnitus).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

## **5. Sådan opbevarer De Paroxetin ratiopharm**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Plastbeholder:

Opbevar ikke Paroxetin ratiopharm over 25 °C.

Opbevares i original emballage.

Blisterpakke:

Opbevares i original emballage.

## **6. Yderligere oplysninger**

### ***Paroxetin ratiopharm 20 mg filmovertrukne tabletter indeholder***

- Det aktive stof er 20 mg paroxetinhydrochlorid anhydrat
- De øvrige indholdsstoffer er: Calciumhydrogenfosfat, vandfri. Silica, kolloid vandfri. Magnesiumstearat. Natriumstivelsesglycolat. Talcum. Titandioxid (E171). Dimethylaminoethylmetacrylat copolymer.

### **Paroxetin ratiopharms udseende og pakningstørrelse**

Hvid konveks filmovertrukken tabletpreget med "P2" og en delekærv på den ene side og G på den anden.

Pakker á 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 58, 60, 98, 100, 200, 250 eller 500 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Markedsføres i Danmark af**

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3

D-89079 Ulm, Tyskland

### **Fremstiller**

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3

D-89143 Blaubeuren, Tyskland

### **Hvis De vil have yderligere oplysninger om Paroxetin ratiopharm, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant i Danmark**

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st.tv.

2970 Hørsholm, tlf.: 45 46 06 60

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2008