

Daonil® 1,75mg tabletter

Daonil® 3,5mg tabletter

Glibenclamid

sanofi aventis

Læs denne information godt igennem, før du begynder at anvende medicinen.
Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
Lægen har ordineret Daonil til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som du skal læse før du anvender Daonil.
3. Sådan skal du anvende Daonil.
4. Bivirkninger
5. Yderligere Information

1. Virkning og anvendelse

Daonil får bugspytkirtlen til at danne mere insulin, som sænker blodets indhold af glukose. Daonil får også kroppens celler til at udnytte insulinet bedre.

Du kan bruge Daonil til behandling af type 2 diabetes (ikke-insulinkrævende diabetes), når kostændring, vægttab og motion ikke har været nok til at få blodets glukoseindhold sat tilstrækkeligt ned.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du anvender Daonil

Anvend ikke Daonil hvis:

- Du er overfølsom over for glibenclamid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Daonil.
- Du er overfølsom over for anden medicin af samme type som glibenclamid (sulfonylurinstoffer).
- Du har diabetes, der kræver insulinbehandling (type 1-diabetes).
- Du har en svær diabetes, eller
- ustabil diabetes med meget svingende blodglukose.
- Du har syre i blodet eller urinen.
- Du skal have en større operation.
- Du har en alvorlig infektion, eller er kommet alvorligt til skade.
- Du har en alvorlig sygdom i nyrer eller lever.
- Du er gravid eller ammer.
- Du er i behandling med medicin mod forhøjet blodtryk i lungerne (Bosentan). Spørg din læge.

Særlige forholdsregler

- Tal med din læge inden du anvender Daonil, hvis
- Du er overfølsom over for medicin mod blærebetændelse (sulfonamider).
 - Du har dårlige nyrer eller dårlig lever.
 - Dit blodglukose er svingende.
 - Du lider af mangel på enzymet glykose-6-fosfatdehydrogenase
 - Du har infektioner (halsbetændelse, lungebetændelse, blærebetændelse) med feber, eller
 - Du er kommet alvorligt til skade.

Du skal måske i en periode have insulin i stedet for Daonil.
Du skal omgående tale med din læge, hvis du får hypoglykæmi (insulinchok med rysten, sved og forvirring), mens du tager Daonil.

Dit blodglukose kan blive for lavt, hvis du:

- Er underernæret eller faster i længere tid.
- Spiser uregelmæssigt.
- Drikker store mængder alkohol.
- Er ældre eller svækket.
- Arbejder fysisk hårdt og ikke indtager mad og drikke i forhold til dette.
- Ændrer i din diæt.
- Har ubehandlede sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hypofysen eller binyrerne.
- Tager for meget Daonil.

Symptomerne på for lavt blodglukose er: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger, træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser, ophidselse, aggressivitet, koncentrationsbesvær, nedsat reaktionsevne, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, rystelser, lammelser, føleforstyrrelser, kraftsløshed, tab af selvkontrol, delirium, krampes, stakåndethed, lav puls, svimmelhed og besvimelse.

Hvis du har for lavt blodglukose, skal du spise noget med glukose i f.eks. chokolade eller druesukker. Hvis det ikke hjælper, skal du straks søge læge.

Tal med din læge, hvis du tit får symptomer på lavt blodglukose, tager på i vægt eller ændrer dine kost- og motionsvaner væsentligt.

Hvis du drikker alkohol, samtidig med du tager Daonil, kan du i sjældne tilfælde få ubehagelige antabus-lignende reaktioner.

Brug af Daonil sammen med mad og drikke

Du skal tage Daonil før eller i forbindelse med et hovedmåltid.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Daonil

Daonil indeholder lactose: Kontakt lægen, før du tager Daonil, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke bruge Daonil, hvis du er gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Daonil.

Trafik og arbejdssikkerhed

Daonil kan hos enkelte give for lavt blodglukose, som kan påvirke arbejdsikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Det er eventuelt nødvendigt at ændre dosis.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Medicin mod forhøjet blodtryk i lungerne (bosentan). Daonil og bosentan bør ikke anvendes samtidigt.
- Medicin mod forhøjet blodtryk (ikke selektive betablokkere, ACE-hæmmere). Symptomerne på for lavt blodglukose kan blive svagere eller helt forsvinde, hvis du tager betablokkere.
- Binyrebarkhormon (glukokortikoider). Nedsætter Daonils virkning.
- Medicin mod alvorlig infektion (ciprofloxacin). Kan øge risikoen for lavt blodglukose.
- Medicin for tuberkulose (rifampicin). Nedsætter Daonils virkning.

- Medicin mod svampeinfektion (fluconazol). Påvirker virkningen af Daonil.
- Vanddrivende medicin (thiazider). Kan øge risikoen for lavt blodglukose
- Let smertestillende medicin (acetylsalicylsyre). Øger risikoen for lavt blodglukose.
- Medicin mod gigt (phenylbutazon). Øger Daonils virkning.
- Ciclosporin (som du får, hvis du har fået en transplantation). Daonil kan øge ciclosporins virkning.
- Medicin mod depression (MAO-hæmmere). Øger Daonils virkning.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Daonil, og Daonil kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

3. Sådan skal du tage Daonil

Dosering

Daonil tabletter 1,75 mg:

Voksne: 1-8 tabletter (1,75-14 mg) daglig.

Til at starte med skal du tage 1 tablet (1,75 mg) daglig. Herefter øger du din dosis med 1 tablet (1,75 mg) hver 3.-5. dag, indtil dit blodglukose er under kontrol.

Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 4 tabletter (7 mg) daglig.

Du kan tage doser på indtil 4 tabletter (7 mg) på én gang om morgenen. Ellers kan du dele dosis op med 4 tabletter (7 mg) om morgenen og resten om aftenen.

Daonil tabletter 3,5 mg:

Voksne: ½-4 tabletter (1,75-14 mg) daglig.

Til at starte med skal du tage ½ tablet (1,75 mg) daglig. Herefter øger du din dosis med ½ tablet (1,75 mg) hver 3.-5. dag, indtil dit blodglukose er under kontrol.

Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis 2 tabletter (7 mg) daglig. Du kan tage doser på indtil 2 tabletter (7 mg) på én gang om morgenen. Ellers kan du dele dosis op med 2 tabletter (7 mg) om morgenen og resten om aftenen.

Du skal tage tabletterne umiddelbart før eller under et hovedmåltid.

Børn: Du må kun give Daonil til børn efter lægens anvisning.

Du skal tage tabletterne med et glas vand før eller i forbindelse med et måltid. Du kan dele tabletterne. Du skal synke den hele eller halve tablet i et helt stykke. Du må ikke knuse tabletten.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Daonil?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Daonil, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har taget for meget Daonil, kan du få for lavt blodglukose. Du kan få for lavt blodglukose op til 2 døgn efter, du har taget Daonil.

Symptomerne på for lavt blodglukose er: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger, træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser, ophidselse, aggressivitet, koncentrations-besvær, nedsat reaktionsevne, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, rystelser, lammelser, føleforstyrrelser, kraftsløshed, tab af selvkontrol, delirium, krampes, stakåndethed, lav puls, svimmelhed og besvimelse.
Hvis du har for lavt blodglukose, skal du spise noget med glukose i f.eks. chokolade eller druesukker. Hvis det ikke hjælper, skal du straks søge læge.

Har du glemt at tage Daonil?

Har du glemt at tage en Daonil, skal du blot fortsætte med at tage næste dosis, som du plejer. Tag ikke dobbeltdosis.

4. Bivirkninger

Daonil kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1000 patienter): Alvorlige forandringer i blodet, der kan vise sig ved forkølelse, høj feber, træthed, svimmelhed, spontane blødninger. Forhøjet niveau af leverenzymen og/eller leverbetændelse (gulfarvning af huden og det hvide i øjenene) som kan føre til livstruende leversvigt. Søg straks læge.
Overfølsomhedsreaktioner: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, svimmelhed, besvimelse. Kontakt straks lægen eller skadestue. Ring eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter): Kvalme, opkastninger, mavesmerter, diaré og følelse af oppustethed.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Eksem og nældefeber.
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): Lavt blodglukose.
Hypigheden ikke kendt: Synsforstyrrelser (især ved behandlingens start pga. svingninger i blodglukose).

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Tag ikke Daonil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Opbevar Daonil ved almindelig temperatur (15° C – 25° C). Opbevar Daonil utilgængeligt for børn.

6. Yderligere information

Daonil tabletter, 1,75 mg: Hvide tabletter med delekærv. Mærket LA-D på den ene side og præg på den anden side.
Daonil tabletter, 3,5 mg: Hvide tabletter med delekærv. Mærket LAF-LAF på den ene side og præg på den anden side
Aflever altid medicinrester på apoteket.

Daonil indeholder:

Daonil, tabletter, 1,75 mg og 3,5 mg.
Det aktive indholdsstof i Daonil er glibenclamid.
Hjælpestofferne er: Lactose; crospovidon; povidon 25000; macrogolstearat 2500; mikrokrySTALLINSK cellulose; magnesiumstearat.

Markedsføring i Danmark:

sanofi-aventis Denmark A/S
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Fremstiller:

Sanofi-Aventis Pharma S.p.A.
S:S 17 km 22
Scoppito
Italien

Revideret: Juni 2008