

Finasterid Alternova 5 mg filmovertrukne tabletter - finasterid

0264310901AD

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Finasterid Alternova dig personligt. Lad derfor være med at give det andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Finasterid Alternovas virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Alternova
3. Sådan skal du tage Finasterid Alternova
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Finasterid Alternova
6. Yderligere oplysninger

1. FINASTERID ALTERNOVAS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL.

Finasterid Alternova hører til den gruppe af lægemidler der kaldes 5-alfa reduktase hæmmere. De virker ved at reducere størrelsen på prostata hos mænd.

Finasterid Alternova anvendes i behandling og kontrol af godartet forstørrelse af prostata (benign prostata hyperplasia - BPH). Det virker ved at gøre den forstørrede prostata mindre, forbedre urinflowet og symptomerne forbundet med BPH. Det nedsætter desuden risikoen for akut urin tilbageholdelse og behovet for operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FINASTERID ALTERNOVA.

Tag ikke Finasterid Alternova

- Hvis du er allergisk (hypersensitiv) over for finasterid eller et af de andre indholdsstoffer i Finasterid Alternova
- Hvis du er kvinde (se også under "Graviditet og amning")
- Hvis du er et barn.

Vær ekstra forsigtig med at tage Finasterid Alternova

- Hvis du har en stor mængde urin tilbage i blæren efter vandladning /eller alvorlig nedsat urin flow. Hvis dette er tilfældet, bør du nøje overvåges for forsnævring af urinvejene.
- Hvis du har nedsat lever funktion. Indholdet af finasterid i plasma kan være øget hos disse patienter.
- Hvis din seksualpartner er eller kan være gravid, bør du undgå at udsætte hende for din sæd. Den kan indeholde en lille mængde af lægemiddelstoffet (se "Graviditet og amning").

Tal med din læge hvis det ovennævnte gælder for dig nu eller har gjort det tidligere.

En klinisk undersøgelse (inklusive digital rektal undersøgelse) og bestemmelse af prostata-specifik-antigen (PSA) i serum bør foretages forud for behandlingsstart med finasterid og gennem behandlingsforløbet.

Brug af anden medicin

Der er ikke blevet identificeret nogen vigtige interaktioner med andre lægemidler.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Finasterid Alternova sammen med mad og drikke

De filmovertrukne tabletter kan enten tages på tom mave eller til et måltid.

Graviditet og amning:

Finasterid Alternova er kun beregnet til mænd.

- Hvis din seksualpartner er eller kan være gravid, bør du undgå at udsætte hende for din sæd. Den kan indeholde en lille mængde af lægemiddelstoffet.

Kvinder der er gravide eller kan blive gravide bør ikke håndtere delte eller knuste Finasterid Alternova tabletter. Hvis finasterid absorberes gennem huden eller tages gennem munden af en gravid kvinde med et drengefoster, kan barnet fødes med deforme kønsorganer. Tabletterne er filmovertrukne, hvilket forhindrer kontakt med finasterid forudsat at tabletterne ikke er delte eller knuste.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen data der antyder at Finasterid Alternova påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid Alternova

Dette lægemiddel indeholder laktose. Patienter med sjælden arvelig galaktose intolerance, Lapp lactase deficiency eller glucose-galactose malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FINASTERID ALTERNOVA.

Tag altid Finasterid Alternova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig. (svarende til 5 mg finasterid).

De filmovertrukne tabletter kan enten tages på tom mave eller til et måltid. De filmovertrukne tabletter bør synkes hele og bør ikke deles eller knuses.

Selv om der tidligt i behandlingen er set forbedringer, kan behandling i mindst 6 måneder være nødvendig for at afgøre om en gavnlig virkning er opnået.

Din læge vil informere dig om hvor længe du skal fortsætte behandlingen med Finasterid Alternova 5 mg. Afbryd ikke behandlingen for tidligt da symptomerne kan komme tilbage.

Nedsat leverfunktion

Der er ingen erfaringer med brug af Finasterid Alternova 5 mg hos patienter med nedsat leverfunktion. (se også „Vær særlig forsigtig med at tage Finasterid Alternova 5 mg“)

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Anvendelse af Finasterid Alternova 5 mg hos patienter der skal gennemgå hæmodialyse (dialyse behandling hvor affaldsstofferne fjernes fra blodet) er endnu ikke undersøgt.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Tal med deres læge eller apotek hvis du føler at virkningen af Finasterid Alternova 5 mg er for stærk eller svag.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Hvis du har taget for mange Finasterid Alternova filmovertrukne tabletter.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Finasterid Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Finasterid Alternova

Hvis du glemmer at tage en dosis af Finasterid Alternova 5 mg, kan du tage den så snart du husker det, med mindre det snart er tid for din næste dosis, i så fald skal du fortsætte med din medicin som ordineret. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelse af dette lægemiddel, spørg da din læge eller apotek.

Hvis du holder op med at tage Finasterid Alternova

Ændring eller stop af behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER.

Finasterid Alternova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er impotens og nedsat sex lyst. Hos størstedelen af patienterne opstår det almindeligvis i begyndelsen af behandlingen, men varer sjældent længe hvis behandlingen fortsættes.

Meget almindelige bivirkninger (ses hos flere end 1 ud af 10 patienter): Impotens

Almindelige bivirkninger (ses hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Nedsat sex lyst, ændre sædmængde, ømhed i brysterne/forstørrede bryster, udløsningsforstyrrelser, udslæt

Ikke almindelige bivirkninger (ses hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): testikel smerter

Sjældne bivirkninger (ses hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Kløe, nældefeber

Meget sjældne bivirkninger (ses hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Sekretion fra brysterne, brystknuder, allergiske reaktioner f.eks. hævelse af ansigt og læber.

Der kan desuden forekomme træthed.

Finasterid kan påvirke resultatet af PSA-laboratorie test.

Tal med lægen eller på apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. SÅDAN OPBEVARER DU FINASTERID ALTERNOVA.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Finasterid Alternova efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**Finasterid Alternova indeholder:**

- Aktivt stof: finasterid. En fillovertrukket tablet indeholder 5 mg finasterid.
 - Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, mikrokrystalinsk cellulose, pregelatiniseret stivelse (majs), natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat; natriumlaurilsulfat.
- Tablettens overtræk indeholder hypromellose, mikrokrystalinsk cellulose, macrogolstearat (type I).

Finasterid Alternativens udseende og pakningsstørrelse

Finasterid Alternova er hvide, runde, biokonvekse, fillovertrukne tabletter med en diameter på 7 mm og de er mærket med "F" og "5" på den ene side.

Blister PVC/PVDC/Aluminium: 15, 28, 30, 50, 50x1, 56, 98, 100, 100x1

98 som kalenderpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Alternova A/S, Lodshusvej 11, DK-4230 Skælskør.

Fremstiller:

Viminco A/S, Lodshusvej 11, DK-4230 Skælskør

Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne:

Danmark: Finasterid Alternova

Sverige: Finasterid Alternova

Finnland: Finasterid Alternova

Østrig: Finasterid Alternova

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 05/08-2008