

Tevetenz® 600 mg filmovertrukne tabletter

eprosartan

0337425904

Tevetenz® svarer til lægemidlet Teveten®. Tevetenz® er et registreret varemærke, som tilhører Solvay Koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Tevetenz® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Tevetenz® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Tevetenz®s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Tevetenz®
3. Sådan skal De bruge Tevetenz®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Tevetenz®
6. Yderligere oplysninger

1. Tevetenz®s virkning og hvad De skal bruge det til

Tevetenz® anvendes til behandling af forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Tevetenz®

Brug ikke Tevetenz® hvis:

- De er overfølsom overfor eprosartan eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Tevetenz®.
- De lider af alvorlig nyresygdom.
- De er gravid eller ammer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Tevetenz®

Tal med Deres læge, inden De tager Tevetenz®, hvis De har problemer med hjerte, lever eller nyrer. Hvis De lider af aldosteronisme (sygdom, hvor binyrerne producerer for meget af hormonet aldosteron), bør De ikke anvende Tevetenz®. Tal med Deres læge, hvis De anvender andet blodtrykssænkende medicin, vanddrivende medicin, kaliumtilskud, salterstatning indeholdende kalium eller andet medicin der forøger kaliumniveauet i kroppen.

Tal med Deres læge, hvis De lider af salt- eller væskemangel, fx ved indtagelse af

høje doser vanddrivende medicin eller hvis De lider af kraftig diarré eller opkastning.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Tevetenz®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Dette gælder især, hvis De bruger:

- kaliumbesparende vanddrivende medicin.
- kaliumtilskud.
- medicin der øger kaliumindholdet i blodet (fx heparin forebyggende mod blodpropper).
- andet blodtrykssænkende medicin fx ACE-hæmmere.
- medicin mod mani/depression (lithium).

Brug af Tevetenz® sammen med mad og drikke

De kan tage Tevetenz® med eller uden mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må ikke bruge Tevetenz® under graviditet.

Amning:

Hvis De bruger Tevetenz® må De ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tevetenz® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vær dog opmærksom på, at der under behandling af forhøjet blodtryk, fra tid til anden, kan optræde svimmelhed og træthed.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tevetenz®

Tevetenz® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De bruge Tevetenz®

Brug altid Tevetenz® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Voksne: Den sædvanlig dosis er 600 mg 1 gang dagligt.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn: De bør ikke anvende Tevetenz® til børn.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Dosis skal muligvis justeres. Lægens anvisning skal følges.

Hvis De har taget for mange Tevetenz® filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Tevetenz®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering er for lavt blodtryk.

Hvis De har glemt at tage Tevetenz®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at tage Tevetenz®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. Bivirkninger

Tevetenz® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Frekvens ukendt: Allergisk opsvulmning af hud og slimhinder fx i ansigt, og af og til i mundhulen og struben, nedsat nyrefunktion inkl. nyresvigt hos risikopatienter.

Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Forhøjet koncentration af fedtstof i blodet (øget risiko for åreforkalkning), brystsmerte, depression. Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Frekvens ukendt: For lavt blodtryk inkl. for lavt blodtryk ved skift fra liggende til siddende eller stående stilling, udslett, kløe, nældefeber.

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Virusinfektion, brystsmerte, hjertebanken, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, betændelse i næseslimhinden, halsbetændelse,

åndenød, betændelse i de øvre luftveje, hoste, hovedpine, svimmelhed, træthed, blærebetændelse, rygsmerter, ledsmerter, kvalme, opkastninger, diarré, kraftsløshed, skade, smerter.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): For højt kaliumindhold i blodet (viser sig ved muskelsvaghed, forvirring, talebesvær, lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme, kan blive alvorligt, tal med lægen).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk/>

5. Sådan opbevarer De Tevetenz®

Tevetenz® opbevares utilgængeligt for børn. Tevetenz® må ikke opbevares over 25°C.

Brug ikke Tevetenz®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Tevetenz® 600 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: 600 mg eprosartan.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemono-hydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, prægelatineret stivelse, crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, marcogol 400, polysorbat 80, titandioxid (E 171).

Tevetenz®s udseende og pakningsstørrelse:

Tevetenz® er en kapselformet, hvid, filmovertrukken tablet mærket 5046 på den ene side og SOLVAY på den anden side.

Tevetenz® findes i pakningsstørrelserne 28 stk. og 98 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2008