

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Yasminelle 0,02 mg/3 mg, filmovertrukne tabletter
Ethinylestradiol/Drospirenon

Læs hele denne indlægsseddel godt igennem, før du begynder at tage medicinen.

- *Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.*
- *Ønsker du mere information, så kontakt din læge eller apotek.*
- *Lægen har ordineret Yasminelle til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kunne skade dem.*
- *Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller apotek.*

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Denne indlægsseddel fortæller:

1.	VIRKNING OG ANVENDELSE	2
2.	VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER YASMINELLE	2
	Brug ikke Yasminelle hvis.....	3
	Særlige forholdsregler.....	3
	Yasminelle og blodpropper i en vene og en pulsår.....	4
	Yasminelle og kræft.....	5
	Blødning imellem menstruationerne.....	6
	Hvad du skal gøre, hvis du ikke får blødning i den p-pillefrie periode	6
	Yasminelle og brug af anden medicin	6
	Brug af Yasminelle sammen med mad og drikke	5
	Laboratorietest	7
	Graviditet	7
	Amning	7
	Trafik- og arbejdssikkerhed	7
	Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Yasminelle	7
3.	SÅDAN SKAL DU BRUGE YASMINELLE.....	7
	Hvornår kan du starte den første blisterpakning	8
	Har du taget for mange Yasminelle	9
	Har du glemt at tage Yasminelle.....	9

	Hvis du har opkastning eller alvorlig diaré.....	11
	Hvis du ønsker at forsinke din menstruationsperiode.....	12
	Hvis du ønsker at ændre den første dag i din menstruationsperiode	12
	Hvis du ønsker at stoppe med at tage Yasminelle	12
4.	BIVIRKNINGER.....	12
5.	OPBEVARING	14
6.	YDERLIGERE INFORMATION	14

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Yasminelle er en p-pille, og anvendes for at forhindre uønsket graviditet.
- Hver tablet indeholder en lille mængde af to forskellige kvindelige kønshormoner, drospirenon og ethinylestradiol.
- P-piller, som indeholder to hormoner, kaldes kombinations-p-piller.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU BRUGER YASMINELLE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Generelle forholdsregler

Før du kan begynde at tage Yasminelle, vil din læge stille nogle spørgsmål om din egen og din nærmeste families sygehistorie. Lægen vil også måle dit blodtryk, og afhængig af din personlige situation kan han/hun også tage andre prøver.

I denne indlægsseddel beskrives adskillige situationer, hvor du bør stoppe med at tage Yasminelle, eller hvor sikkerheden af Yasminelle kan være nedsat. I disse situationer bør du enten ikke have samleje, eller du bør tage ekstra ikke-hormonelle sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. anvende kondom eller en anden barrieremetode. Anvend ikke kalender- eller temperaturmetoden. Disse metoder kan være usikre, fordi Yasminelle påvirker de månedlige ændringer i kropstemperaturen og slimhinden i livmoderhalsen.

Yasminelle og andre p-piller beskytter ikke mod HIV- infektion (AIDS) eller mod andre seksuelt overførte sygdomme.

Brug ikke Yasminelle hvis

- du har (eller tidligere har haft) en blodprop i et blodkar i benet (trombose), i lungen (lungeemboli) eller i andre organer
- du har (eller tidligere har haft) et hjerteanfald eller et slagtilfælde
- du har (eller tidligere har haft) en sygdom, som kan være en forløber for et hjerteanfald i fremtiden (f.eks. angina pectoris, som giver svære brystmerter) eller for et slagtilfælde, (f.eks. et forbigående, let slagtilfælde uden blivende effekt)
- du har en sygdom, som kan øge risikoen for en blodprop i pulsårerne. Det drejer sig om følgende sygdomme:
 - diabetes, med ødelagte blodårer
 - meget højt blodtryk
 - et meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider)
- du har en forstyrrelse i blodets koagulation (f.eks. protein C-mangel)
- du har (eller tidligere har haft) visse former for migræne (med såkaldt fokale neurologiske symptomer)
- du har (eller tidligere har haft) en betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
- du har (eller tidligere har haft) en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er normal
- dine nyrer ikke fungerer godt (nyresvigt)
- du har (eller tidligere har haft) en levertumor
- du har (eller tidligere har haft) eller hvis der er mistanke om at du har brystkræft eller kræft i kønsorganerne
- du har uforklarlige blødninger fra skeden
- du er allergisk over for ethinylestradiol eller drospirenon, eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Yasminelle. Dette kan give kløe, udslæt eller hævelser.

Særlige forholdsregler

I visse situationer skal du være forsigtig når du tager Yasminelle eller en anden kombinations-p-pille, og det kan være nødvendigt, at lægen regelmæssigt undersøger dig. Hvis nogle af forholdene nedenfor gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, inden du begynder at tage Yasminelle. Og hvis en eller flere af følgende forhold gælder for dig, eller hvis et af dem udvikler sig eller bliver værre under brugen af Yasminelle, skal du kontakte din læge:

- hvis et nært familiemedlem har eller tidligere har haft brystkræft
- hvis du har en sygdom i leveren eller i galdeblæren

- hvis du har diabetes
- hvis du har en depression
- hvis du har Crohns sygdom eller kronisk tarmbetændelse (ulcerøs colitis)
- hvis du har en blodsygdom, der hedder HUS (hæmolytisk uræmisk syndrom), som giver nyreskader
- hvis du har en blodsygdom, der hedder seglcelleanæmi
- hvis du har epilepsi (se ”Yasminelle og brug af anden medicin”)
- hvis du har en sygdom i immunsystemet, der hedder SLE (systemisk lupus erythematosus)
- hvis du lider af en sygdom, som først fremkom under graviditet eller ved tidligere brug af kønshormoner (f.eks. tab af hørelse, en blodsygdom, der hedder porfyri, et udslæt med blærer under graviditeten (herpes gestationis), en nervesygdom med pludselige bevægelser af kroppen (Sydenhams chorea)
- hvis du har eller nogensinde har haft kloasma (en misfarvning af huden, især i ansigtet eller på halsen kendt som ”graviditetspletter”). I så fald skal du undgå direkte sollys eller ultraviolet lys.
- hvis du har arveligt angioødem kan produkter, der indeholder østrogener fremkalde eller forværre symptomerne på angioødem. Du skal omgående kontakte din læge, hvis du får symptomer på angioødem som f.eks. opsvulmet ansigt, tunge og/eller svælg, og/eller du får svært ved at synke eller får nældefeber i forbindelse med vejrtrækningsbesvær.

Yasminelle og blodpropper i en vene og en pulsåre

Brugen af alle slags kombinations-p-piller, inklusiv Yasminelle øger kvinders risiko for at udvikle en **blodprop i en vene (venetrombose)** sammenlignet med kvinder, som ikke bruger p-piller.

Risikoen for blodpropper i venerne hos brugere af kombinations-p-piller stiger:

- med alderen
- hvis du er overvægtig
- hvis et nært familiemedlem tidligere har haft en blodprop i benet, lungerne (lungeemboli) eller andre organer i en ung alder
- hvis du skal have en operation, hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, eller hvis du er sengeliggende i længere tid. Det er vigtigt at fortælle din læge, at du tager Yasminelle, da du måske skal holde op med at tage dem. Din læge kan fortælle dig, hvornår du kan starte igen. Det er som regel cirka to uger efter, du er på benene igen.

Brugen af kombinations-p-piller er blevet forbundet med en øget risiko for **blodprop i en pulsåre** (arteriel trombose) f.eks. i hjertets blodårer (hjerteanfald) eller i hjernen (slagtilfælde).

Risikoen for blodprop i pulsårerne hos brugere af kombinations-p-piller stiger:

- **hvis du ryger. Du anbefales stærkt at stoppe med at ryge, mens du anvender Yasminelle, især hvis du er over 35 år.**
- hvis du har øget indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider)
- hvis du er overvægtig
- hvis en person i din nære familie tidligere har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde som ung
- hvis du har højt blodtryk
- hvis du har migræne
- hvis du har problemer med hjertet (klapfejl, en forstyrrelse af hjerterytmen)

Stop med at tage Yasminelle og kontakt din læge straks, hvis du oplever mulige tegn på blodprop, såsom:

- svære smerter og/eller hævelse i et af benene
- pludselig, svær smerte i brystet, som kan stråle ud i venstre arm
- pludselig vejrtrækningsbesvær
- pludselig hoste uden åbenlys årsag
- enhver usædvanlig, stærk eller langvarig hovedpine eller forværring af migræne
- delvis eller fuldstændig blindhed eller dobbeltsyn
- talebesvær eller manglende evne til at tale
- svimmelhed eller besvimelse
- svækkelse, en mærkelig følelse eller følelsesløshed i en del af kroppen

Yasminelle og kræft

Brystkræft forekommer lidt oftere hos kvinder som anvender kombinations-p-piller, men det vides ikke om det skyldes behandlingen. Det kan f.eks. være, at der opdages flere tumorer hos kvinder, der anvender kombinations-p-piller, fordi de oftere undersøges af lægen. Forekomsten af tumorer i brystet bliver gradvist lavere, når behandlingen med kombinations-p-piller stoppes. Det er vigtigt at du regelmæssigt checker dine bryster og du skal kontakte din læge, hvis du mærker en knude.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret godartede leversvulster, og i endnu sjældnere tilfælde ondartede leversvulster hos p-pillebrugere. Kontakt straks din læge, hvis du får usædvanlig stærke underlivssmerter.

Blødning imellem menstruationerne

I de første måneder du tager Yasminelle, kan du have uventede blødninger (blødninger udenfor den p-pillefri uge). Hvis blødningen varer længere end nogle få måneder, eller hvis det begynder efter nogle måneder, skal din læge finde ud af, hvad der er galt.

Hvad du skal gøre, hvis du ikke får blødning i den p-pillefrie periode

Hvis du har taget alle tabletterne korrekt og ikke har kastet op eller haft alvorlig diaré og ikke har taget anden medicin, er det meget usandsynligt, at du er gravid.

Hvis du ikke får din menstruation to gange i træk, er du måske gravid. Kontakt omgående din læge. Start ikke på din næste blisterpakning, før du er sikker på, at du ikke er gravid.

Yasminelle og brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Fortæl også evt. andre læger, tandlæger som ordinerer anden medicin eller apoteket at du anvender Yasminelle. De kan fortælle dig, om du skal tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler (f.eks. kondom), og i så fald hvor længe.

Visse former for medicin kan gøre Yasminelle mindre effektiv i at forhindre graviditet, eller de kan forårsage uventet blødning. Det drejer sig om:

- medicin til behandling af
 - epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbamazepin)
 - tuberkulose (f.eks. rifampicin)
 - HIV-infektioner (ritonavir, nevirapin) eller andre infektioner (antibiotika som griseofulvin, penicillin, tetracyclin)
 - højt blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan)
- naturmedicinen hyperikum (prikbladet perikon)

Yasminelle kan indvirke på virkningen af anden medicin, f.eks.

- medicin indeholdende ciclosporin
- det anti-epileptiske middel lamotrigin (dette kan føre til et øget antal epileptiske anfald)

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Brug af Yasminelle sammen med mad og drikke

Du kan tage Yasminelle sammen med eller uden mad, om nødvendigt med lidt vand.

Laboratorietest

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle lægen eller laboratoriet, at du tager p-piller, da hormonel svangerskabsforebyggelse kan indvirke på resultatet af nogle prøver.

Graviditet

Tag ikke Yasminelle, hvis du er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Yasminelle, skal du stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge. Hvis du ønsker at blive gravid, kan du når som helst holde op med at tage Yasminelle (se også "Hvis du ønsker at stoppe med at tage Yasminelle").

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke bruge Yasminelle. Hvis du ønsker at anvende p-piller under amning, bør du spørge din læge til råds.

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der foreligger ingen information, som tyder på, at brug af Yasminelle påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Yasminelle

Yasminelle indeholder lactose.

Hvis du ikke kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager Yasminelle.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE YASMINELLE

Tag en p-pille hver dag, om nødvendigt med en lille smule vand. Du kan tage p-pillerne med eller uden mad, men du bør tage dem nogenlunde samtidig hver dag.

Blisterpakningen indeholder 21 p-piller. Ved siden af hver tablet er det markeret, på hvilken

ugedag tabletten skal tages. Hvis du for eksempel starter en onsdag, skal du tage tabletten med “ONS” ved siden af. Følg pilens retning på blisterpakningen, til du har taget alle 21 p-piller.

Derefter skal du holde pause i 7 dage. I løbet af de 7 tabletfrie dage (også kaldet p-pillefri periode), bør blødningen starte. Denne såkaldte “gennembrudsblødning” starter som regel den anden eller tredje dag i den p-pillefri uge.

Den 8. dag efter du har taget den sidste Yasminelle (dvs. efter den p-pillefri periode på 7 dage), skal du starte på den næste blisterpakning, uanset om din blødning er stoppet eller ej. Det betyder, at du skal starte på hver eneste blisterpakning på den samme ugedag, og at gennembrudsblødningen bør starte samme dag hver måned.

Hvis du tager Yasminelle på den måde, er du også beskyttet mod graviditet i de 7 dage, hvor du ikke tager tabletten.

Hvornår kan du starte den første blisterpakning?

- *Hvis du ikke har brugt hormonale svangerskabsforebyggende midler inden for den sidste måned.*
Begynd med Yasminelle den første dag i cyklus (dvs. på din menstruations første dag). Hvis du starter med at tage Yasminelle på din menstruations første dag, er du straks beskyttet mod graviditet. Du kan også starte på menstruationens 2.-5. dag, men så skal du beskytte dig ekstra mod graviditet (f. eks. med kondom) de første 7 dage.
- *Ved skift fra en p-pille af kombinationstypen eller en p-ring eller et p-plaster af kombinationstypen.*
Du skal helst starte med at tage Yasminelle dagen efter den sidste aktive p-pille (den sidste p-pille med aktivt stof) i dine tidligere p-piller, men senest dagen efter de tabletfrie dage for din tidligere p-pille (eller efter den sidste inaktive tablet i dine tidligere p-piller). Når du skifter fra en p-ring eller et p-plaster af kombinationstypen, skal du følge din læges råd.
- *Ved skift fra en gestagen-metode (minipiller (tabletter indeholdende gestagen alene), injektion, implantat eller fra et gestagenudløsende intrauterint indlæg (spiral)).*
Du kan skifte fra en minipille fra den ene dag til den anden (fra implantat eller indlæg den dag det tages ud, fra et injektionspræparat den dag du skulle have haft den næste injektion), men i alle disse tilfælde skal du beskytte dig yderligere mod graviditet (f.eks. et kondom) de første 7 dage.
- *Efter en abort.*
Følg lægens råd.
- *Efter fødsel.*
Du kan starte med at tage Yasminelle mellem 21 og 28 dage efter en fødsel. Hvis du starter senere end dag 28, skal du bruge en såkaldt barrieremetode (f.eks. kondom) de første 7 dage

du tager Yasminelle.

Hvis du efter en fødsel har haft samleje, før du begynder at tage Yasminelle (igen), skal du først sikre dig, at du ikke er gravid eller vente til din næste menstruation.

- *Hvis du ammer og ønsker at tage Yasminelle (igen) efter at have født.*
Læs afsnittet om "Amning".

Din læge kan rådgive dig, hvis du ikke er sikker på, hvornår du skal starte.

Har du taget for mange Yasminelle

Der er ikke rapporteret om alvorlige skadelige virkninger af at tage for mange Yasminelle-tabletter.

Hvis du tager flere tabletter på én gang, kan du få kvalme eller opkastninger. Unge kvinder kan få blødning fra skeden.

Hvis du har taget for mange Yasminelle tabletter eller opdager, at et barn har taget nogle tabletter, skal du bede din læge eller apoteket om råd.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Yasminelle, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Har du glemt at tage Yasminelle

- Hvis der er gået **mindre end 12 timer**, siden du skulle have taget din sidste p-pille, er beskyttelsen mod graviditet ikke nedsat. Tag p-pillen, så snart du husker det, og tag de følgende tabletter igen på den sædvanlige tid.
- Hvis der er gået **mere end 12 timer** siden, du skulle have taget din sidste p-pille, kan beskyttelsen mod graviditet være nedsat. Jo flere p-piller, du har glemt, jo større er risikoen for at blive gravid.

Risikoen for nedsat beskyttelse mod graviditet er størst, hvis du glemmer en tablet i starten eller slutningen af blisterpakningen. Derfor skal du bruge følgende regler (se også skemaet på siden neden):

- **Mere end 1 tablet er glemt i denne blisterpakning**
Spørg din læge til råds.

- **1 tablet glemt i uge 1**

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også hvis det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Fortsæt med at tage p-pillerne på det sædvanlige tidspunkt og brug **ekstra prævention** de næste 7 dage, for eksempel et kondom. Hvis du har haft samleje i ugen før, du glemte p-pillen, kan du være blevet gravid. Kontakt i så fald din læge.

- **1 tablet glemt i uge 2**

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også hvis det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Fortsæt med at tage p-pillerne på det sædvanlige tidspunkt. Beskyttelsen mod graviditet er ikke nedsat, og du behøver ikke at bruge ekstra prævention.

- **1 tablet glemt i uge 3**

Du kan vælge imellem to muligheder:


1. Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også hvis det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Fortsæt med at tage p-pillerne på det sædvanlige tidspunkt. I stedet for den p-pillefri periode skal du straks begynde på den næste blisterpakning.

Du får sandsynligvis menstruation efter den anden blisterpakning, men du kan også få en let eller menstruationslignende blødning, mens du tager pillerne fra den anden blisterpakning.

2. Du kan også stoppe med at tage p-piller fra blisterpakningen og gå direkte til de 7 dages tabletfri periode (**noter den dag, hvor du glemte din p-pille**). Hvis du vil starte en ny blisterpakning på den ugedag, hvor du altid starter, kan du gøre den p-pillefri periode *kortere end 7 dage*.

Hvis du følger en af disse to anbefalinger, er du stadig beskyttet mod graviditet.

- Hvis du har glemt en af p-pillerne i blisterpakningen, og du ikke får en blødning i den første p-pillefri periode, kan du være blevet gravid. Kontakt din læge, før du begynder på den næste blisterpakning.



Hvis du har opkastning eller alvorlig diaré

Hvis du kaster op inden for 3-4 timer efter, du har taget en p-pille, eller hvis du har alvorlig diaré, er der en risiko for, at de aktive stoffer i tabletten ikke bliver optaget helt i din krop. Situationen er næsten den samme, som hvis du glemmer en tablet. Efter opkastning eller diaré skal du tage en ny p-pille fra en reserve-blisterpakning så hurtigt som muligt. Hvis det er muligt, skal du tage den *inden for 12 timer* fra det tidspunkt, hvor du normalt tager din p-pille. Hvis det ikke er muligt, eller der er gået mere end 12 timer, skal du følge rådene under “Har du glemt at tage Yasminelle”.

Hvis du ønsker at forsinke din menstruationsperiode

Selvom det ikke anbefales kan du forsinke din menstruationsperiode ved at gå direkte til en ny blisterpakning med Yasminelle i stedet for den p-pillefri periode, og færdiggøre denne. Du kan få en let blødning eller en menstruationslignende blødning, mens du bruger den anden blisterpakning. Efter den sædvanlige p-pillefri periode på 7 dage, skal du starte på den næste blisterpakning.

Du kan spørge din læge om råd, før du beslutter om du vil forsinke din menstruationsperiode

Hvis du ønsker at ændre den første dag i din menstruationsperiode

Hvis du tager p-pillerne efter anvisningerne, begynder din menstruation i den p-pillefri periode. Hvis du vil ændre denne dag, kan du nedsætte antallet af p-pillefrie dage (men aldrig forøge dem – 7 dage er maksimum!) Hvis dine p-pillefrie-dage f.eks. normalt starter på en fredag, og du ønsker at ændre det til tirsdag (3 dage tidligere), skal du starte på en ny blisterpakning 3 dage før normalt. Hvis du gør den p-pillefri periode meget kort (f.eks. 3 dage eller derunder), får du måske ingen blødning i denne periode. Du kan i så fald få en let blødning eller en menstruationslignende blødning.

Hvis du ikke er sikker på hvad du skal gøre, skal du kontakte din læge for at få rådgivning.

Hvis du ønsker at stoppe med at tage Yasminelle

Du kan til enhver tid stoppe med at tage Yasminelle. Bed din læge om råd om andre sikre præventionsmetoder, hvis du ikke ønsker at blive gravid. Hvis du gerne vil være gravid, skal du holde op med at tage Yasminelle og vente på din menstruation, før du prøver på at blive gravid. Det vil være nemmere for dig at udregne den forventede fødsel

Spørg din læge eller apotek, hvis du har yderligere spørgsmål.

4. BIVIRKNINGER

Som alle andre lægemidler kan Yasminelle have bivirkninger, selvom ikke alle får dem.

Her følger en oversigt over bivirkninger, der er blevet forbundet med brugen af Yasminelle.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 kvinder):

- Humørsvingninger
- Hovedpine
- Smerter i underlivet
- Acne
- Brystsmerter, forstørrelse af brystet, smertefulde eller uregelmæssige menstruationer

- Vægtøgning

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 kvinder):

- Candidiasis (svampeinfektion)
- Forkølelsessår (herpes simplex),
- Allergiske reaktioner,
- Øget appetit
- Depression, nervøsitet, søvnforstyrrelser, nedsat sexlyst
- Stikkende fornemmelse, svimmelhed (vertigo)
- Synsforstyrrelser
- Forstyrrelser i hjerterytmen eller usædvanlig hurtig hjerterytme
- En blodprop (trombose) i et ben eller lungerne (lungeemboli), forhøjet blodtryk, migræne, åreknuder
- Halsbetændelse
- Kvalme, opkastning, inflammation i mave-tarm-kanalen, diaré, forstoppelse
- Pludselige hævelser i huden og/eller slimhinderne (f.eks. tunge eller svælg) og/eller synkebesvær eller udslæt samtidigt med åndedrætsbesvær (angioødem), hårtab (alopecia), kløe, udslæt, tør hud, øget fedtudskillelse i huden (seboré)
- Nakkesmerter, smerter i arme og ben, muskelkramper
- Blærebetændelse
- Knude i brysterne (godartet og kræft), mælkeflåd selvom du ikke er gravid (galactorrhea), ovariecyster, hedeture, udebleven menstruation, kraftigt forøget menstruation, udflåd fra skeden, tørhed i skeden, underlivssmerter, mistænkelig livmoderhals-smeartest (Papanicolaou eller Pap smear)
- Ødem, manglende energi, ekstrem tørst, øget svedafsondring
- Vægttab.

Hvis du bemærker bivirkninger, som ikke findes i denne indlægsseddel, skal du fortælle din læge eller dit apotek om det.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. OPBEVARING

Opbevar Yasminelle utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Udløbsdato

Anvend ikke Yasminelle efter den udløbsdato, der er anført på pakningen efter EXP.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Hvad Yasminelle indeholder

- De aktive stoffer er ethinylestradiol (som betadexclathrat) og drospirenon. Hver tablet indeholder 0,020 milligram ethinylestradiol (som betadexclathrat) og 3 milligram drospirenon.
- Andre ingredienser (hjelpestoffer) er lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat (E470b), hypromellose (E464), talkum (E553b), titandioxid (E171) og jernoxid-rød (E172).

Produktets udseende og pakningstørrelse

- Hver blisterpakning med Yasminelle indeholder 21 lyserøde, filmovertrukne tabletter
- Yasminelle tabletter er filmovertrukne tabletter. Det vil sige, at tablettens kerne er dækket med en film. Tabletterne er lyserøde, runde med konvekse flader, den ene side har bogstaverne "DS" i relief i en regelmæssig sekskant.
- Yasminelle fås i pakninger med 1, 3, 6 og 13 blisterpakning(er) hver med 21 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland

Fremstiller

Bayer Pharma AG
13342 Berlin, Tyskland

og

Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Tyskland

Repræsentant i Danmark

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Dette lægemiddel er registreret i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) under følgende navne:

- Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien: **Yasminelle**
- Ungarn: **Aliane**
- Frankrig: **Jasminelle**

Denne indlægsseddel er sidst revideret i oktober 2011.