

Indlægsseddel: Information til brugeren
Panodil Hot
500 mg pulver til oral opløsning, brev
paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Panodil Hot uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Panodil Hot.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Panodil Hots virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Hot
3. Sådan skal du tage Panodil Hot
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Panodil Hot
6. Yderligere oplysninger

1. Panodil Hots virkning og hvad du skal bruge det til

Panodil Hot virker smertestillende og febernedsættende.

Du kan tage Panodil Hot mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Lægen kan have givet dig Panodil Hot til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Hot

Tag ikke Panodil Hot, hvis:

- du er overfølsom over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer
- du har meget dårlig lever.

Vær ekstra forsigtig med at tage Panodil Hot

BØRN ELLER UNGE I HJEMMET?

Læs advarslen og vær omhyggelig med,
hvordan du opbevarer denne medicin.

Advarsel

- Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks kontakte læge.
- Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol er der risiko for overdosering.

Tal med lægen inden du tager Panodil Hot, hvis:

- du har dårlig lever.
- du har nedsat nyrefunktion.
- du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi) eller fejlnæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
- har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse) eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.

Vær opmærksom på følgende

- Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
- Hvis du tager Panodil Hot mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
- Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Panodil Hot. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
- medicin mod urinsyreigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil Hot regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil Hot mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen.

Brug af Panodil Hot sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil Hot i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Panodil Hot under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du tager Panodil Hot.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil Hot påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Panodil Hot

Panodil Hot indeholder aspartam (E951), som er en fenyylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenyylketonuri (PKU, Føllingssygdom).

Panodil Hot indeholder 118 mg natrium pr. brev. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. Forsigtighed ved hjertesygdom.

Panodil Hot indeholder farvestofferne E110, E123 og E151, som kan give allergiske reaktioner.

Panodil Hot indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Panodil Hot

Hvis din læge har ordineret Panodil Hot til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal opløse pulveret i kogende vand og drikke det varmt.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

2 breve 3-4 gange dagligt. Højest 8 breve (4000 mg) dagligt. I enkelte tilfælde kan 1 brev 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt.

Børn under 15 år

Du må kun bruge Panodil Hot til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Panodil Hot

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Panodil Hot, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

En større dosis Panodil Hot end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.

Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.

Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen).

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt.

Hvis du har glemt at tage Panodil Hot

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Panodil kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Vejtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt læge.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Nældefeber.
- Forhøjede levertal.
- Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser.) Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Panodil Hot

- Opbevar Panodil Hot utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Panodil Hot ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Panodil Hot efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, breve indeholder

Aktivt stof: paracetamol.

Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, vandfri natriumcitrat, saccharose, aspartam (E951), mentholesens, solbæraroma, solbærfarve (E110, E123, E151).

Panodil Hots udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Panodil Hot er et svagt, violet pulver med hvide partikler.

Pakningsstørrelser

10 pulvere til oral opløsning, breve

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline

Consumer Healthcare A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
Tlf: 44 86 86 86
E-mail: info.dk@gsk.com

Fremstiller

Fremstiller:

SmithKline Beecham S.A., Madrid, Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2010