

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alomide® 1 mg/ml, øjendråber, opløsning

Lodoxamid trometamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Alomide øjendråber til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Alomide
3. Sådan skal du bruge Alomide
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Alomide hæmmer allergiske reaktioner i øjnene.

Du kan bruge Alomide

- mod allergisk betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser sig ved at øjnene løber, klør og er røde og øjenlågene hævede
- Betændelseslignende tilstand (inflammation) på grund af anden form for overfølsomhed (allergi)
- Betændelseslignende tilstand (inflammation) i forbindelse med brug af bløde kontaktlinser.

Lægen kan have givet dig Alomide for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ALOMIDE

Brug ikke Alomide

- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Alomide.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Alomide

Vær opmærksom på følgende

- Du må kun bruge Alomide i øjnene.
- Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både hårde og bløde), når du har en betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger andre øjendråber, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Alomide og de andre dråber.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Alomide efter aftale med lægen.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Alomide er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alomide kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Alomide

Alomide indeholder benzalkoniumklorid, et konserveringsmiddel, som kan give øjenirritation og misfarve bløde kontaktlinser.

Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både hårde og bløde), når du har en betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ALOMIDE

Brug altid Alomide nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 4 år: 1-2 dråber i det/de angrebne øje/øjne 4 gange daglig.

Børn under 4 år

Du må kun bruge Alomide til børn under 4 år efter aftale med en læge.

Lindring af symptomer som kløe, tåreflåd, rødme og pus kommer normalt indenfor en uge. Det kan være nødvendigt at behandlingen fortsætter i 4 uger. Følg altid lægens anvisning.

Selvom dine symptomer forsvinder, skal du fortsætte behandlingen, så længe som lægen har fortalt dig, for at undgå at sygdommen blusser op igen.

Sådan bruger du Alomide korrekt:

1. Vask hænder og sæt dig foran et spejl.
2. Skru låget af flasken.
3. Pas på at flaskens spids ikke rører noget, da indholdet så kan blive forurenset.
4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.
5. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad.

6. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at den rører det. Tryk let på flaskens bund med pegefingern, så det antal dråber lægen har ordineret, falder ned i sprækken mellem øjet og det nederste øjenlåg.
7. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 2 minutter. Luk tårekanalen ved at trykke let med fingern på øjenkrogen i 2 minutter. Dette vil hjælpe med at nedsætte optagelsen af Alomide i resten af kroppen.
8. Hvis du også skal bruge Alomide i det andet øje, skal du gentage trin 5-7.
9. Skru låget på flasken.

Hvis du har brugt for meget Alomide

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Alomide, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har dryppet for meget Alomide i øjet, kan du skylle det væk med lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge Alomide

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige doseringsplan. Brug aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Alomide kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Smerter og uklart syn pga. skade på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

- Øjenirritation eller øjensmerte.
- Ubehag i øjet.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Tørhed, kløe eller rødme af øjne.
- Sløret syn, skorpedannelse på øjenlåg, øget tåreproduktion.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Hovedpine, svimmelhed og træthed.
- Nysen, tør næse.
- Kvalme, ubehag i maven.
- Udslæt.
- Varmefølelse.
- Smerter og nedsat syn pga. betændelse (infektion) i øjets hornhinde.
- Sløret syn.
- Hævelse af øjets omgivelser, kløe, rødme og tåreflod pga. allergi.
- Hævelse i øjet.
- Pus fra øjet.
- Unormal følelse i øjet (varm eller klistret fornemmelse i øjet).
- Følelse af at have noget i øjet.

- Øjentræthed.
- Hævede øjenlåg, nedsat syn.
- Irritation i øjet pga. sygdom i hornhinden.
- Betændelse (infektion) i øjenlågsrandene (bygkorn).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Alomide utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Alomide ved temperaturer over 25°C.
- Efter åbning af flasken første gang skal du bruge Alomide inden 4 uger.
- Brug ikke Alomide efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alomide 1 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder:

- Aktivt stof: Iodoxamidtrometamol.
- Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel) 0,07 mg, mannitol (E421), hypromellose, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, dinatriumedetat, tyloxapol, natriumhydroxid og/eller saltsyre (for at justere surhedsgraden) og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Alomide er en farveløs opløsning.

Pakningsstørrelse

10 ml plastikflaske med tilhørende dråbespids.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Alomide øjendråber, opløsning

Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Storbritannien.

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgien.

Repræsentant for Danmark

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Tlf: 3636 4300

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2014.