



INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN

CILOXAN® 3 mg/ml, øjendråber, opløsning

Ciprofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret CILOXAN® øjendråber til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge CILOXAN®
3. Sådan skal du bruge CILOXAN®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

CILOXAN® indeholder et antibiotikum, der virker på mange forskellige bakterier.

Du kan bruge CILOXAN® mod øjenbetændelse (infektion).

Lægen kan have givet dig CILOXAN® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CILOXAN®

Brug ikke CILOXAN®:

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for ciprofloxacin, andre lignende stoffer (quinoloner), eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge CILOXAN®:

- Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, kløe eller nældefeber. Ved åndedrætsbesvær ring 112.
- Tal med lægen, inden du bruger CILOXAN®, hvis du har skader eller sår på hornhinden.
- Kontakt lægen hvis du ikke får det bedre, eller betændelsen (infektionen) bliver værre.

Vær opmærksom på følgende:

- Når du bruger CILOXAN®, skal du beskytte dig mod solen.
- Du skal ikke bruge kontaktlinser mens du er i behandling for øjenbetændelse (infektion).
- Du skal normalt ikke bruge CILOXAN® til børn under 1 år. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du samtidig er i behandling med andre øjendråber, skal der gå mindst 5 minutter mellem de 2 behandlinger.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge CILOXAN® efter lægens anvisning.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge CILOXAN® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

CILOXAN® øjendråber kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i CILOXAN®

CILOXAN® indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumklorid), som kan misfarve bløde kontaktlinser og give øjenirritation.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CILOXAN®

Brug altid CILOXAN® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn i alle aldre:

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne hver anden time i de første 2 dage. Derefter er dosis 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne hver fjerde time.

Hvordan bruger du CILOXAN® korrekt:

1. Vask hænder og sæt dig foran et spejl.
2. Skru låget af flasken.
3. Pas på at flaskens spids ikke rører noget, da indholdet så kan blive forurenet.
4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.

5. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad, med den anden hånds pegefinger.
6. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at røre det. Tryk let på flaskens bund med pegefingern, så det antal dråber lægen har ordineret, falder ned i sprækken mellem øjet og det nederste øjenlåg.
7. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 1 til 2 minutter, så lægemidlet lettere optages.
8. Hvis det andet øje også skal behandles, gentages trin 5-7.
9. Skru til sidst låget på flasken.

Hvis du har brugt for meget CILOXAN®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere CILOXAN®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for meget CILOXAN®, kan du skylle dine øjne med lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge CILOXAN®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige doseringsplan. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge CILOXAN®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

CILOXAN® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorligt hududslæt med betændelseslignende tilstand (inflammation) og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse (infektion) i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Unormal følelse i øjet, irritation i øjet, kløe, rødme, ubehag, skorper på øjenlåget.
- Ændret smag.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

- Sløret syn, betændelse (infektion) eller sår, smerter i øjet, hævede øjenlåg, lysfølsomme øjne, tåreflåd, hvide belægninger, der forsvinder igen.
- Hovedpine, kvalme, eksem.

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Udslæt, nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Smerter i øjet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Kassér CILOXAN® 4 uger efter åbning af flasken.
- Brug ikke CILOXAN® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

CILOXAN® 3 mg/ml, øjendråber, opløsning indeholder:

- Aktivt stof: Ciprofloxacin
- Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumacetat, eddike-syre, mannitol, dinatriumedetat, natriumhydroxid og/eller saltsyre (til justering af surhedsgraden) og renset vand.

CILOXAN®s udseende og pakningsstørrelse

CILOXAN® er en farveløs opløsning i en 5 ml øjendråbeflaske (polyethylen).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

SA Alcon-Couvreur NV,

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien.

Repræsentant for Danmark

Alcon Danmark A/S,

Rødovre Parkvej 25, 2610 Rødovre.

Tlf. 36 36 34 34

Fremstiller

SA Alcon-Couvreur NV,

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 2008